



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12307

检测报告

Test Report

样品名称: 益生抗敏因子

委托单位: 美尔健(深圳)生物科技有限公司

检测类型: 委托检验

广州市华测检测认证技术有限公司
Centre Testing International (Guangzhou) Co., Ltd.
www.cti-cert.com
检验检测专用章



验证码: 3TLV



WEB: <http://WWW.mellgen.com>
ADD: 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷生命科学产业园A23栋

检测报告

报告编号: A2240423486101001C

第 2 页 共 7 页

样品信息	样品名称	益生抗敏因子		CTI 样品编号	HJQ02307001
	商标	/		规格	10g
	生产日期/限期使用日期	2024/01/03/2026/01/02		批号	012401030106
	样品数量	10g		样品状态	棕色液体
	生产商	美尔健（深圳）生物科技有限公司			
	生产商地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201			
客户信息	委托单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司			
	委托单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201			
检测信息	样品接收日期	2024 年 07 月 17 日		样品检测日期	2024 年 07 月 17 日~ 2024 年 08 月 14 日
	检测项目	皮肤光变态反应试验			
	检测依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章 20 国家药监局（2017 年第 136 号）公告			
检测结论	受试物对豚鼠皮肤光变态反应试验结果为：未见皮肤光变态反应。 （检验检测专用章） 批准日期：2024 年 08 月 16 日				
备注	-----				

编制: 毛晓霞 审核: 隋丽妍 批准: 刘伟光

授权签字人: 刘伟光

广州市华测检测认证技术有限公司 广东省广州市黄埔区汤村教育二路 133 号

检测报告

报告编号: A2240423486101001C

第 3 页 共 7 页

一、材料

1. 受试物:

形态: 棕色液体

配制方法 (所用浓度): 原样使用

2. 阳性物

名称: 6-甲基香豆素

批号: L2110131

生产厂家: 阿拉丁

溶剂: 无水乙醇

诱导浓度: 5%

激发浓度: 2.5%

3. 实验动物和饲养环境

3.1 实验动物

种属: 豚鼠

品系: Hartley

级别: 普通级

数量: 试验组 10 只, 阳性对照组 10 只, 阴性对照组 10 只

来源: 广东省医学实验动物中心

实验动物生产许可证号: SCXK (粤) 2023-0035

质量合格证号: 44411600015492

3.2 饲养环境:

室温: 20℃-26℃

相对湿度: 40%-70%

光照: 12h 明暗交替

实验动物环境使用许可证号: SYXK (粤) 2022-0817

饲料来源: 广东省医学实验动物中心

饲料生产许可证号: 粤饲证 (2024) 05073

饲料合格证明: 2407090033

4. 主要仪器与试剂:

HOPE-MED8130C 皮肤光毒性实验检测仪、电子天平、弗氏完全佐剂 (山东西亚化学股份有限公司, 20231109)

(转下页)



检测报告

报告编号: A2240423486101001C

第 4 页 共 7 页

(接上页)

二、试验方法:

试验前 18h~24h 将动物颈部皮肤去毛, 去毛面积约为 $2\text{cm} \times 4\text{cm}$, 试验部位皮肤需完好, 无损伤及异常, 动物分为受试物组, 阳性对照组, 阴性对照组; 每组 10 只动物。

光诱导阶段的处理: 在动物颈部去毛区的四角分别皮内注射 0.1mL FCA 与生理盐水的 1: 1 (v/v) 混合乳剂 (只注射一次), 然后在敷用区域以透明胶带粘附并揭开, 反复数次以剥去部分表皮角质层, 再将受试物 (阳性对照组、阴性对照组则涂抹阳性物或阴性 (溶剂) 对照物) 约 0.1mL 均匀开放涂抹在去毛区, 30min 后用 UVA 进行照射 (照射剂量为 $10.2\text{J}/\text{cm}^2$, UVB 剂量不得超过 $0.1\text{J}/\text{cm}^2$ [试验前用紫外辐照计在实验动物颈背部照射区域测定光强度 (mW/cm^2), 计算照射时间], 详见图 1. 去角质、开放涂布受试物、紫外照射的过程每天进行一次, 共计进行 5 次。




图 1 光诱导阶段的佐剂注射、受试物涂敷及紫外线照射示意图

光激发阶段的处理: 光诱导处理完成后两周, 提前 18h~24h 将豚鼠背部脊柱两侧皮肤区域去毛, 去毛区每块面积约为 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$, 实际涂抹面积为 $1.5\text{cm} \times 1.5\text{cm}$, 共 4 块去毛区 (见图 2A)。将动物固定, 在动物去毛区 3 和 4 涂敷 0.02mL 受试物 (阳性对照组、阴性对照组则涂抹阳性物或阴性 (溶剂) 对照物) (涂抹区域见图 2A)。30min 后, 颈部去毛区和左侧去毛区 (1 和 3) 用铝箔覆盖, 无刺激性胶带固定, 右侧去毛区 (2 和 4) 用 UVA 光源进行照射, 照射剂量为 $10.2\text{J}/\text{cm}^2$ 。光激发阶段紫外照射后的 24h 与 48h, 肉眼观察涂抹部位的皮肤局部反应, 并评分。根据表 1 对每只动物皮肤反应评分。

(转下页)

检测报告

报告编号: A2240423486101001C 第 5 页 共 7 页
(接上页)




图 2 光激发阶段受试物涂抹与紫外照射示意图

表 1 光变态反应试验皮肤反应评分标准

皮肤反应	评分
红斑和焦痂形成	
无反应	0
轻微的红斑（勉强可见）	1
明显红斑（散在或小块红斑）	2
中毒-重度红斑	3
严重红斑（紫红色）至轻微焦痂形成	4
水肿形成	
无水肿	
轻微水肿（勉强可见）	1
中度水肿（皮肤隆起轮廓清楚）	2
严重水肿（皮肤隆起约 1cm 或以上）	3
最高积分	7

(转下页)



检测报告

报告编号: A2240423486101001C 第 6 页 共 7 页
(接上页)

表 2 皮肤光变态反应试验致敏强度分级*, #

致敏率 (%)	等级	致敏强度
0—10	I	弱
11—30	II	轻
31—60	III	中
61—80	IV	强
81—100	V	极强

*: 进行致敏强度分级时, 每组动物数需增加到至少 10 只。

#: 致敏率是反应评分为 2 或以上的动物数占该组动物总数的百分比, I 级致敏度(弱致敏度)没有意义, 在实际使用下无致敏危险。

三、试验结果

表 3 受试物(或阳性物)对豚鼠皮肤光变态反应试验结果

组别	动物数 (只)	起始体重 (g)	终止体重 (g)	诱导 剂量	激发 剂量	观察 时间	皮肤反应积分（红斑+水肿）									积分≥2 动物数	致敏率 (%)
							0	1	2	3	4	5	6	7			
阴性 对照	10	316.80	388.00±	0.1mL	0.02m	24h	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		±6.34	4.84	/只	L/只	48h	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受试 物组	10	317.59	399.82±	0.1mL	0.02m	24h	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		±7.58	6.57	/只	L/只	48h	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
阳性 对照	10	318.22	387.99±	0.1mL	0.02m	24h	1	5	4	0	0	0	0	0	4	40	
		±6.25	4.13	/只	L/只	48h	1	5	4	0	0	0	0	0	4	40	

四、试验结论

受试物对豚鼠皮肤光变态反应试验结果为: 未见皮肤光变态反应。

(以下空白)

检测报告

报告编号: A2240423486101001C

第 7 页 共 7 页

样品图片



声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章,或经涂改,以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准,不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供,本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议,请于收到报告之日起7个工作日内提出,逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码,或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码,即可查询报告真伪;如有疑问,请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。

*** 报告结束 ***