




פתלוגיה של השד



כיצד נראים הפטמה והשד לאחר ההנקה?

- בהאכלה רגילה הפטמה צריכה לצאת באותה צורה שהייתה לפני ההאכלה
- אם הפטמה שטוחה, מקומטת, בזווית, סדוקה, פצועה, כואבת, אדומה, לבנה או בטרומה אחרת - סביר שיש טראומה מכנית.
- אם ההילה פצועה, יתכן שהתינוק נועל את הלסת במקום לתפוס בנינוחות.
- השד צריך להיות רך יותר לאחר ההאכלה (כאשר אין ריקון מלא של השד בהאכלה).

פטמות הפוכות ושטוחות

- ישנם שני סוגים של פטמות הפוכות: retractile/ umbilicated הפוכה מדומה = הפוכה שנמשכת בחזרה, כאשר הפטמה יכולה להימשך החוצה
- invaginated הפוכה "באמת" מקופלת פנימה, כשהפטמה לא יכולה להתהפך כלפי חוץ.





הטיפול הראשוני בפטמות הפוכות מדומות או שטוחות

- גירוי ועיצוב הפטמה ממש לפני ההנקה.
- לפטמה שטוחה (לא הפוכה), יש לעסות אותה או להניח בגד קר כדי לעזור לה לצאת החוצה.
- לפטמה הפוכה, יש להנחות את האם לעצב את הפטמה ע"י הנחת אגודלה (38-50 מ"מ) מאחורי הפטמה (ואת אצבעותיה מתחת) ומשיכתה לאחר לכיוון החזה.
- יעבוד הכי טוב בתנוחות שכיבה על הצד.
- שימוש במשאבה
- פטמת סיליקון

• (תרגילי פטמות במהלך ההיריון) Hoffman's exercises וקונכיית לשדיים, שתי שיטות לטיפול בפטמות הפוכות, אינן יעילות ואינן מומלצות עוד.

מחסור בנקב / פתח בפטמה

- לעיתים נדירות מאד חסר בפטמת האם פתח/ נקב לצינוריות.
- גורם לגודש הקיצוני בשד
- גילו באמצעות באולטרסאונד

9

פטמות גדולות או מאורכות


- פטמה ארוכה או גדולה במיוחד עלולה לפגוע בהנקה, בעיקר אם פה התינוק קטן.
- תינוקות של נשים עם פטמות ארוכות במיוחד נצפו נחנקים לאחר החיבור ומחליקים אחורה לכיוון קצה הפטמה, דבר היוצר לעיתים כאב בפטמה.




10

כאבים בפטמה, פצעים וסדקים

נגרמים כמעט תמיד מתפיסה לא נכונה של הפטמה בפה התינוק
הנקה כואבת היא הנקה לא נכונה!!!



11



12

חבלה דרגה 1



- כאב שטחי
- חיכוך (אך ללא פצע)
- אדמומיות
- חבלה
- נפיחות

13

חבלה דרגה 3



- העור נחשף עד השכבה העליונה של הדרמיס
- סדקים עמוקים

17

חבלה דרגה 4



- קילוף העור עד כדי קילוף הדרמיס

21

כאב ראשוני

- כאב ראשוני או מוקדם בפטמות הוא כמעט תמיד מכני, בניגוד לכאב הנובע מזיהום או מתנאים אורגניים.
- כאב בפטימה כתוצאה מתפיסה לא נכונה יכול לקרות מוקדם מאוד, אפילו בהאכלה הראשונה.
- מכיוון שהפטימה מתארכת כמעט פי שתיים בפי התינוק, אמהות צריכות לצפות לתחושת הימתחות בזמן האכלה. קשה לקבוע מתי תחושה הופכת לכאב.

31



צבע עור, צבע שיער והכנה מוקדמת של הפטמות אינם קשורים לכאבים בפטמה.

נשים לאחר לידה ראשונה סובלות יותר מכאב ראשוני בפטמה.

יש נשים שסובלות מרגישות טבעית עוד בטרם נכנסו להריון

הנחיה לגבי אחיזה נכונה של התינוק בהנקה היא שיטת מניעה אפקטיבית.

32



כאב מכני קשור כמעט תמיד למשהו שהתינוק עושה בפה.

- חיבור לא נכון
- לשון קשורה
- מבנה חך
- סותר עליון קשור
- הפטמה / היפרטרוניה
- טורטיוקליס
- לידה מכשירית
- שימוש בפיסמות סילקון
- גודל הפטמה,
- גמישות הפטמה
- מבנה הפטמה (שקועה או הפוכה)

33



ההנחיה בבי"ח לעיתים היא להגביל את משך ההנקה על מנת למנוע פטמות כואבות.

- להנחיה כזו יש מספר השפעות מזיקות:
- מעכב את הכאב (ולא מונע אותו)
- הנקות קצרות מונעות מהתינוק לקבל מספיק חלב.
- הנקות קצרות יכולות להוביל לכך שהאם היא המנתקת את התינוק. ניתוקים יוזמים תכופים יכולים להביא לפציעה בפטמה.

34



ישנם שני סוגים של כאבים בפטמות:

- כאב חולף- חוסר נוחות בשבוע הראשון שלאחר הלידה, כשהשיא הוא ביום השלישי- שישי שלאחר הלידה.
- כאב מתמשך, חריג- כאב שממשיך ללא הטבה. כאב כזה דורש בדיקה לגילוי הסיבה לכאב וטיפול בבעיה.

35

גורמים אפשריים לכאב כרוני בפטמה

- טראומה פיזית לפטמה או לשד
- אחידה לא נכונה של התינוק
- ניקה לא מאורגנת או לא יעילה של התינוק
- לשון קשורה
- סדק כתוצאה ממטמון שקועות הנעות בתוך הפה של התינוק
- שדיים מלאים מדי או חלב שעומד בשדיים
- מכנה הלסת של התינוק
- ניתוק התינוק בצורה לא נכונה
- אבזר שאינו מותאם נכון כמו פטמת סיליקון
- שימוש לא נכון במשאבת חלב

36

כאב כתוצאה מדלקות / זיהומים

- פיטריה
- זיהום חיידקי
- וירוס הרפס סימפלקס
- דלקת זיהומית (staph)
- אבצע

37

כאב כתוצאה מתנאים עוריים

- אלרגיה או רגישות
- אקזמה
- פסוריאזיס
- וואזוספזם (תת עורי)

38



39

טיפול בכאב פטמות



- שיפור תפיסה .
- במקרה בו יש סדק ותבורה על השד, שטיפת השד במים נקיים. יבוש ואוורור
- יתכן שיש מקום לשקול מריחה של אנטיביוטיקה או סטראוידים. לא נמצאו נזקים אצל תינוקות יונקים בעקבות כך.
- שחרור לשון קשורה
- הידרוגיל
- אוורור

42



- משחת טראומיל
- טיפול אוסטאופתיה
- תרגילי מציצה
- אי האכלה מחדש הפצוע מומלצת רק כאשר הכאב הוא בלתי נסבל או שהדימום מתגבר. חשוב מאוד גם במקרה כזה לרוקן את השד באמצעות סחיטה או שאיבה.

43

קונניות לפטמות סדוקות

- הקונניות מונעות פציעה חזרת של פטמות סדוקות או כואבות על ידי הקטנת החיכוך בין הפטמות לחזיויה. פתחי האוורור שבקצה הקונניות מאפשרים כניסת אוויר, מעודדים את תהליך ההחלמה ומונעים הצטברות נוזלים. ניתן להשתמש בקונניות באופן קבוע בין הנקות.



44

קומפרס מי מלח

- חצי כפית מלח בכוס מים חמים
- להשרות את הפטמה למספר דקות בתמיסה
- ניתן להשתמש במי מלח saline solution
- מספר פעמים ביום



45

מלאות

- שד כבד, קשה ומלא. ללא אודם, בצקת או ברק.
- החלב זורם היטב, לעיתים מטפטף.
- התינוק יונק היטב ומוציא חלב בקלות.



- חשוב להבדיל בין "מלאות" בשד, שהיא פיזיולוגית, לבין "גודש" שהוא פתולוגי ואינו חלק תקין ממהלך ההנקה



גודש בשד



- שד מוגדל, נפוח וכואב. יכול להיות מכריק ובצקתי, עם אזורים אדומים.
- יש חסימה לניקוז הלימפטי והוריד, זרימת החלב מופרעת.
- הפטמה עלולה להיות מתוחה ושטוחה.
- קשה לתינוק לתפוס היטב את השד ולניקוז.
- לעיתים יש לאשה חום, שחולף לרוב תוך 24 שעות בגלל התגברות זרימת הדם ונזול

לגודש שני מרכיבים

- הנפיחות, בגלל חלב המצטבר בשד ואינו מרוקן.
- הבצקת שנוצרת ברקמת השד בגלל התגברות זרימת הדם ונזול



גודש

- אפייני בסביבות היום השלישי לאחר הלידה
- יכול להוביל למסטיטיס
- שכיחות יורדת באופן ניכר כאשר האימא מיניקה מוקדם וללא הגבלה

51

בצקת

- בצקת בשד נובעת לרוב ממתן נוזלים מרובה בעת הלידה .
- מרקם ההילה קשה וחסר גמישות,
- התינוק יתקשה להתחבר לשד ולעיתים גם לא יצא חלב.
- ע"מ להוריד את הבצקת להשתמש RPS
- במידה והתינוק אינו מצליח לינוק ביומיים הראשונים יש לסחוט חלב ידנית ולתת לו בכפית.
- שאיבה לעיתים יכולה להחמיר את הבצקת.

53

Reverse Pressure Softening




54

Milk stasis

- מתרחש כאשר חלב לא מוצא ביעילות מן השד: גודש לאחר לידה, תפיסה לא טובה של השד בפי התינוק, מציצה לא יעילה, הגבלת משך או תדירות הנקות, חסימת צינורית חלב
- גורמים נוספים: אספקת חלב שופעת מידי, הנקת תאומים או יותר


56

בעיות העלולות להוביל לסטאזיס, ודורשות התייחסות:

- כאבים או פצעים בפטמות
- אי נוחות בשד לאחר הנקה
- תינוק לא מרוצה, הנקות מאד תכופות או מאד מועטות, הנקות מאד ממושכות
- תחושה של האם ש"אין מספיק חלב"
- מתן מוקדם של תוספות
- שימוש במגן פטמות או מוצץ

57


סתימה / צינורית חסומה



- גוש רגיש למגע בשד, ללא סימנים של אדום מקומי, חום מקומי או סיסטמי או תחושת מחלה – עשוי להיות חסימה של צינורית חלב.
- *הגורמים האפשריים: לחץ קבוע במקום מסוים או שד שאינו מרוקן היטב.

58

Mammary Glands





- Clearing the blockage is necessary to facilitate the flow of milk in this milk duct



59

דיסביוזיס

- המונח משמש לתיאור מצב פתולוגי של חוסר איזון חידקי בגוף, במקרה שלנו חוסר איזון כמותי ואיכותי בין החידקים הרעים לטובים.
- **אז מה למעשה גורם לחוסר האיזון הזה?**
- כמעט כל דבר – החל מגנטיקה, סוג הלידה, הרכב התזונה, ניתוחים, מחלות וזיהומים, מצב נפשי, סביבת מחיה, מערכת חיסון מוחלשת, שימוש בתרופות סותרות חומצה, מדכאי מערכת חיסון ואנטיביוטיקה.

60





blebs



- מריחת שמן זית בטמפרטורת החדר לכ 10 דקות
- שטיפת המקום במים חמים זורמים
- יבוש הרקמה באמצעות מגבת גרמית עד קילוף עדין של השלפוחית
- הנקה

71

אם החסימה מלווה בהופעת שלפוחית קטנה בקצה הפטמה

- ניתן לחורר את השלפוחית בעזרת מחט סטרילית. (לאאאא מומליץ)
- חממי באש מחט או סיכת תפירה, צנני את המחט ובקעי בעדינות את השלפוחית.
- לעיתים ניתן יהיה לסחוט חומר דמוי משחת שיניים מן הצינורית, והחסימה תשתחרר מיד.
- ניתן גם לתת לתינוק לינוק והוא עשוי לשחרר את החסימה בעצמו.
- גשי לרופא אם אינך מסוגלת לבקוע את השלפוחית בעצמך.

75



- אם הצינורית החסומה לא נפתחה תוך 48 שעות (נדיר), ניתן להיעזר במכשיר אולטרסאונד רפואי.

76

מסטיטיס



- אזור בשד הופך להיות אדום, חם וכואב.
- לרוב מופיע בשד אחד. תתכן מחלה סיסטמית עם הרגשה כללית גרועה (כמו בשפעת) וחום גבוה (מעל 38.5 מעלות).
- מסטיטיס הכי שכיח בשבועות הראשונים לאחר הלידה, אם כי יכול להופיע בכל שלב בהנקה

84

מה עלול לגרום למסטיס ?



- אימא לא מיניקה, מדלגת על הנקות, ישנה לאורך הלילה.
- התינוק לא תופס נכון את השד, ולכן לא מנקז אותו.
- בעיה בשחרור החלב מהשד.
- ייצור חלב מוגבר
- גמילה פתאומית מההנקה

85


מסטיסיס הוא מצב דלקתי של השד

יכול להיות:

זיהומי

לא זיהומי

גורם עיקרי – הוצאת חלב לא יעילה
Milk stasis



86

"התחברות" התינוק לשד

- תפיסה לא טובה של השד בפי התינוק היא גורם סיכון חשוב למסטיסיס
- פטמות פצועות מופיעות לעיתים קרובות יחד עם מסטיסיס
- אם יש צד מועדף – הדלקת לרוב בצד השני

88

גורמים מכניים נוספים

- פרנולום קצר
- שימוש במוצצים ו/או בקבוקים
- ביגוד לוחץ, שינה על הבטן




89

- ללא הוצאת חלב יעילה דלקת לא-זיהומית נטתה להפוך לזיהומית, ודלקת זיהומית נטתה להפוך לאבצס.
- לא ניתן היה להבדיל על סמך ממצאים קליניים אם היה קיים זיהום או לא.

90

זיהום

- שכיח ביותר: חיידקים ממשפחת סטפילוקוקוס זהוב (Staphylococcus) (שוכנים באופן טבעי על גבי העור של בני אדם וכן ברקמות ריריות).
- לעיתים Streptococcus סטרפטוקוקוס (מחלות בעור ובדרכי הנשימה העליונות).
- בבדיקות רק כ-50% מתרכיבות החלב עקרות
- מגע הדוק בין האם לתינוק מיד אחרי הלידה מבטיח קולוניזציה של מערי העיכול והנשימה של התינוק בחיידקים שאינם מזיקים – מונע התרבות חיידקים פתוגנים

92

זיהום

- חדירת הזיהום – דרך צינוריות החלב, המטוגני (זיהום ממקור מרוחק) או דרך המערכת הלימפטית מפצעים בפטמות
- נמצא קשר בין זיהום הפטמה בקנדידה למסטיטיס, בעיקר באירועים חוזרים

93

נשים מיניקות רבות, שלהן חיידקים העלולים להיות פתוגניים על העור או בחלב, לא מפתחות מסטיס

אבל

לנשים רבות המפתחות מסטיס אין חיידקים פתוגניים בחלב

94

מסטיס לא-זהומית

- בחלב ציטוקינים מעכבי דלקת וגורמי דלקת.
- הדלקת אחראית לסימנים הקליניים האופייניים.
- בעת דלקת יש פתיחה של מסלולים פרה-צלולריים, עליה בריכוז נתרן וכלור בחלב, וירידה בריכוז לקטוז ואשלגן.
- טעם החלב משתנה זמנית.
- גורמים אימונולוגיים בחלב אם (IgA, lactoferrin, lysozyme, C3) מעכבים התרבות חיידקים בשד.

95

מסטיס זיהומית

- מתרחשת כאשר סטאזיס החלב מתמשך והחיידקים גוברים על הגורמים האימונולוגיים ועל התגובה הדלקתית.
- לא ניתן להבדיל קלינית בין מצב זיהומי ללא-זיהומי.
- ניתן להיעזר בתרבויות וספירת תאים – אם כי לעיתים קרובות לא מעשי.

96

אירועי מסטיס חוזרים

- טיפול לא שלם באירוע הראשון או המשך הנקה לא יעילה.
- קנדידה.
- נדיר: הפרעה מבנית בצינוריות השד, ציסטה או גידול.

97

מניעה

- מסטיסים ואבצס ניתנים לרוב למניעה בעזרת ניהול נכון של ההנקה:
- התחלת הנקה בתוך כשעה מהלידה
- הקפדה שהתינוק נצמד היטב לשד
- הנקה ללא הגבלת זמן או תדירות
- הנקה מלאה למשך 6 חודשים

98

גורמים העלולים להגביר סיכון למסטיסים

- שימוש במוצץ
- מתן תוספות, בעיקר בבקבוק
- הגבלת ההנקות
- עומס עבודה
- דילוג על ארוחות
- חבלות לשד, כולל מאלימות במשפחה

99

Infection - סימנים המחשידים למסטיסים זיהומי

פטמה פצועה עם סימנים ברורים לזיהום.
מוגלה ו/ או דם בחלב.
הופעה מהירה וחמורה של הסימפטומים ללא גורם ברור.



100

טיפול

- כללי
- אנמנזה טובה - מהלך ההנקה מההתחלה, שגרת ההנקה, גורמים מכאניים
 - תצפית על הנקה – האם ההצמדות טובה, וכיצד ניתן לשפרה

101

טיפול במסטיטיס

- הנקה מרובה (כמה שאפשר) מהשד המודלק. רצוי לבדוק את התפיסה ולוודא שהתינוק אכן יונק ביעילות ומרוקן היטב את השד
- קומפרסים קרין
- מנוחה!!!!
- שתיה מרובה
- טיפול אנטיביוטי (לפי הצורך)
- טיפול סימפטומטי (איבופרופן) חום גוף גבוה עוזר לגוף להלחם בזיהום. הורידו את החום רק אם הוא גורם לך להרגשה רעה, ולא רק מפני שהוא קיים.

1102

טיפול אנטיביוטי

- קיימת תרבות או ספירת תאים המצביעים על זיהום
- סימנים קשים מההתחלה
- יש סדק או פצע בפטמה
- אין שפור בסימנים לאחר 12-24 שעות של הוצאת חלב יעילה.

1103

אבסס



- אבסס – אזור מוגבל, מלא במוגלה. גוש כואב מאוד, עם אודם, חום ובצקת מקומית, עם או בלי חום סיסטמי.
- מורסה (אבסס, כיס מוגלתי המכיל חיידקים ותאי דם לבנים) היא סיבוך אפשרי של דלקת השד.
- שכיה ביותר ב-6 שבועות לאחר הלידה


1107

אבצס

- דורש ניקוז המוגלה ניתוחי
- בשאיבה עם מזרק – רצוי בעזרת U/S
- טיפול אנטיביוטי מתאים
- תמיכה בהמשך ההנקה



1108



תמיכה בהמשך ההנקה עם אבצע

- התינוק ישהה לצד אמו לפני ואחרי הניתוח
- התינוק יכול להמשיך לינוק מהצד הבריא
- הזנת התינוק בעת הניתוח
- שאיבת חלב מהצד הבריא לפני הניתוח
- הנקה מהצד הבריא מיד כשמתעוררת
- הנקה מן הצד הפגוע לפי הכאב, שימוש באנלגטיקה
- עזרה בהצמדה לצד הפגוע




- חשוב לרוקן חלב מן הצד הפגוע, ועדיף בהנקה
- אם חלה ירידה באספקת החלב בצד הפגוע ניתן לעודד ייצור חלב ע"י הנקות תכופות
- לרוב הנקה מצד אחד תספק את צרכיו התזונתיים של התינוק עד לחזרה להנקה מלאה משני הצדדים
- טיפול מאוחר ואבצע גדול עלולים למנוע חזרה של יכולת ייצור חלב מלאה

ציסטה



בטיחות המשך ההנקה בעת מסטיטיס או אבצס

- המשך ההנקה חשוב לבריאות האם והתינוק
- הפסקת ההנקה בעת מסטיטיס לא תורמת להבראת האם, ואף עלול להחמיר את מצבה
- המשך ההנקה בטוחה, גם בנוכחות חיידקים
- תינוק לאם נשאית HIV צריך להפסיק לינוק מהצד הפגוע עד להבראה

120

פלגמון

- מונח רפואי המתאר דלקת של רקמה רכה המתפשטת מתחת לעור או בתוך הגוף.

121

פלגמון לעומת אבצס

- הפלגמון אינו מוגבל ויכול להמשיך להתפשט לאורך רקמת החיבור וסיבי השריר.
- מורסה מוקפת בחומה ומוגבלת לאזור הזיהום.
- מורסה ופלגמון עשויים להיות קשים להבחנה במקרים מסוימים. לפעמים, פלגמון נוצר כאשר החומר הנגוע בתוך מורסה פורץ מהכלאות העצמית שלו ומתפשט.
- בדרך כלל, ניתן לנקות מורסה מהנוזל הנגוע שלה. לא ניתן לנקות בקלות פלגמון.

122



FIG. 12. Clinical appearance of left breast upper inner quadrant phlegmon. Ultrasound showing indistinct fluid collection with surrounding hyperemia and edema.

123



- עיסוי רקמות עמוק מוגזם בדלקת שד, עשויה לגרום להיווצרות פלגמון
- מחמיר בצקת ופגיעה מיקרו-וסקולרית.

124



טיפולם אלטרנטיביים לדלקת

- טראומיל
- ארומתרפיה.
- דיקור סיני+מוקסה.
- רפלקסולוגיה
- הומאופתיה

125



טיפול בדלקות שדיים חוזרות

- הפניה לאולטרסאונד \כרוג שד
- שימוש בתוסף מזון – ליציטין
- המינון הוא 1,200 מ"ג, ארבע פעמים ביום


126




כאב פתאומי לאחר תקופה של הנקה "רגועה"

- בדרך כלל מעיד על פטריה
- בקטריה
- וירוס
- פסוריאזיס
- אלרגיה
- אקזמה
- וואזוספזם

127




- כאבים ותחושה "שורפת" בתוך השד בזמן ההנקה ובעיקר אחריה
- צבע ורוד חזק ולא רגיל בפטמות
- חוסר רצון של התינוק לניק או אי-שקט שלו לעיתים קרובות
- פצעים לבנים בתוך פיו של התינוק
- לשון התינוק תהיה מכוסה בשכבה לבנה שאינה יורדת בגירוד עדין
- תפרחת-חיתולים בישבנו של התינוק, שלא תיפתר באמצעים הקונבנציונאליים



טיפול

- דקטרין אורל ג'ל לפטרייה בפיו של התינוק. אפשר למרוח בעזרת האצבע (לא למרוח על פיטמה אחרי ההנקה)
- דקטרין או ניסטין משחה לפטמות (לעיתים ערוב המשחה באבץ יאירן את ההחלמה)
- משחת דויטין לתפרחת חיתולים פטרייתית
- קומפרסים של חומץ תפוחים מעורב עם מים רתוחים שהתקררו (כמויות זרות משניהם) על השד: מרטיבים גזה סטרילית, מניחים לרבע שעה לפחות כל פעם, ואח"כ זורקים את הגזה

• הורדת שמרים, תוססים, פטריות וחמוצים מתפריט האם

• החלפה והרתחה יומיומית של כל מה שבא במגע עם פה התינוק (מוצצים, פטמות בקבוקים, צעצועים וכו') ועם הפטמות (חזיות, חולצות, מגבות וכו'). הדבקה חוזרת ממגע כזה עקב אי-הקפדה על כלל זה היא מאוד מהירה ומאד מתסכלת

• הוספת פרוביוטיקה כמו אסידופילוס (חיידקים ידידותיים למעיים) לתפריט של האם כדי לתמוך במערכת הנלחמת בפטרייה בתוך המעי.

• מערבבים ABCDophilus לאחר גיל חודש. אפשר להוסיף לתינוק אבקת מעט אבקה (רבע כפית לתינוק קטן) עם מעט חלב-אם ונותנים בכפית. האם יכולה גם לאכול יוגורט ביו

• הצלחה רבה. נצפתה בטיפול אלטרנטיבי המיועד לחיזוק הגוף כולו והמערכת החיסונית. דיקור סיני, תמציות צמחים, הומאופתיה.

144

מיצוי זרעי אשכוליות

• מיצוי זרעי אשכוליות יכול גם הוא לעזור בטיפול בקנדידה.

• ניתן להשתמש בו ישירות על הפטמה, ו/או במתן דרך הפה.

• בשימוש ישירות על הפטמה, יש לדלל את המיצוי (5-15 טיפול, או לעתים עד 25 טיפות, בכ-30 מ"ל מים), ולמרוח על הפטמה עם קיסם לניקוי אוזניים או כדור צמר גפן, לתת לו להתייבש, ואז לכסות בשכבה דקה של המשחה הרב תכליתית לפטמות.

• בנטילה דרך הפה, ניתן לקחת כדור של מיצוי זרעי אשכוליות, 250 מ"ג 3 פעמים ביום.

145

במצבים שמעורב גם פצע

• **משחת מופירוצין** (בקטורבן), (לא קרם): 15 גרם (משחה אנטיביוטית).

• **משחת בטאקורטן** 0.1% (לא קרם): 15 גרם (משחה אנטי דלקתית).

• למשחות אלו יש להוסיף **אבקת מיקונאזול** כך שהריכוז הסופי הוא 2% מיקונאזול (אבקה אנטי פטרייתית). לעתים עוזר להוסיף גם אבקת **איבופרופן**, כך שהריכוז הסופי של האיבופרופן הוא 2% (אבקה נגד כאבים ונפיחות).


• **פליקונאזול**

146

Epstein Pearl



148



טיפול

- * שימון ושמירה על לחות מרבית של העור, במיוחד לאחר היחשפות למים או למקלחות.
- * שימוש במשחות סטרואידיות.

157

פסוריאזיס



- **פסוריאזיס** או ספחת היא מחלה אוטואימונית כרונית בה תאי העור מתחלפים בקצב מוגבר בשל זיהויים כפתוגן. המחלה מתבטאת ברבדים עוריים, לרוב בצבע אדום-סגול המכוסים קשקש
- תרופות: אסיד סליציל, אנטרלין כדאי להימנע מתכשירי קשקש

158

הרפס



- הרפס לא עובר בחלב אם
- אסור להניק כשיש נגעים על השד
- אם לאימא יש פצע הרפס על החזה היא יכולה לשאוב ולזרוק את החלב מהשד עד שהפצעים יתייבשו.
- להקפיד על היגיינה לעתים קרובות ולהימנע מלנשק את התינוק אם יש לה פצעים בפה שלה.

159

galactoceles



- ציסטה המלאה בחלב הנגרמת מחלב הכלוא בצנורית.
- הגלקטוצל הוא בד"כ רגיש למגע ומתנוון בד"כ מהר ונעלם תוך כמה ימים.
- בכדי לנקות את הציסטת, הרופא ינקח ויאלחש את העור, יקבע את המסה בעזרת ידו ויחזיר מחט בכדי לשאוב החוצה את הנזול.
- הליך זה ממוטט את הציסטת ופותר את הבעיה.

163

Vasospasm



Vasospasm

- הוא התכווצות פתאומית / היצרות של כלי דם (בפטמה, במקרה זה).
- זה יכול להתרחש זמן קצר לאחר הנקה או בין ההנקות
- יכול להיות סיבות שונות:
- **תגובה משנית לטראומת כאב או פטמה**
- קור לעתים קרובות מעורר vasospasm 1 / או מחמיר את המצב.

165

ניפדיפין

- בתרופה זו משתמשים לטיפול ביתר לחץ דם.
- טבליה אחת של 30 מ"ג של הנוסחה לשחרור איטי פעם אחת ביום בד"כ מרגיעה את הכאב המיוחד לתופעת זו.
- לאחר שבועיים, הפסיקי עם התרופה.
- תופעות לוואי אינן שכיחות, אבל לעתים מופיעים כאבי ראש.
- זו תרופה שדורשת מרשם.
- אם טבליה אחת אינה מספיקה, ניתן להגביר את המינון.

169

- חימום !! הימנעות מקור .
- לכסות את הפטמה בהקדם האפשרי לאחר שהתינוק סיים לינוק .
- כריות חימום
- גרב עם אורז יכולה להיות שימושית כמקור לחום יבש: למלא גרב או שקית בד עם אורז ומיקרוגל 45 שניות (או עד שהחום רצוי מושג) לא לבשל להחזיק את גרב האורז נגד הפטמה (על הבד או החולצה של אימא)
- הימנע מתרופות קפאין, ניקוטין וחומרים אחרים המעודדים כיווץ רקמות אייבורופן.
- תוספי תזונה עם סידן / מגנזיום.

166

רעילות

- נטילת ויטמין ב6 בכמויות העולות על 500 מג הם בעלי פוטנציאל לרעילות במערכת העצבים .
- לא מומלץ לקחת ויטמין זה לאורך זמן ללא ליווי רפואי .
- באנשים מסימים מינון של מג 150 יכול להראות סימנים של רעילות .
- סימני רעילות :
 - כאבי ראש .
 - בחילות
 - הפרעה השינה
 - תחושה של שריפה בכפות הידיים
 - התקפי רעד
 - ירידה בייצור חלב בנשים מניקות

171


ויטמין B6.

- יש ליטול 150-200 מג' פעם אחת ביום למשך 4 ימים, ולאחר מכן 25 מג' ליום פעם אחת ביום.
- על האם להמשיך בטיפול עד שהיא נטולת כאבים למשך מספר שבועות.
- ניתן להתחיל את הטיפול מחדש אם עולה הצורך.
- אם ויטמין B6 לא עזר תוך כמה ימים, סביר שלא יעזור כלל.


170



172



173



שינויים פיברוציסטיים - Fibrocystic changes

- שינויים פיברוציסטיים של השד הינם תגובת יתר של רקמת השד להורמוני המין.
- התגובה אינה אחידה ותלויה ברמת ההורמונים ברקמת השד ובתגובת הקולטנים להורמונים הללו ברקמת השד
- התסמין הקליני המאפיין הוא כאב. רגישות בשד הנושאת אופי גלי (התלקחויות ונסיגות)
- הנשים מספרות על גודש בשדיים, רגישות מקומית, גירוי בשד ולפעמים סימנים כלליים כמו: כאבי ראש, דיכאון, עייפות וכו'

הטיפול המוצעים הם

- תרופות – מרשם רופא
- ויטמין E מנה של 600 מ"ג את הטיפול יש לתת במשך 2 מחזורים. אם החולה מגיבה, יש להמשיך בטיפול למשך 6 חודשים.
- מניעת קופאין
- משחת (Voltaren) מריחת משחה זו על השד וההדרתה לעור בעזרת עיסוי, הוכחה כעוזרת להפחתת הכאב בשד במספר עבודות.

מחלה פיברוציסטית (Disease)

- מחלה פיברוציסטית של השד (הפרעה שפירה בשד) הוא מונח כללי שמתאר מספר מצבים שפירים בשד.
- מאפייני התמונה הקלינית:
- גוש קשה אלסטי שאינו כואב.
- הגוש אינו מוגבל היטב כמו כיסית.
- הגושים אינם ניידים.
- לרוב הגושים הם בקוטר של עד 5 ס"מ.
- הגושים ממוקמים בדרך כלל ברביע החיצוני העליון של השד.

178

- כמחצית מהנשים בגיל הפוריות יפתחו אחד מהמצבים הללו בשלב מסוים. שנים של מחזורי וסת ייצרו לבסוף רקמת שד צפופה או סיבית.
- נשים בד"כ מפתחות ציסטות בשנות השלושים שלהן.
- עקב שעורי השכיחות שלה, יש המתייחסים לתופעה כזו שאינה מחלה.

פיברואדנומה


179

- גוש עגול וחלק הנע בקלות כאשר ממששים אותו.
- כרבע מהנשים עם מחלה פיברוציסטית מפתחות עדות ברורה לציסטה גדולה של פיברואדנומה יכול לנוע מגדול אפון ועד גודל לימון.
- שאיבה במחט עוזרת לאמת את האבחנה.
- אם לא ניתן לשאוב נוזל כלשהו, זוהי ככל הנראה פיברואדנומה.
- פיברואדנומה אינה מזיקה כשלעצמה ואם האמא מניקה, רוב המנתחים בוחרים לדחות את הניתוח עד שההנקה נפסקת והילד נגמל לחלוטין.

אדנומה ופיברואדנומה-Fibroadenoma

180

- אדנומה מכילה רקמה אפיתליאלית
- פיברואדנומה בעיקר רקמת חיבור-שכיח ביותר
- גילאי העשור השלישי
- גוש עגול קשה, גיד, עשוי להיות בקוטר של מספר סנטימטרים
- מחייב ביצוע ביופסיה



דימום מהשד

181

- חלב בעל גוון אדום, ורוד או חלוד
- במקרים אחרים, הגורמים לדימום אינם ברורים.
- היא מכנה זאת "תופעת הצנור החלוד" rusty-pipe syndrome). תופעה זו מתרחשת לעיתים קרובות יותר אצל אימהות מבכורות במהלך השלבים הראשונים של לקטוג'נסיס ואינה כרוכה באי נוחות כלשהי





182

- דימום אדום בהיר מהשד כאשר אין כאבים או סדקים בפיטמה מצביע על צורך לבדוק את האימא לאיתור פפילומה (סוג של גידול שפיר) בתוך צינורית החלב.
- זהו גידול שפיר, קטן, דמוי יבלת על דופן הצינורית אשר מדמם כאשר הוא מתפורר.
- בד"כ אי אפשר לחוש במישוש במסה או גידול, כאב או חוסר נוחות מתונים יכולים להופיע או להעדר.
- פעמים רבות הדימום פוסק מעצמו ללא כל טיפול, אך אם הדימום נמשך, על האישה להיבדק ע"י רופא.



סרטן שד

183

- סרטן השד הוא הממאיר ביותר בקרב נשים. כרבע מכלל הנשים המאובחנות עם סרטן שד הן לפני גיל המעבר ופוריות בפוטנציה.
- סרטן שד אצל אישה מניקה הוא עניין קליני.
- טכנולוגיה חדשה המגלה הסתיידויות טרום סרטניות זעירות הדורשות המשך בדיקה.
- יותר נשים בוחרות להניק כעת, במיוחד נשים שהרו בשלב מאוחר יותר בחיים.

184

- אצל אישה הנמצאת בסיכון לסרטן שד, הנקה ממושכת יכולה לפחות לדחות את הופעתו לפני גיל המעבר.
- ההשפעות המגנות של ההנקה יכולות לנבוע מכך שהיא מפחיתה את מספר הביציות באופן יחסי למשך ותדירות ההנקה ושומרת על רמות אסטרוגן נמוכות יותר מאשר אם האישה הייתה מקבלת ווסת.
- הנקה יכולה להפחית את ריכוז הגורמים המסרטנים (קרצינוגנים) ממקור פנימי או חיצוני הקיימים בצינוריות ובתאי הלוברלר האפיתלליים.


185

- למרות שההנקה הוכחה כמורידה את הסיכון לפתח סרטן שד, היא אינה מונעת את האפשרות הנדירה לגידול סרטני בשד בזמן ההנקה.
- רגישות השדיים והגידול ברקמת השד מסתירות את הגידול ומעכבות את גילוי, נותנות לו זמן לגדול ולהתפשט.
- שדיים מניקים הם מאד צפופים וביצוע ממוגרפיה או סונוגרפיה הופכות בעלות ערך מועט לאבחנה.

מתי להפנות את היולדת לרופא להערכה?

- כל גוש שלא קטן לאחר 72 שעות של טיפול.
- סימפטומים שנראים כמו דלקת שד (mastitis) ללא חום שאינם חולפים לאחר טיפול אנטיביוטי.
- דלקות שד חוזרות או צינורית סתומה שחוזרת באותו מקום.

186



187

Ductal carcinoma in situ (DCIS)


- הגוש הנפוץ ביותר של סרטן שד בלתי חודרני.
- אי הגידול המסארים ממקומים בצינוריות החלב.
- אחוזי ריפוי גבוהים.
- אמצעי גילוי ממוגרפיה וביוסטיה.
- Comedocarcinoma - תאי גידול עם נמק.
- DCIS יהפוך לפולשני תוך מספר שנים ללא טיפול.
- טיפול הסתיידות.
- טיפול כירורגי.




188

LCIS -Lobular carcinoma in situ

- גידול מוגבל לבלוטות החלב בלבד.
- סיכון מוגבר להופך לסרטן שד פולשני.
- מחייב מעקב קפדני ביותר.



סרטן שד חודרני Invasive ductal carcinoma (Infiltrating)



Mammary Ductal Carcinoma

The diagram illustrates the progression of ductal carcinoma. It starts with a 'Normal duct' containing 'Normal duct cells'. This progresses to 'Ductal carcinoma in situ' where the cells are still within the duct. Finally, it shows 'Invasive cancer cells' that have broken through the 'Basement membrane' and are invading the surrounding 'Mammary gland' tissue.

- Infiltrating ductal carcinoma הסוג הנפוץ ביותר של סרטן שד חודרני 75%-80%
- מקורו של הגידול בצינוריות החלב, מאופיין ע"י אי סדירות, מרקם נוקשה במישוש.
- אבחנה ע"י ממוגרפיה וביופסיה.
- תאי הגידול בעלי פוטנציאל לפלוש לרקמת הדמשתית-רקמת החיבור והשומן בשד.
- תאי הגידול עלולים לשלות גרורות לבלוטות לימפה או איברים אחרים (ראות, עצמות, כבד)

Medullar Carcinoma

- קרצינומה מדולרית של השד היא תת סוג נדיר של סרטן ductal פולשני (הסרטן שמתחיל בצינור חלב ומתפשט מעבר לו).
- זה נקרא קרצינומה "הדולרית", כי הגידול הוא מסה רכה, בשרנית שדומה לחלק של המוח הנקרא הלשד.
- והיוו כ 3-5% מכל המקרים של סרטן השד
- מופיעה בגילאים מעל 50
- פרוגנוזה טובה בד"כ.

Invasive Lobular carcinoma



Invasive lobular carcinoma

The diagram shows a cross-section of a breast with a magnified view of the lobules. It illustrates how cancer cells are invading the lobular structure of the mammary gland.

- קרצינומה מיוחדת מאופיינת בשגשוג תאים קטנים יחסית בקצוות צינוריות החלב.
- מהווה 5%-10% מכלל הגידולים הממאירים של השד.
- שכיחה בגילאים לפני הבלות.
- מתגלה באקראי - רוב הגידולים רב מוקדיים, ועלולה להופיע בשני השדיים.
- קשה לגילוי בממוגרפיה. יש לבצע **MRI**

Paget`s disease



- סוג של דקטאל קרצינומה .
- מחלה ממוקדת בעור בפטמה ובעטרה.
- עור הפטמה אדום קיימת תחושה של גרד וצריבה
- לא נמוש גוש בסוג זה של גידול.
- שכיחות 1%
- אבחנה - ביופסיה.

הסימנים והתסמינים של מחלת פאג'ט של השד עשויים לכלול

- תחושת צריבה
- גוש מתחת לפיטמה והטבעת ממכיבה
- פיטמה שטוחה או שקועה
- אדומים נגזעים מעבר לפיטמה והטבעת מביבה
- עור קשה או דולף המזכיר אקזמה על הפטמה, הטבעת סביבה או שניהם
- עור קשקשי או מתקלף על הפטמה
- שינויים בעור בתחילה (תגראח כאילו העור מכריא מעצמו)
- גירוד
- אדום
- שינויים בעור ובפיטמה בשד אחד בלבד
- פליטה של דם או בצבע קש מן הפטמה

194

Inflammatory Breast Cancer

- סוג נדיר של סרטן שד פולשני-1%
- מאופיין ע"י עור אדום חם בעל גבשושיות (עור תפוז)
- Peau d'orange
- **אבחנה מבודלת מדלקת בשד.**



195

peau d'orange



196

בין הסימנים שעלולים להעיד על סרטן שד דלקתי (סוג נדיר של סרטן שד)

- שינוי מהיר במראה שד אחד
- התנפחות, טכד או הגדלה של שד אחד
- שינוי בצבע השד
- תחושת חום לא רגיל של השד
- גבשושיות על העור הנורמות לשד להוראות כקליפת תפוז
- תחושת גירוד
- כאב
- השטחה או הופך פנימה של הפטמה
- סדקים או נפירות בפטמה, שינוי צבע העטרה
- יש להבדיל בין סרטן שד דלקתי לבין דלקת חולפת בשד. דלקת בדרך כלל מתפתחת במהלך הנקה, ומלווה בעליה בחום הגוף.

197

אבחון במהלך ההנקה

- אם האבחנה נעשית במהלך ההנקה, יש לקטוע את ההנקה ולהתחיל בטיפול.
- נשים המקבלות כימותרפיה לטיפול בסרטן שד או לכל סרטן אחר לא אמורות להניק.
- כל התרופות הכימותרפיות חודרות לחלב. למרות שהרמה נמוכה בחלב, מרכיבים אלה הם בעלי יכולת פעילות אנטימטבולית (פוגעים בתהליכי חילוף החומרים) והם בפוטנציה רעילים לתינוק.

- דחייה של השד ללא סיבה גלויה יכולה להיות סימן אזהרה מוקדם לסרטן שד. למרות שנכון שברוב הפעמים התינוק ידחה את השד בגלל סיבה אחרת, מעקב צמוד ואולי גם חיפוש אחר סרטן שד סמוי בשד המסוים, יאפשר אבחנה מוקדמת יותר וישפר את הפרוגנוזה.

ביופסיה.

- ביופסיה במחט עדינה/קטנה המוציאה כמה תאים.
- ביופסיה במחט גדולה וחלולה משמשת להסרת חתיכה קטנה של הגוש (נקראת ביופסיה "מרכז" – core או ביופסיה tru-cut).
- בביופסיה ניתוחית או "פתוחה", המנתח מוציאה חתיכה גדולה מהגוש או מסיר אותו לחלוטין.

הנקה אחרי כריתת שד

- חלק מהנשים שעברו כריתת שד חד צדדית מניקות בהריון הבא שלהן. יש לעודד את האימא לשנות את תנוחת התינוק לעיתים קרובות כדי לספק גירוי אופטימלי לכל חלקי השד.
- יש מעט או בכלל לא, הגדלה של השד המטופל במהלך ההיריון.
- היכולת להניק מהשד הבריא היא נורמלית, אבל יש סיכוי קטן יותר לתפוקת חלב מלאה מהשד המטופל ויש אפשרות להעדר יכולת להניק ממנו.
- קושי בהתחברות לשד מתרחשת לעיתים כיוון שהפטמה אולי לא תוכל להתארך כמו שהיה מצופה.
- יש סיכוי נמוך יותר להעדר יכולת להניק כאשר החתך מבוצע מסביב לפיטמה: הנקה מהשד המטופל פחות סביר שתתרחש כאשר הנגע נמצא במיקום מרכזי. הזמן שחלף בין מועד הטיפול למועד הלידה לא נראה כמשפיע באופן מוזיק על ההנקה מהשד המטופל.

ע"י Tamoxifen (תרופה הנלקחת למניעת סרטן שד) מדכאת ייצור חלב.