



תנוחות הנקה



נירית אוליבקוביץ – יועצת הנקה מוסמכת IBCLC








• תפיסה טובה



• תפיסה גרועה



איך לעזור לאם להגיע לתנוחה נוחה
וחיבור יעיל.

- חשוב שלתינוק יש תמיכה טובה והוא מונח בגובה השד של האם (האם מובילה את החיבור)
- לתינוק יש תמיכה טובה ומונח בין השדיים של האם (התינוק מוביל את החיבור)



איך נעזור לתינוק להיצמד נכון לשד?



BABY-LED BREASTFEEDING



אין בה "תנחות",
אין "אמא שמחברת את
התינוק לשד",
אין בה טכניקות,
וקונסטרוקציות מסובכות.

יש

אמא ותינוק, שחשים זה את
זו, מקשיבים זה לזו
ופועלים על פי הרפלקסים
והאינסטינקטים שלהם

- יש לזכור שהתנוחה שמסייעת בצורה הטובה ביותר תשתנה בין אימהות שונות ותינוקות שונים.
- תנוחה וחיבור יעילים ממעיטים ברגישות הפטמה ופציעתה.
- טכניקות הנקה יעילות מעלות את משך זמן ההנקה.

- התינוק שוכב על החזה שלה, בין השדיים, עורו נוגע בעורה. האם מדברת אליו, מלטפת אותו, מרגיעה אותו, יוצרת איתו קשר.
- כשהתינוק רגוע וחש את הגוף של האם הוא יכול להתחיל לחפש את השד.
- תפקידה של האם להרגיע את התינוק. כשהתינוק נרגע התנועה שלו יותר מאורגנת והוא יכול למצוא את השד בעזרת הרפלקסים שניחן בהם.



שני רפלקסים מאפשרים לתינוק למצוא את השד

- (rooting) חיפוש – כשהוא חש מגע בלחי ובסנטר הוא מתחיל לחפש.
- (bobbing) ניקור – תנועות גיטוש שהתינוק עושה כדי למצוא את השד. הוא מניע את ראשו בתנועות ניקור ונע על גופה של האם עד שמוצא את הפטמה.



באופן אידיאלי כל אם יכולה למצוא ווריאציות הטובות ביותר עבורה על ידי ניסוי וטעייה.



- לפעמים התינוק בכל זאת מצליח לתפוס את הפטמה אבל נמצא בתנוחה שלא מאפשרת לו לפתוח את הפה ובנוסף לכך יתכן שהאם לוחצת לו על הראש. מצב כזה לא מאפשר לתינוק להצמד בצורה טובה לשד וזה יוצר לחץ על הפיטמות, כאבים ופצעים ולא מאפשר זרימה טובה של החלב.

מדוע התנוחות המקובלות לא עובדות

- כאשר מניחים את התינוק בתנוחה אופקית לפי ה"חוקים", שמים אותו מול הפטמה ומגישים לו את השד לתוך הפה, הרפלקסים של החיפוש והניקור מתחילים לפעול ומרחיקים אותו מהשד.
- כוח המשיכה אף הוא תורם להתרחקות של התינוק מהשד – התינוק מוצא את עצמו מתחת לשד. בתנוחה הזו, הידיים שלו מפריעות לו להיצמד, והאם צריכה להרחיקם.
- בשלב הזה התינוק מתוסכל ומתחיל לבכות. האם מתקשה להחזיק אותו בתנוחה המתאימה ומתחילה לחפש כריות, כורסת הנקה, ועוד כל מיני אביזרים שאמורים להקל לה על ההנקה.

תנוחה קדמית - אחיזה צולבת




- ❖ הראש של התינוק בהמשך לשד. רצוי להשתמש בכרית כדי להביא את התינוק לגובה המתאים.
- ❖ האף של התינוק ממוקם מול הפטמה.
- ❖ הגוף של התינוק וראשו פונים אל הגוף של אימא. (טוסיק "יונק" מהשד השני)
- ❖ האוזן, הכתף והאגן של התינוק בקו ישר.
- ❖ התינוק צמוד לאימא.
- ❖ אימא תומכת את השד, אך לא מזיזה אותו ממקומו!



מתי הנקה אינסטינקטיבית לא מתאימה

- לעיתים, אחרי ניתוחים קיסריים, המיקום של התפרים לא מאפשר לתינוק להיות בתנוחה מאונכת – שהיא תנוחת המוצא של "הריקוד". מבנה מאתגר של השד לעיתים לא מאפשר לתינוק למצוא בעצמו את הפיטמה. במקרים כאלה אפשר לחזור להשתמש בתנוחות ההנקה השונות.

Cross-cradle hold



*התינוק צריך לפתוח פה רחב.

*כאשר התינוק פותח את פיו קרבי אותו אל השד בתנועה מוחרד כך שהפה יגיע לשד כשהוא פתוח בצורה מריבית.

*קרבי את התינוק לשד על ידי דחיפה עדינה (אך החלטית) באזור השכמות, כך שגופו יתיישר וראשו יטה מעט אחורה

כיוני את השפה והלסת התחתונים של התינוק רחוק. ככל האפשר מבססים הפטמה כאשר הוא פותח את פיו כך שהוא יכניס לתוך פיו כמה שיותר רקמות שד.

לאחר שתפס שפתו העליונה תהיה קרובה לפטמה והחילה תראה מעליה

תנוחה "קלאסית" - ערסול

בתנוחה זו, למרות היותה השכיחה והמוכרת, קשה להגיע להצמדה נכונה, כשהתינוק ואמו עדיין "לומדים"...

חשוב לשים לב:

- הראש בהמשך לשד מלמטה.
- אף מול הפטמה.
- ראש התינוק על אמת היד של אמא, ולא בשקע המרפק.



תנוחה "קלאסית" - ערסול

- אחיזת העריסה דומה לעריסת האחיזה צולבת, אבל את תומכת את התינוק עם הזרוע באותו הצד, ולא יד הנגדית.
- לשבת זקוף - רצוי בכיסא עם משענות. עריסת התינוק שלך ביד, עם ראשו של התינוק שלך נח בעיקול המרפק שלך בזמן שהוא או היא עומדת בפני החזה שלך.



תנוחת צד (Football)

גם זו תנוחה מצוינת להתחלה. מתאימה מאוד אחרי ניתוח קיסרי וגם לאמהות עם שדיים גדולים.

חשוב לשים לב שהתינוק יהיה מספיק אחורנית. כך שראשו יהיה בהמשך לשד, מלמטה ואפו מול הפטמה.



Cradle hold






Football hold



- החזיקי את תינוקך בצדי הגוף שלך, עם המרפקים כפופים.
- עם היד הפתוחה שלך, תתמכי בראשו של התינוק והצמידי אותו לכיוון החזה.
- עורף התינוק ינוח על זרועך.
- תמכי בחזה שלך עם היד השנייה בצורת C
- לנוחות, לשים כרית על הברכיים שלך ולהשתמש בכיסא עם זרועות רחבות, נמוכות.



- שכבי על הצד שלך והצמידי את התינוק לכיוון החזה שלך, כאשר הוא שוכב על צידו ואת תומכת בו עם יד אחת.
- עם היד השנייה, אחוזי בשד שלך ואפשרי לפטמה לגעת בשפתיים של תינוקך.
- ברגע שהתינוק שלך תפס, השתמש ביד התומכת כדי להצמיד אותו אליך
- המשיכי לתמוך בגופו עם היד הנגדית



הנקה בשכיבה

תנוחה טובה המאפשרת לאמא לנוח תוך כדי הנקה.



מומלץ להיניק בתנוחה זו רק אחרי שאמא והתינוק "ילמדו את העבודה" וכבר מצליחים להתחבר לשד ללא קושי.

"תנוחה למתקדמים"....



Side-lying hold



צפי בתינוק לגילוי סימנים של חיבור יעיל

- פה פתוח רחב
- שפתיים פתוחות
- סנטר נוגע בשד
- חיבור אסמיתרי (יותר עטרה נראית מעל פה התינוק)



צפי באם לגילוי סימנים של מעבר חלב:

- השד מתרכך בזמן ההנקה.
- הרגעות או התנמנמות.
- צמא.
- התכווצויות ברחם או זרימת דם לידה בזמן או לאחר ההנקה.
- נזילת חלב מהשד הלא מניק בזמן ההנקה.
- הארכת הפטמה אבל ללא צביטה או שפשוף לאחר ההנקה

צפי בתינוק לגילוי סימנים של מעבר חלב:

- בדיקת קצב מציצה/בליעה/נשימה עם הפסקות מחזוריות.
- שמיעת בליעות.
- ידיים וזרועות רפויות.
- פה לח.