β-токоферол – 0,4; γ-токоферол – 0,1; δ-токоферол – 0,01; α-токотриенол – 0,3; β-токотриенол – 0,05; γ- и δ-токотриенолы – 0,01 [16].

Энергетическая ценность. В настоящем издании, как и в предшествующих справочниках [1, 2, 6], приняты следующие коэффициенты расчета энергетической ценности основных пищевых веществ (см. таблицу А).

Отсутствие показателя в таблице означает, что в этой группе продуктов данное пищевое вещество не определяется использованным методом или содержится в количестве, не имеющим значения с точки зрения гигиены питания. При отсутствии надежных данных о содержании пищевого вещества, входящего в перечень представленных показателей, в таблице ставится прочерк.

Таблица А. **Энергетическая ценность основных пищевых веществ**

Пищевое вещество	Энергетическая ценность, ккал/г
Белки	4,0
Жиры	9,0
Углеводы*	4,0
Сумма моно- и дисахаридов, определенная экспериментально	3,8
Ксилит, сорбит	2,4***
Крахмал, определенный экспериментально	4,1
Этиловый спирт (этанол)	7,0
Пищевые волокна	0
Органические кислоты**	
Уксусная	3,5
Яблочная	2,4
Молочная	3,6
Лимонная	2,5
Винная	0

Примечания:

* Рассчитываются вычитанием из содержания сухого остатка продукта суммы содержания белков, жиров, пищевых волокон и золы. При расчете энергетической ценности пищевых продуктов учитывалось только суммарное содержание углеводов.

** Для неизвестной кислоты или смеси кислот используют коэффициент 3,0.

*** По таблицам McCance and Widdowson [14].

ДОСТОВЕРНОСТЬ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТАБЛИЦАХ

Весьма важной является проблема достоверности представленных величин показателей, т. е. насколько табличные данные могут отличаться от фактических, полученных экспериментально в конкретном образце продукта или блюда.

В Таблицах впервые приводятся расчетные данные по достоверности размещенных в них сведений о пищевой ценности продуктов.

Достоверность значений складывается в основном из трех компонентов: достоверности метода определения данного компонента, биологической особенности продукта и вариации состава при выработке и хранении продукта (технологическая особенность производства).

Достоверность методов определения

Достоверность методов определения устанавливается только экспериментально.

В результате четырехлетней работы более 60 лабораторий стран, входивших в СССР, в межлабораторном эксперименте, выполненном по рекомендациям ИСО, впервые были установлены метрологические характеристики методов, определяющих пищевую ценность продуктов питания, включенных в настоящие Таблицы [15]. Точные значения допустимого абсолютного (R) и относительного межлабораторного расхождения (RR), в зависимости от использованного метода, приведены в опубликованном Руководстве.

Поясним определения, использованные в соответствии с терминологией, принятой в Руководстве [15]:

- межлабораторная воспроизводимость, или R, представляет собой допустимое расхождение результатов испытаний одного и того же образца, выполненных в двух разных лабораториях при P = 0,95. Вычисляется из стандартного отклонения (Sr) при P = 0,95 по формуле R = 2,8Sr.
- относительная межлабораторная воспроизводимость, или RR, представляет собой отношение межлабораторной воспроизводимости к среднему арифметическому значению результатов испытаний одного и того же образца, выполненных в двух разных лабораториях, выраженное в процентах от среднего арифметического значения.

В общем виде полученные данные показали, что метрологические характеристики сильно зависят от концентрации исследуемого компонента. Чем ниже его концентрация, тем допустимые межлабораторные расхождения больше, и они растут, по правилу Горвитца, в логарифмической зависимости.

Для макрокомпонентов при их содержании в продукте более 3%, в первую очередь для белков, жиров, углеводов, абсолютная межлабораторная воспризводимость (R), как правило, составляет максимально:

- для жиров до 0,6–1,2%;
- для белков до 1,25%;
- для углеводов (крахмала и сахаров) до 1,0–1,2%.

Для большинства продуктов с содержанием макрокомпонентов более 3%, допустимая относительная межлабораторная воспризводимость (RR) составляет, как правило, около 6%, при более низком содержании (менее 3%) – до 8%.

В настоящих Таблицах для характеристики достоверности данных было использовано понятие *вариабельности* (CV_R), которая численно равна относительному среднеквадратичному отклонению, т. е.

$$CV_R = Sr/n, \text{ при } P = 0,68,$$

где n – среднее арифметическое.

Так, например, при содержании макрокомпонентов в продукте более 3% CV_R составляет в среднем около 2%, для концентраций менее 3% CV_R равно 3%.

Вариабельность табличных данных, в отличие от аналитических результатов, рассчитывается при надежности P = 0,68, т. к. величина вариабельности служит только для оценки достоверности помещенных в Таблицах результатов [4, 21].

Для микрокомпонентов, в том числе для компонентов жиров (НЖК и холестерина) и для большинства минеральных веществ, представленных в Таблицах (Na, K, Ca, Mg, P), при содержании их в продукте от 0,1 до 1,0% межлабораторная воспризводимость находится в пределах 30–40% (CV_R = 11–14%, в среднем 13%), а для концентраций от 0,01 до 0,1% – в пределах 40–50% (CV_R = 14–18%, в среднем 16%). Для микроэлементов, в том числе Fe, при содержании менее 0,01% (менее 10 мг%) межлабораторная воспризводимость достигает 60% (CV_R = 21%) и выше. Для витаминов, находящихся в продуктах в концентрациях от 0,01 до 10,0 мг%, межлабораторная воспризводимость чаще всего находилась, в зависимости от метода анализа, в пределах 35–60% (CV_R =12–21%, в среднем 17%).

Для пищевых волокон, занимающих по содержанию в продуктах промежуточное положение между макро- и микрокомпонентами (от 0,1 до 10%), величина RR в зависимости от концентрации находится в пределах 25–40% (CV_R = 9–14%, в среднем 12%).

Биологическая зависимость

Это весьма важный показатель, т. к. от его значения в основном зависят пределы колебаний средних данных, помещенных в Таблицах. Эти данные принято выражать (при P = 0,68) в соответствующих величинах коэффициента вариации – CV_B.

Биологическая зависимость для растительных продуктов отражает особенности сорта, агрохимических условий возделывания, климата и т. д.; для животных продуктов – особенности породы, кормления и т. д.

При статистической обработке многолетних данных анализа однотипных продуктов из разных регионов страны, полученных по одной и той же методике и в одной лаборатории Института питания РАМН, выявилось, что при содержании белка в продуктах более 3% (мясные, рыбные, бобовые, зерновые и большинство молочных продуктов) величина CV_B колеблется в пределах 3–7%, в среднем 5%. В растительных продуктах с содержанием белка менее 3% биологическая изменчивость белка примерно в 2 раза выше, и CV_B достигает 6–14%, в среднем 10%. Биологическая изменчивость содержания жира во всех продуктах несколько выше, чем белка, и CV_B достигает в животных и богатых (содержание в продукте свыше 3%) жиром растительных (в зерновых и бобовых) продуктах 5–10%, в среднем 8%, а в овощах и фруктах, в которых жира содержится менее 3%, CV_B в среднем 12%. Биологическая изменчивость содержания углеводов в растительных продуктах при содержании более 3% примерно такая же, как и жира: CV_B составляет 5–10%, в среднем 8%, при более низком содержании CV_B = 12%. Для минеральных веществ биологическая изменчивость также примерно в 2 раза выше методической и CV_B достигает, в зависимости от вида продукта, природы элемента и концентрации, в среднем 26% при концентрации свыше 0,1%; при более низком содержании, в пределах 0,1–0,01%, CV_B = 36%, а для еще более низких концентраций CV_B = 42%. Для витаминов биологическая изменчивость несколько выше, чем для минеральных веществ, из-за сильного влияния на их содержание степени созревания, сорта и т. д., и CV_B достигает 25–45%, в среднем 35%. Для пищевых волокон CV_B = 24%.

Особенно сильная биологическая зависимость наблюдается у рыбы и продуктов моря. Пищевая ценность рыбы одного и того же вида зависит от места ее обитания, сезона, года вылова и даже ее размеров, что в первую очередь отражается на содержании жиров и жирозависимых компонентов (например, жирорастворимых витаминов). В результате, содержание жира и витамина А в некоторых видах рыб может колебаться в десятки раз [24], и данные в Таблицах в этих случаях дают представление лишь о порядке содержания.

Технологическая особенность производства

Эта область вариабельности CV_P касается только готовых продуктов, подвергшихся технологической обработке, смешиванию с другими пищевыми продуктами, хранению и т. д. Действительно, при изготовлении готовых кулинарных блюд, большинства консервов и кондитерских изделий допускаются замены в рецептуре одного или нескольких пищевых продуктов, изменения параметров обработки, что несомненно влияет на химический состав конечного пищевого продукта. Однако для макрокомпонен-

тов (белков, жиров, углеводов) эти колебания не могут превышать 5%, иначе продукт должен иметь другое название. Для минеральных веществ и пищевых волокон допустимые отклонения – не более 10%. Витамины (особенно витамин С) могут разрушаться в зависимости от использованной технологии, оборудования и условий хранения более значительно, CV_P от 20 до 60%, в среднем 40%, в том числе для витамина С – 60%. Общие потери витаминов могут достигать почти 90% (см. табл. В).

Общая вариабельность данных в Таблицах

Общая вариабельность данных в Таблицах (CV_T) складывается:
для сырьевых продуктов – как сумма методической и биологической вариабельности

$$CV_T = \sqrt{CV_R^2 + CV_B^2}$$

для кулинарных и готовых промышленных изделий

$$CV_T = \sqrt{CV_R^2 + CV_B^2 + CV_P^2}$$

В таблице В приведены итоговые данные (общая вариабельность CV_T) с учетом вышеприведенных значений различных видов вариабельностей.

Таблица В. **Вариабельность данных, представленных в Таблицах 1–12**

Пищевые вещества	**CV_R**	**CV_B**	**CV_P**	**CV_T для сырьевых продуктов**	**CV_T для кулинарных и подобных изделий**
Белки					
>3%	2	5	5	5	7
<3%	3	10	5	10	12
Жиры					
>3%	2	8 (у рыб 40)	5	8 (у рыб 40)	10 (у рыб 40)
<3%	3	12 (у рыб 40)	5	12 (у рыб 40)	13 (у рыб 40)
Углеводы					
>3%	2	6	5	8	10
<3%	3	12	5	12	13
Минеральные					
вещества					
Na, Ca					
K, Mg, P, Fe					
>0,1%	13	26	10	29	31
0,1–0,01%	16	32	10	39	41
<0,01%	21	42	10	47	48
Пищевые волокна	10	20	10	27	29
Витамины	17	35 (витамин А у рыб, витамин С и β-каротин в растительных продуктах до 50)	20 (витамин С в растительных продуктах до 70)	39 (витамин А у рыб, витамин С и β-каротин в растительных продуктах до 53)	44 (витамин С в растительных продуктах до 87, витамин А у рыб до 56)
Холестерин					
>1,0%	7	14	10	16	19
0,1–1,0%	11	22	10	25	27
<0,1%	17	34 (у рыб до 40)	10	38 (у рыб 43)	39
НЖК					
>1%	8	16	10	18	20
<1%	12	24 (у рыб до 50)	10	26 (у рыб до 51)	29 (у рыб 61)

Ранее нами были проведены ориентировочные расчеты вариабельности данных в Таблицах [4]. Однако тогда не был известен весьма существенный компонент вариабельности – аналитический. Как видно из таблицы В для основных пищевых веществ, аналитическая вариабельность составляет 20–28%, в среднем 24% от общей табличной вариабельности; для микрокомпонентов она почти в 2 раза выше – от 38 до 43%, в среднем 41%. Поэтому без экспериментального установления этого показателя все ранее произведенные расчеты были недостаточно точными.

Отмечено увеличение вариабельности показателей в кулинарных изделиях и готовых промышленных продуктах (табл. В). Это увеличение в дальнейшем может быть и выше из-за все большего распространения в отечественной пищевой промышленности патентования рецептуры и закрытости информации о замене пищевого сырья. (В импортной продукции это вообще является коммерческой тайной).

Обращаем внимание, что приведенные в таблице В данные носят в общем оценочный характер и точное установление CV_T для конкретного изделия и конкретного метода определения может существенно снизить его значение.

КОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТАВУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Для облегчения пользования Справочником впервые введены продуктовый и гигиенический коды.

Код состоит из двух разделов: классификация по группам однородной пищевой значимости и по роли в обеспечении суточной потребности человека.

Продуктовый код

Классификация по группам однородной пищевой значимости (продуктовый код) выражается цифровыми индексами.

По этой системе классификации каждый продукт имеет четыре цифровые позиции, разделенные точками.

Все продукты разделены на 12 групп. Первая позиция кода обозначает номер основной группы. Эта градация в принципе соответствует классификации ЕВРОКОД-2. Вторая позиция кода, отделенная от первой точкой, обозначает подгруппу, существенно отличающуюся от других подгрупп природой сырья или технологией производства. Третья позиция кода, отделенная от предыдущей точкой, обозначает *под*подгруппу, существенно отличающуюся от других *под*подгрупп определяющим пищевым компонентом в продукте. Непосредственно продукт обозначает последняя позиция кода, и его номер в *под*подгруппе отделен от предыдущих позиций кода точкой.

Гигиенический код

Пользователю Таблиц часто бывает нужно без сложных расчетов узнать, насколько тот или иной продукт может удовлетворять суточную потребность человека в основных пищевых веществах. В принципе это определяется врачами-диетологами или технологами производства путем сопоставления количества интересующего пищевого вещества в продукте с суточной потребностью в нем.

Поскольку в Таблицах принято выражать все данные на 100 г съедобной части, то вначале рассчитывают содержание пищевого вещества в *одноразовой порции* продукта. Затем сопоставляют его с суточной потребностью и решают, насколько значим этот вклад. Он может быть низким, удовлетворительным или высоким. Далее врач-диетолог, в зависимости от результатов полученных расчетов, составляет меню для конкретного человека, а технолог, если он хочет создать продукт с определенными пищевыми свойствами, соответствующим образом изменяет технологию и рецептуру продукта.

ОДНОРАЗОВАЯ ПОРЦИЯ ПРОДУКТА

В литературе имеются многочисленные рекомендации по величине «одноразовой порции» того или иного блюда, например, подобные рекомендации существуют в США [8, 22]. По рекомендации FDA одноразовой может считаться порция, которая нормально может быть съедена за один прием пищи.

В ранее изданных Таблицах все данные были приведены на 100 г съедобной части продукта. Поэтому для того, чтобы оценить вклад того или иного продукта в обеспечение суточной потребности в пищевых веществах, был сделан пересчет на условную «одноразовую порцию», величина которой ориентирована на опыт системы общественного питания, используемой на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях.

Одноразовая порция – величина довольно условная и вариабельная. Она зависит в первую очередь от традиций питания, от профессиональной нагрузки, пола, возраста и, конечно, от индивидуальных особенностей человека. Предприятия общественного питания (столовые, кафе), обеспечивавшие в свое время питание 70% населения страны, разработали наиболее популярные рецепты блюд и наиболее удобные для потребителя величины одноразовых порций этих блюд. Эти сведения для основной массы столовых, кафе и ресторанов обобщены в действующем до сих пор «Сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания» [18]. Рецептура большинства этих блюд без существенных изменений перенесена в более новый 2-х томный справочник [19], но мы будем обращаться к первоисточнику. Химический состав наиболее распространенных блюд, рецептуры которых описаны в «Сборнике рецептур», в свое время был экспериментально определен и затем опубликован в справочнике «Химический состав блюд и кулинарных изделий» [6]. Поэтому в основу расчета величины «одноразовой порции» блюда или продукта были положены рекомендации «Сборника рецептур» [18] и данные справочника [6]. При этом следует учесть, что в «Сборнике рецептур» в некоторых случаях расчет порций предусматривает использование цельного готового продукта, включающего и несъедобную часть (например, кости в некоторых мясных и рыбных блюдах), тогда как в справочнике [6] и в данном Справочнике расчеты химического состава приведены только для съедобной части. Величины несъедобной части исследованных продуктов приведены в Приложении 1 Справочника (стр. 201). Необходимо так же учесть, что характеристики готовых блюд (химический состав и величина порций) в настоящем Справочнике, так же как и в справочнике [6] для блюд, подвергшихся тепловой обработке, приведены только для основного продукта. Поэтому, например, отварные мясные и рыбные продукты или сметана, добавляемые в некоторые супы только перед отпуском блюда, не учитывались, так же как и добавление перед отпуском в некоторых кашах и гарнирах масла или специй. Гарниры и соусы, приготовляемые отдельно от основного блюда (в основном мясного и рыбного), также при расчете конкретной рецептуры не учитывались – их состав и количество приведены в других разделах Справочника, и при расчете полного блюда их необходимо суммировать с основным продуктом.

В 1989 г. под редакцией Украинского НИИ общественного питания и Института питания РАМН выпущен «Сборник рецептур блюд диетического питания для предприятий общественного питания» [8], в котором величины одноразовых порций для некоторых блюд были несколько изменены.

Институт питания РАМН в последние годы проводил обследование индивидуального (семейного) питания населения в различных регионах страны, в том числе изучал величины одноразовых порций. С учетом опыта общественного и индивидуального питания были разработаны значения *условных* «одноразовых порций» блюд и продуктов, которые в обобщенном виде представлены в таблице С. При этом числовые значения из сборников [8] и [18] и справочника [6] взяты как *примеры наиболее типичных* величин. Так же следует относиться к величинам «одноразовых порций», принятым в настоящем Справочнике. Поэтому для некоторых продуктов в таблице С дается разброс значе-

ний съедобной порции, при этом точный вес порции приводится в специальной строке для конкретного блюда или продукта.

Специально подчеркиваем, что химический состав сырьевых продуктов, которые непосредственно в питании не используются (специи и другие труднонормируемые пищевые продукты) приводятся только в расчете на 100 г съедобной части.

С другой стороны, в настоящих Таблицах для супов, некоторых кондитерских изделий и др. блюд, для облегчения учета разнообразия традиций питания в России, приводится химический состав для двух весовых вариантов величины одноразовой порции.

Таблица С. **Масса одноразовых порций, в г**

Раздел	Продукт	Порция на готовый продукт по [18]	Порция на съедобную часть готового продукта по [6]	Порция, принятая в настоящем Справочнике
Молочные блюда	Питьевое молоко и кисломолочные продукты	200	200	200
	Сливки на порцию	100	–	100
	Сметана на заправку супов, гарниров и салатов	20–30	20–30	20–30
	Молочные супы	250–500	500	250 и 500
	Блюда из творога	100–200	125–200	125–200
	Сыры			50
Блюда из яиц	Отварное яйцо	40	40	40
	Яичница	80–120	80–115	80–115
	Омлет	85–175	85–175	85–175
Мясные блюда	Консервы	50	–	50
	Гастрономические изделия	мясо 30–50 хлеб 30–50	30–50	30–50
	Колбасы	40–50	20–50	20–50
	Готовые блюда: натуральные	50–75 мясо, гарнир 150 и соус 50	50–75 без гарнира и соуса	50–75
	Рубленые	50–75 мясо, гарнир 150 и соус 50	50–75 без гарнира и соуса	50–75
	Смешанные блюда или фаршированные зерновыми или овощными продуктами	100–320	100–320	100–320
	Супы	250–500 без закладки отварного мяса из расчета 25–50 г на 500 г супа и сметаны 20	500 без закладки отварного мяса и сметаны	250 и 500
Рыбные блюда	Консервы	50	50	50
	Гастрономические изделия	50–100 рыба, 30–50 хлеб или гарнир	50–100, в том числе 30–50 хлеб или гарнир	20–50
	Готовые блюда: натуральные	рыба 75 гарнир 150 соус 50	75, без гарнира и соуса	75
	Фаршированные	235–285	235–285	235–285
	Супы	250–500 без закладки отварной рыбы из расчета 25–50 г на 500 г супа и сметаны 20	500 без закладки отварной рыбы и сметаны	250 и 500
Жировые продукты	Масло сливочное и маргарины отдельными порциями или на подливку в каши и гарниры	10–15	10	10
	Масло растительное	10–20	10–20	20
	Майонезы	35	35	35

Продолжение табл. С

Раздел	Продукт	Порция на готовый продукт по [18]	Порция на съедобную часть готового продукта по [6]	Порция, принятая в настоящем Справочнике
Зерновые и хлебобулочные изделия	Каши как самостоятельные блюда	260–310	260–310	310 – каши жидкие и вязкие 260 – каши рассыпчатые
	Каши как гарниры	150	–	150 – каши рассыпчатые
	Изделия из каш	250 со сметаной 30 и соусом 50	230–310 без сметаны и соуса	230–310
	Супы	250–500 без сметаны	500	250 и 500
	Хлебобулочные изделия свежие	–	–	50
	Изделия сухие или имеющие пониженную, по сравнению со свежим хлебом, влажность (типа галет)	–	–	30
Изделия из бобовых	Гарниры	150–300	200–300	150
Изделия из овощей	Салаты и винегреты из свежих овощей	100–150 с заправкой сметаной или соусом	100–150	150 – как самостоятельные блюда, 100 – как гарниры
	Кулинарно обработанные овощные и картофельные гарниры с соусом или сметаной	150	–	150 – как гарниры
	Овощные и картофельные самостоятельные блюда с соусом или сметаной	150–280	250–280	250
	Супы	250–500 без сметаны	500 без сметаны	250 и 500
Фрукты и ягоды	Свежие	100	100–250	100–250
	Изделия из свежих фруктов и ягод	30–265	30–190	30–200
Кондитерские и сахаристые изделия	Сахар порционный	15–30	–	15
	Варенье, джем, повидло	30	–	30
	Конфеты карамель	–	–	15 и 30
	Шоколад и шоколадные конфеты	–	–	30
	Торты и пирожные	–	–	65–100
Напитки	Соки	100–200	–	200
	Компоты	200	–	200
	Фруктово-овощные напитки	150–200	–	200
	Чай	200–215	–	200
	Кофе	140–200	–	200
	Безалкогольные напитки	–	–	200
	Минеральные воды	–	–	200
Разное	Соусы	50–75	–	50

Массы одноразовой порции, приведенные в табл. С, рекомендованы для взрослого трудоспособного населения страны. Однако в детском или лечебном питании, питании пенсионеров или лиц, работа которых связана с тяжелой физической нагрузкой, или в индивидуальном питании лиц со специфическими привычками в эту величину могут быть самостоятельно внесены для некоторых продуктов и блюд определенные коррективы и проведены соответствующие расчеты.

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ

Суточная физиологическая потребность среднего жителя страны зависит от многих факторов, в том числе от образа жизни, физической активности, климата, пола и возраста. Так, для нашей страны с большой долей физически активного населения, с относительно прохладным климатом и соответствующими особенностями в потреблении основных пищевых веществ общая потребность в калориях для среднего жителя установлена в 2500 ккал (см. СанПиН 2.3.2.560-02 [13] для условного (среднего) человека). В других странах, отличающихся климатом и образом жизни населения, эти нормативы также несколько отличаются. Например, в США для основной массы населения, испытывающего не очень сильные физические нагрузки, Американской Национальной Академией Наук (при одобрении FDA) установлена суточная потребность в 2000 ккал с некоторыми отличиями от российских рекомендаций в потреблении некоторых пищевых веществ [8]. Американские рекомендации исходят из представления, что жиры в ежедневной диете должны составлять 30% калорийности, белки – 10%, углеводы – 60%, потребление пищевых волокон также зависит от калорийности (11,5 г на 1000 ккал). Тогда как *допустимое* потребление холестерина (300 мг), натрия (2400 мг) и потребность в калии (3500 мг), по американским рекомендациям, не зависят от калорийности рациона. Хотя в США имеются рекомендации для разной ежедневной калорийности рациона (в основном, 1600, 2000, 2500 и 2800 ккал), в большинстве случаев, в том числе *при обозначении пищевой ценности на этикетке* продукта, расчет ведется на 2000 и 2500 ккал.

Комиссия Кодекс Алиментариус [11] для условного «среднего» жителя планеты установила норму потребности в энергии на 2300 ккал, с несколько иной, чем в России и США потребностью в ряде пищевых веществ.

Для расчета потребности в веществах в данном Справочнике взяты официально утвержденные в России нормативы [13] в расчете на потребление 2500 ккал и – в случаях отсутствия – рекомендации ВОЗ и Американской Национальной Академии Наук [8] на 2500 ккал (таблица D). В этой же таблице приведены данные Американской Национальной Академии Наук (одобренные FDA) для диеты в 2000 и 2500 ккал [8], а также некоторые рекомендации Комиссии Кодекс Алиментариус [11].

Из этих данных видно (табл. D), что по большинству пищевых веществ (кроме белка) суточная потребность, установленная в нашей стране, более близка к рекомендациям FDA, чем к Комиссии Кодекс Алиментариус.

В Таблицах произведен предварительный расчет удовлетворения суточной потребности 100 г продукта или одноразовой порции для всех продуктов, и результаты расчетов выделены в специальной графе.