

FUSIFAR - B

Ácido fusídico - Betametasona

Antibiótico - Antiinflamatorio esteroide tópico

Crema

Vía de Administración: Tópica

FÓRMULA

Cada 100 gramos contiene:

Ácido Fusídico.....	2 g
Betametasona (como 17-Valerato)	0,10 g
Excipientes.....	C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

FUSIFAR B crema asocia la acción antibacteriana tópica del **Ácido Fusídico** y la acción antiinflamatoria y antipruriginosa de la Betametasona Valerato.

El **Ácido Fusídico** es activo frente a Estafilococo, Estreptococo, Neisseria, Corynebacteria, Haemophilus, Moraxella, Clostridium, Bacteroides fragilis; también tiene alguna actividad frente a Mycobacterium tuberculosis, M. leprae y protozoos. El valerato de **Betametasona** es un esteroide de acción tópica que posee una acción rápida en las dermatopatías inflamatorias, aún en los casos en que éstas sean refractarias a otros tratamientos.

INDICACIONES

Este medicamento está indicado en el tratamiento de dermatopatías inflamatorias, en las cuales existe o puede presentarse una infección bacteriana. Las dermatopatías inflamatorias incluyen ecema atópico, ecema discoide, ecema infantil, ecema por exátesis, ecema de conducto auditivo externo, ecema infectado del área vestibular nasal, dermatitis seborreica, dermatitis por contacto, liquen simple crónico, psoriasis, lupus eritematoso discoide.

POSOLOGÍA

La dosis usual recomendada es:

Adultos y población pediátrica: Aplicar una pequeña cantidad de crema, en capas finas sobre el área afectada, dos o tres veces al día, durante un máximo de 14 días.

Oclusión del área afectada en adultos:

En adultos, el tratamiento de lesiones más resistentes, puede reforzarse aplicando este medicamento con vendaje oclusivo. En estos casos, la oclusión nocturna se considera, por regla general, una opción adecuada. La oclusión del área afectada debe evitarse en la población pediátrica.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al **Ácido Fusídico**, la **Betametasona** (como valerato) o a alguno de los excipientes de la fórmula.

- Infecciones fúngicas sistémicas.
- Infecciones cutáneas primarias causadas por hongos, virus o bacterias no tratadas o no controladas mediante un tratamiento adecuado.
- Manifestaciones cutáneas relacionadas con tuberculosis no tratadas o no controladas mediante un tratamiento adecuado.
- Dermatitis perioral y rosácea. Acné.
- Otitis media crónica o antecedentes de ésta. Otitis media en niños. Perforación de la membrana del tímpano.

REACCIONES ADVERSAS

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes de la fórmula. El tratamiento prolongado e intensivo puede causar cambios atróficos locales de la piel (estrias cutáneas, delgadez de la piel y dilatación de los vasos sanguíneos superficiales (telangectasia), particularmente si se utiliza un vendaje oclusivo o si hay pliegues), sensación de quemazón en la piel, prurito, eccemas, irritación, erupción cutánea (rash, incluyendo rash eritematoso y generalizado), eritema, urticaria, rosácea, angioedema, folliculitis, hipertricosis, hiperhidrosis, sequedad cutánea, dermatitis perioral, dermatitis de contacto, dermatitis acneliforme y despigmentación. También puede aparecer equimosis tras el uso prolongado de corticosteroides tópicos. Debido a la aplicación

prolongada o extensa sobre todo sobre vendaje oclusivo, su absorción puede producir hiperadrenocorticismos y supresión adrenal. Aumento de la presión dentro del ojo y glaucoma, especialmente si se aplican cerca de los ojos durante tiempo prolongado. Conjuntivitis. Visión borrosa. Dolor en el lugar de aplicación, irritación en el lugar de aplicación, hinchazón en el lugar de aplicación y vesículas en el lugar de aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- El uso de FUSIFAR - B se debe limitar a 14 días. El tratamiento a largo plazo puede resultar en un mayor riesgo de efectos adversos.
- Debe utilizarse con precaución en niños y adolescentes ya que pueden presentar mayor susceptibilidad a desarrollar el síndrome de Cushing al presentar una mayor absorción a través de la piel. Deben evitarse tratamientos prolongados, la aplicación de grandes cantidades de medicamento y la oclusión del área afectada.
- Cuando se aplica en zonas extensas durante un tiempo prolongado y/o con vendajes oclusivos, puede producirse hiperadrenocorticismos, especialmente en niños, y simultáneamente puede presentarse supresión del eje hipotálamo-adrenal.
- Se ha comunicado la aparición de cepas resistentes con la utilización de **Ácido Fusídico** por vía tópica. Como sucede con todos los antibióticos, el uso generalizado o repetido puede aumentar el riesgo de que se produzca una resistencia al antibiótico.
- FUSIFAR - B contiene un corticosteroide con un efecto inmunosupresor, y por ello, su utilización puede asociarse a un aumento de susceptibilidad a infecciones, al agravamiento de una infección ya existente y la activación de una infección latente. Se recomienda cambiar a un tratamiento sistémico si la infección no puede controlarse mediante el tratamiento tópico.

INTERACCIONES

No existen datos sobre antagonismo en los efectos de la Ciprofloxacina al ser administrada con **Ácido Fusídico**. Las interacciones entre las penicilinas y el **Ácido Fusídico** son complejas.

SOBREDOSIS

No existen datos de sobredosisificación. El síndrome de Cushing y la insuficiencia adrenocortical pueden desarrollarse tras la administración tópica de corticosteroides en grandes cantidades o durante más de tres semanas.

TRATAMIENTO

Debería limitarse al tratamiento sintomático y de soporte.

RESTRICCIÓN DE USO

Este medicamento no debe utilizarse durante el embarazo, su médico valorará el beneficio del tratamiento para la madre y el riesgo para el niño. Este medicamento puede utilizarse durante la lactancia, pero se recomienda evitar la aplicación del medicamento en las mamas.

Los estudios realizados con corticosteroides en animales han mostrado toxicidad para la reproducción, fisura del paladar, malformaciones esqueléticas y bajo peso al nacer.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30°C

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 1 pomo x 15 gramos de crema

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaaaveda y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13



**LABORATORIOS
INDUFAR**
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535