



# **Dermafar** *Crema*

**Vitamina A - Vitamina D3 - Ácido Bórico  
Óxido de Zinc.**

**Cicatrizante y regeneradora de los tejidos,  
tratamiento de la dermatitis del pañal, quemaduras,  
irritaciones, picazón, sarpullido**

**Vía de administración: Tópica Dérmica**

## **FÓRMULA**

Cada 100 gramos de crema contiene:

Vitamina A ..... 600.000 U.I.

Vitamina D3..... 62.800 U.I.

Ácido Bórico ..... 2 g

Óxido de Zinc ..... 15 g

Excipientes: Lanolina 21000 mg; Otros Excipientes c.s.

## **ACCIÓN TERAPÉUTICA**

**DERMAFAR CREMA** está destinada a proteger la delicada piel del bebé contra las irritaciones, dermatitis amoniacal del pañal y la higiene diaria de los niños. Posee además una acción regeneradora de los tejidos, ayudando a una perfecta cicatrización.

## **INDICACIONES**

Tratamiento de la dermatitis amoniacal del pañal, sarpullido. Tratamiento de cicatrización en las grietas del pezón de las madres, quemaduras de primer grado por agentes externos, quemaduras solares, úlceras de decúbito, escaras, eczemasn rozamiento de la piel.

## **POSOLOGÍA**

### **Niños y lactantes:**

Después del cambio de la ropa, limpiar cuidadosamente la zona afectada, aplicar una pequeña película de la crema masajeando cuidadosamente 2 a 3 veces al día, hasta la total remisión de la sintomatología. De ser necesario cubrir con gasa esterilizada.

### **Adultos:**

Se procede de la misma manera, siempre limpiando la zona afectada y aplicando la crema de 2 a 3 veces al día.

**"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran"**

## **REACCIONES ADVERSAS**

Carece prácticamente de toxicidad y efectos secundarios. Ocasionalmente puede provocar reacciones alérgicas por sensibilidad a algunos de sus componentes, como Dermatitis irritativa.

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Evitar la aplicación en la piel lesionada con excoiaciones o sangrados. Ciertas personas pueden ser sensibles a algunos componentes de la crema y desarrollar una alergia o picazón.

**Embarazo:** La absorción sistémica de **Vitamina A** después del uso tópico es insignificante. Los datos sobre la exposición a la **Vitamina A** tópica durante el embarazo son actualmente insuficientes para evaluar los efectos potenciales. Se debe considerar la utilización de este medicamento durante el embarazo sólo si es estrictamente necesario, y se debe evitar el uso concomitante con otros medicamentos que contengan **Vitamina A**.

**Lactancia:** No utilizar en el pecho durante la lactancia para evitar la ingestión del medicamento por parte del lactante.

Este medicamento puede ser irritante y provocar reacciones en la piel porque contiene cloruro de benzalconio. Puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene lanolina.

### **CONTRAINDICACIONES**

Pacientes hipersensibles a uno de los componentes presentes en la formulación. No utilizar en mucosas o en la cercanía de los ojos.

### **INTERACCIONES**

La presente formulación no presenta interacciones significativas con otros fármacos ya que la absorción de sus principios activos a través de esta vía (tópica) es leve.

### **SOBREDOSIS**

En caso de ingestión accidental: puede producir vómitos, náuseas, cólicos.

En caso de contacto con los ojos: puede producir una irritación menor.

### **TRATAMIENTO**

En caso de ingestión accidental, inducir el vómito, beber agua para diluir el producto.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua tibia, durante 15 a 20 minutos, hasta que no quede evidencia del producto en los ojos.

Consulte a su médico si la irritación persiste.

### **RESTRICCIONES DE USO**

Por su forma de aplicación y acción no se han demostrado.

### **CONSERVACIÓN**

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

### **PRESENTACIONES**

Caja conteniendo 1 pomo con 35 gramos.

Caja conteniendo 1 pomo con 50 gramos.

Caja conteniendo 100 pomos con 35 gramos (Presentación Hospitalaria).

Caja conteniendo 100 pomos con 50 gramos (Presentación Hospitalaria).

Manténgase fuera del alcance de los niños

**Paraguay:** Venta Libre en Farmacias

**Bolivia:** Venta Bajo Receta

### **Paraguay:**

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**

Importado por: **IMFAR S.R.L.**

Santa Cruz - Bolivia

Teléfono 362-6640

Regente: Dra. Iblin Y. Ledezma C.

Matrícula N°: L-165

Reg. N°: II-24213/2019

 **LABORATORIOS  
INDUFAR**  
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por: **INDUFAR CISA**

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)

P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)

Teléfonos: 682 510 al 13