01 · Задачи машинного обучения

15.09.2026 · Постановка, kNN, признаки, оценка качества.

Задачи машинного обучения · 15.09.2026 · Постановка, kNN, обобщение · Опорные фрагменты: 00:25–00:55; 01:05–01:35.

Данные → модель → критерий

Выборка $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$, где $x_i \in \mathbb{R}^d$ — признаки объекта, y_i — целевая переменная. Матрица $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$: **объекты по строкам, признаки по столбцам**. Изображение 28×28 превращается в вектор из 784 чисел; RGB-изображение 100×100 — из 30 000.

Регрессия: числовой ответ, важна величина ошибки. **Классификация:** выбор одного из конечного набора классов. Счётчик проданных товаров дискретен, но обычно задаёт регрессию: ошибка на 1 и на 100 различна. Кластеризация ищет группы без известных меток; это другая постановка.

Обучение имеет смысл после выбора семейства $\mathcal{M}$ и функции потерь ℓ:

$$\hat{f} \in \arg\min_{f \in \mathcal{M}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ell(y_i, f(x_i)).$$

Параметры оцениваются внутри обучения; **гиперпараметры** задают его конфигурацию и выбираются внешней процедурой: k у kNN, степень полинома, сила регуляризации.

Параметрическая модель имеет фиксированное семейство f_θ и конечномерный θ. У непараметрической модели сложность представления может расти с выборкой. Непараметрическая ≠ «без настроек»: kNN имеет k, KDE — ширину окна.

Почему ответ случаен

Наблюдаются не все факторы; есть шум измерений и случайность среды. Поэтому одинаковым наблюдаемым x могут соответствовать разные Y. Задача — восстановить закономерность, а не буквально запомнить все метки.

> **«Лучшая модель» не определена без семейства, критерия и данных проверки.** Качество на обучении не отвечает на вопрос о новых объектах.

Базовая проверка качества

$$\text{Accuracy} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}\{\hat{y}_i = y_i\}.$$

Вычислять на объектах, не участвовавших в обучении. Малый train-loss при большом validation-loss — признак переобучения; большой loss в обоих случаях — недообучение либо недостаток признаков.

Разделять **train** для оценки параметров, **validation** для выбора настроек, **test** для финальной оценки. Повторный подбор по test превращает его в validation. Случайное разбиение уместно лишь при соответствующей природе данных; связанные объекты и временные данные требуют особого разбиения.

k ближайших соседей


Пусть $N_k(x)$ — индексы k ближайших объектов по расстоянию ρ. Классификация — голосование; регрессия — усреднение:

$$\hat{y}(x) = \arg\max_{c} \sum_{i \in N_k(x)} \mathbb{1}\{y_i = c\},$$


$$\hat{f}(x) = \frac{1}{k} \sum_{i \in N_k(x)} y_i.$$

Для весов $w_i(x) \geq 0$ голосование и среднее взвешиваются. Например, $w_i = \frac{1}{\rho(x, x_i)}$; при нулевом расстоянии нужно отдельно обработать совпадающие точки. Правило разрешения равенства голосов тоже часть алгоритма.

Малое k**:** локальность, сложная граница, чувствительность к шуму. **Большое** k**:** сглаживание, меньше случайных колебаний, риск недообучения. При $k = n$ получаем глобальное большинство или среднее; $k > n$ недопустимо.



1-NN: локальные «островки» и сложная граница. · 15.09 · 00:43:00



30-NN: более гладкая граница на тех же данных. · 15.09 · 00:45:00

Цена простоты

При полном переборе хранение $O(nd)$; вычисление расстояний для одного нового объекта $O(nd)$. Выбор k лучших добавляет стоимость отбора; полная сортировка — $O(n \log n)$, но сортировать всё необязательно. Обучение обычно сводится к сохранению данных; индекс может потребовать дополнительной работы. Быстрое обучение не означает быстрый inference.

Признаки и рабочий процесс · 15.09.2026 · Бейзлайны, масштабирование, EDA, KDE · Фрагменты: 01:35–02:15; 02:20–03:04.

Расстояния зависят от представления

Евклидова мера $\rho(x, z) = \sqrt{\sum_j (x_j - z_j)^2}$ складывает вклад координат. Признак в рублях может подавить признак в годах только из-за масштаба. Единицы измерения нельзя принимать за важность признака. **StandardScaler:** $z_j = \frac{x_j - \mu_j}{s_j}$. **MinMaxScaler:** $z_j = \frac{x_j - a_j}{b_j - a_j}$.

Все статистики вычислять **по train**. Для постоянного столбца нужна обработка нулевого знаменателя. Стандартизация не делает распределение нормальным; обе схемы чувствительны к выбросам.

> `fit_transform(train)` → `transform(validation/test)`. Нельзя заново обучать scaler, imputer или encoder на test. `Pipeline` фиксирует порядок; `ColumnTransformer` разделяет обработку типов признаков.

Проклятие размерности

При большом числе слабых или шумовых координат «ближайший» может перестать быть содержательно близким. Расстояния концентрируются, а для заполнения локальных окрестностей нужно всё больше данных. Неинформативные признаки ухудшают kNN; важны отбор, преобразование и предметно осмысленная мера. Одинаковое число координат ещё не означает одинаковую сложность задачи.

Бейзлайн — обязательная точка отсчёта

Сравнивать сложную модель с простым решением или текущим бизнес-правилом. Для классификации с частотами классов π_c:

- постоянный самый частый класс: ожидаемая accuracy $\max_c \pi_c$;
- равномерный случайный класс: $\frac{1}{K}$;
- случайный класс с вероятностями π_c: $\sum_c \pi_c^2$.

Эти формулы предполагают те же частоты на новых данных. Большая accuracy константы часто отражает дисбаланс, а не полезную модель. Для квадратичной потери лучший постоянный прогноз — среднее train-таргета; для абсолютной — медиана.

Пример MNIST

Развернуть пиксели в вектор → разделить данные → построить тривиальные и ручные правила → применить kNN → проверить влияние k. Ручной порог яркости центра выделяет отдельные цифры, но не решает всю задачу. Высокое качество kNN на MNIST не гарантирует пригодность для изображений вообще.

EDA: вопросы, а не набор графиков

1. Проверить смысл и типы столбцов, уникальность объектов, ошибки диапазонов, дубликаты.
2. Изучить пропуски: отсутствие может быть самостоятельным сигналом.
3. Посмотреть распределения таргета, дисбаланс классов и групп, редкие категории.
4. Проверить связи признаков с таргетом и друг с другом; сформулировать проверяемые гипотезы.
5. Создать осмысленные признаки: возраст из даты рождения, суммарные расходы, долю скидочных покупок.


Удаление выброса — решение по смыслу данных, не автоматическая реакция на удалённую точку. Неверный год рождения — ошибка; редкий реальный клиент — часть задачи. Уникальный ID обычно не полезен как числовая координата, но может выявить утечку или дубликаты. Корреляция и хороший прогноз не доказывают причинный эффект.

Ядерная оценка плотности

Для одномерных наблюдений $x_1, \ldots, x_n$ и ядра K:

$$\hat{p}_h(t) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{t - x_i}{h}\right), \quad h > 0.$$

$K \geq 0$, $\int K(u)\,\mathrm{d}u = 1$; вокруг каждой точки ставится масштабированное ядро, затем вклады усредняются. Это оценка **плотности**, не вероятности в точке. Вероятность интервала — интеграл плотности по интервалу.



Пунктир — вклады отдельных ядер; сплошная линия — их среднее. · 15.09 · 02:45:00

Малое h сохраняет локальные детали и шум; большое h сглаживает, но может скрывать моды. KDE помогает читать распределения на EDA, но сама по себе не объясняет происхождение зависимости.

Практический минимальный протокол

Задача и метрика → разбиение → EDA train → бейзлайн → предобработка → модель → настройка по validation → одна финальная оценка test.

Записывать не только качество, но также время обучения, время предсказания и память. Для реального времени высокая accuracy не компенсирует неприемлемую задержку. Сравнения делать на одном разбиении и одинаковой предобработке; фиксировать случайность, чтобы отделить эффект изменения от случайного разброса.

Перед выводом «модель улучшилась»: проверить отсутствие утечки, правильность метрики, сопоставимость выборок и преимущество над бейзлайном.

02 · Линейная регрессия

22.09.2026 · МНК, интерпретация, оптимизация, статистические свойства.

Линейная регрессия: МНК · 22.09.2026 · Модель и точное решение · Фрагменты: 00:14–00:45; 00:50–00:58.

Что именно линейно

$$f_\theta(x) = x^T\theta, \quad \theta \in \mathbb{R}^d.$$

Линейность относится к **параметрам**, а не обязательно к исходному признаку. Преобразование $\varphi(t) = (1, t, t^2)$ даёт квадратичную зависимость от t, но линейную регрессию по φ. Свободный член включается постоянным признаком $x_0 = 1$ либо выделяется как b.

Для n объектов: $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$, $y \in \mathbb{R}^n$, $\hat{y} = X\hat{\theta}$. Здесь d включает постоянный столбец, если он добавлен в X. Для нового объекта x ответ $x^T\hat{\theta}$; для новой матрицы Z — $Z\hat{\theta}$.

Метод наименьших квадратов

Квадратичная потеря $\ell(y, z) = (y - z)^2$ задаёт

$$F(\theta) = \|y - X\theta\|^2 \to \min_\theta.$$

Деление на n не меняет минимум, но меняет масштаб градиента. Раскрываем квадрат:

$$F(\theta) = y^Ty - 2\theta^TX^Ty + \theta^TX^TX\theta.$$

Для столбца v:

$$\nabla_v(a^Tv) = a,$$

$$\nabla_v(v^TAv) = (A + A^T)v.$$

При $A = A^T$ последний градиент равен $2Av$. Поэтому

$$\nabla F = 2X^T(X\theta - y),$$

$$\nabla^2 F = 2X^TX.$$

Матрица X^TX неотрицательно определена:

$$v^TX^TXv = \|Xv\|^2 \geq 0.$$

Функция выпукла; нулевой градиент достаточен для глобального минимума.

Нормальные уравнения

$$X^TX\hat{\theta} = X^Ty.$$

При полном столбцовом ранге $\operatorname{rank}(X) = d$:

$$\hat{\theta} = (X^TX)^{-1}X^Ty.$$

Тогда минимум единственный. Необходимы $n \geq d$ и отсутствие точной линейной зависимости столбцов. При неполном ранге **МНК не исчезает**: минимум существует, но параметры могут быть неединственны.

> Формула с обратной матрицей — описание решения, а не рекомендация считать обратную явно. Для численного решения предпочтительнее устойчивые методы линейной алгебры.

Прямая с одним признаком

Пусть $f(t) = b + wt$, $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_i x_i$, $\overline{y} = \frac{1}{n}\sum_i y_i$. Из производной по b:

$$\hat{b} = \overline{y} - \hat{w}\overline{x}.$$

Подстановка в loss даёт центрирование:

$$\hat{w} = \frac{\sum_i (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}.$$

Если все x_i одинаковы, знаменатель нулевой: наклон отдельно не идентифицируется, но оптимальное постоянное предсказание известно. При наличии свободного члена прямая проходит через $(\overline{x}, \overline{y})$.

Геометрия и неединственность

Пространство допустимых обучающих прогнозов — $\mathcal{L} = \{X\theta\}$. МНК выбирает ближайший к y вектор из $\mathcal{L}$: ортогональную проекцию. Остаток $r = y - X\hat{\theta}$ ортогонален каждому столбцу X:

$$X^Tr = 0.$$

При неполном ранге различные θ могут задавать одну проекцию:

$$X(\theta + v) = X\theta, \quad v \in \ker X.$$

Обучающие прогнозы единственны, хотя коэффициенты могут быть неединственны. Прогноз вне обучающего пространства тогда также может зависеть от выбранного решения. Псевдообратная матрица X^+ выбирает решение $\hat{\theta} = X^+y$ минимальной нормы.

Почему kNN здесь может проиграть

kNN хорошо интерполирует локально, но не восстанавливает глобальный линейный закон. Вне диапазона обучения соседи остаются внутри него: среднее не продолжает тренд. Линейная модель экстраполирует, **если выбранная форма зависимости верна**. Это преимущество предположения о структуре, а не гарантия вне данных.

Сложность и ограничения

Для плотной матрицы формирование X^TX стоит $O(nd^2)$, решение системы — порядка $O(d^3)$; прогноз одного объекта — $O(d)$, хранение коэффициентов — $O(d)$. Поэтому МНК удобен при умеренном d, но прямое решение дорого при очень большом d.

Квадратичная потеря сильно штрафует большие остатки: выбросы могут определять решение. Ошибочная форма модели не исправляется точностью оптимизации. Качество обучения и статистические свойства — разные вопросы.

Проверка формул по размерности: X^Ty — $d \times 1$, X^TX — $d \times d$, $X\hat{\theta}$ — $n \times 1$.

Признаки, метрики, интерпретация · 22.09.2026 · Практика на страховых расходах · Фрагменты: 01:00–01:50.

Интерпретация коэффициента

При фиксированных остальных координатах

$$f(x + e_j) - f(x) = \theta_j.$$

Это изменение **прогноза**, а не доказанный причинный эффект. Единица коэффициента — единица таргета / единица признака. Сравнивать модули коэффициентов возраста и суммы денег напрямую бессмысленно.

При $z_j = \frac{x_j - \mu_j}{s_j}$ и $f = a + \sum_j \gamma_j z_j$:

$$\theta_j = \frac{\gamma_j}{s_j},$$

$$b = a - \sum_j \gamma_j \frac{\mu_j}{s_j}.$$

γ_j — изменение прогноза при изменении исходного признака на одно стандартное отклонение. В МНК со свободным членом обратимое масштабирование не меняет набор допустимых прогнозов; меняются координаты коэффициентов и численная обусловленность. При регуляризации масштаб уже влияет и на выбранную модель.

Категориальные признаки

Для K категорий one-hot задаёт K индикаторов, сумма которых равна 1. Вместе со свободным членом это точная линейная зависимость. В обычной интерпретируемой параметризации оставить $K - 1$ инди-

каторов: коэффициенты — различия относительно базовой категории при прочих равных.
`OneHotEncoder(drop="first")` устраняет эту зависимость для линейной модели со сдвигом. Для kNN такое удаление нежелательно: меняет геометрию расстояний между категориями. Категорию нельзя кодировать произвольным числом, если порядок и расстояние не имеют смысла.

Взаимодействия признаков

В данных расходов связь с BMI различна для курящих и некурящих. Простая аддитивная модель меняет только сдвиг, но не наклон:

$$f(t,s) = b + at + cs.$$

Добавление произведения ts, где $s \in \{0,1\}$:

$$f(t,s) = b + at + cs + qts.$$

При $s=0$: наклон a, сдвиг b. При $s=1$: наклон $a+q$, сдвиг $b+c$. **Один новый признак меняет смысл сразу нескольких коэффициентов.** Отрицательный c не означает, что курение уменьшает расходы: полный контраст равен $c+qt$.



Данные → аддитивная модель → модель с взаимодействием BMI × smoker. · 22.09 · 01:45:00

Метрики регрессии

Для остатков $r_i = y_i - \hat{y}_i$ на проверочной выборке размера m:

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{m}\sum_i r_i^2, \quad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{MSE}},$$

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{m}\sum_i |r_i|,$$

$$\mathrm{MAPE} = \frac{1}{m}\sum_i \left|\frac{r_i}{y_i}\right|,$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i r_i^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}.$$

- **MSE:** единицы таргета в квадрате; удобно оптимизировать, чувствительно к большим ошибкам.
- **RMSE:** возвращает единицы таргета, но не равняется средней абсолютной ошибке.
- **MAE:** типичный абсолютный масштаб ошибки; слабее штрафует выбросы.
- **MAPE:** относительная ошибка; для процентов умножить на 100. Не определена при $y_i = 0$, неустойчива около нуля.
- R^2**:** сравнение с постоянным средним **оцениваемой выборки**. Отрицательное значение возможно; оно означает хуже этого среднего.

При постоянном таргете знаменатель R^2 нулевой. Для честного рабочего бейзлайна среднее прогноза берут из train; это не обязательно то же среднее, которое используется в знаменателе test-R^2.

Диагностика перед усложнением

Train и test плохи → проверить признаки, форму зависимости, шум и ошибки данных. Train хорош, test плох → проверять переобучение, утечки и различие распределений. Нельзя считать любую слабую модель переобученной.

Увеличение числа признаков не увеличивает оптимальный **train-SSE** у вложенных МНК-моделей, но может ухудшить test. Полиномиальные признаки повышают выразительность и нестабильность. Взаимодействие, основанное на EDA, часто полезнее механического добавления всех степеней.

> **Коэффициент всегда интерпретируется относительно остальных признаков модели.** После изменения набора признаков прежняя интерпретация может перестать действовать.

Оптимизация и статистические свойства · 22.09.2026 · GD/SGD, Монте-Карло, ковариация, степени свободы · Фрагменты: 01:55–03:05.

Градиентный спуск

Для средней потери $Q(\theta) = \frac{\|X\theta - y\|^2}{n}$:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \nabla Q(\theta_t),$$

$$\nabla Q(\theta) = \frac{2}{n} X^T (X\theta - y).$$

Отрицательный градиент — направление локального наискорейшего спуска в евклидовой норме. Слишком большой шаг может привести к расходимости; слишком малый — к медленному обучению. Для квадратичного Q при $L = 2\lambda_{\max}\frac{X^TX}{n}$ постоянный шаг $0 < \eta < \frac{2}{L}$ обеспечивает устойчивость ненулевых спектральных направлений.

Mini-batch SGD

Взять случайные индексы I размера k:

$$g_I(\theta) = \frac{2}{k} X_I^T (X_I\theta - y_I).$$

При равномерной выборке индексов $E[g_I(\theta)] = \nabla Q(\theta)$. Один шаг использует k, а не n объектов; направление шумное, но в среднем соответствует полному градиенту. Для $k=1$ получаем классический SGD; при $k=n$ — полный градиент.
Стоимость полного шага — $O(nd)$, батча — $O(kd)$. **Итерация** — один шаг; **эпоха** — один проход по обучающим данным. Нельзя сравнивать методы лишь по числу шагов, игнорируя их стоимость. Критерии остановки: изменение loss/параметров, норма градиента, лимит эпох, качество на validation. Для SGD один шумный шаг не доказывает сходимость.

Почему это Монте-Карло

Для независимых Z_i одной природы:

$$A = E[h(Z)], \quad \hat{A} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} h(Z_i).$$

Оценка несмещённа; при конечной дисперсии

$$\mathrm{Var}(\hat{A}) = \frac{\mathrm{Var}(h(Z))}{k}.$$

Стандартное отклонение убывает как $\frac{1}{\sqrt{k}}$. Mini-batch-градиент оценивает среднее по конечной обучающей выборке этим же принципом.

Правила для случайного вектора

Для фиксированной матрицы A и вектора b:

$$E[AZ + b] = AE[Z] + b,$$

$$\mathrm{Cov}(AZ + b) = A\,\mathrm{Cov}(Z)A^T.$$

При нулевом среднем $E\left[\|Z\|^2\right] = \mathrm{tr}(\mathrm{Cov}(Z))$. Эти правила дают свойства МНК без предположения о нормальности шума.

Вероятностная линейная модель

Зафиксировать X полного ранга, $n > d$:

$$y = X\theta_* + \varepsilon, \quad E[\varepsilon] = 0.$$

Эквивалентно можно рассматривать условные моменты при данном X. Тогда

$$\hat{\theta} = \theta_* + (X^T X)^{-1} X^T \varepsilon,$$

$$E[\hat{\theta}] = \theta_*.$$

Это **несмещённость при верной модели и нулевом среднем шума**, а не универсальное свойство любого набора данных.

При $\mathrm{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I_n$:

$$\mathrm{Cov}(\hat{\theta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}.$$

Нужны равные дисперсии и отсутствие корреляций ошибок. Независимость достаточна для отсутствия корреляций, но не необходима. При общей $\Sigma = \mathrm{Cov}(\varepsilon)$:

$$\mathrm{Cov}(\hat{\theta}) = A \Sigma A^T,$$

где $A = (X^T X)^{-1} X^T$.

Для нового фиксированного x:

$$E[\hat{f}(x)] = x^T \theta_*,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{f}(x)) = \sigma^2 x^T (X^T X)^{-1} x.$$

Это дисперсия **оценки среднего ответа**. Для нового наблюдения с независимым шумом к дисперсии ошибки прогноза добавляется σ^2. Почти вырожденная $X^T X$ даёт большой разброс коэффициентов.

Проекция и остаточная дисперсия

$$H = X(X^T X)^{-1} X^T, \quad \hat{y} = Hy.$$

$H^T = H$, $H^2 = H$, $\mathrm{rank}(H) = \mathrm{tr}(H) = d$. Для $r = (I - H)y = (I - H)\varepsilon$:

$$E[r] = 0, \quad \mathrm{Cov}(r) = \sigma^2 (I - H).$$

Поэтому

$$E\left[\|r\|^2\right] = \sigma^2 \,\mathrm{tr}(I - H) = \sigma^2 (n - d).$$

Отсюда несмещённая оценка:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\left\| y - X\hat{\theta} \right\|^2}{n - d}.$$

d направлений использовано для подгонки модели, осталось $n - d$ степеней свободы. Если сдвиг выделен отдельно и исходных признаков p, знаменатель $n - p - 1$.

Не путать: train-MSE делит на n и оценивает шум смещённо вниз; коррекция на степени свободы делит на $n - d$.

03 · Логистическая регрессия

29.09.2026 · Вероятности, ММП, odds ratio, калибровка.

Логистическая регрессия · 29.09.2026 · Вероятности, логит, кросс-энтропия · Фрагменты: 00:27–00:55; 01:53–02:12.

Класс и вероятность — разные ответы

Классификатор $\hat{y} : \mathbb{R}^d \to \{0, \dots, K-1\}$ разбивает пространство на области решений. Вероятностная модель возвращает $\hat{p}_c(x) \geq 0$ с $\sum_c \hat{p}_c(x) = 1$. Для бинарного случая достаточно одного числа $p(x) = P(Y = 1|X = x)$; вероятность класса 0 равна $1 - p(x)$.

Из вероятностей получаем класс $\arg\max_c \hat{p}_c(x)$. Обратное неверно: жёсткая метка не содержит уверенность. Случайность класса отражает шум и ненаблюдаемые факторы, а не только незнание модели.

Линейный логит, нелинейная вероятность

$$z(x) = b + x^T\theta, \quad \sigma(z) = \frac{1}{1+\exp(-z)},$$

$$p_\theta(x) = \sigma(z(x)), \quad Y_i|x_i \sim \mathrm{Bern}(p_\theta(x_i)).$$

Сигмоида монотонна, принимает значения между 0 и 1, $\sigma(0) = \frac{1}{2}$, $\sigma(-z) = 1 - \sigma(z)$.

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)).$$

Название «регрессия» связано с моделированием числовой вероятности; итоговая задача может оставаться классификацией.

Для порога $\tau \in (0, 1)$:

$$\hat{y}(x) = \mathbb{1}\{p_\theta(x) \geq \tau\},$$

$$p_\theta(x) \geq \tau \Leftrightarrow z(x) \geq \log\Big(\frac{\tau}{1-\tau}\Big).$$

При $\tau = \frac{1}{2}$ разделяющая поверхность $b + x^T\theta = 0$ — гиперплоскость. Модель линейная по логиту; вероятность не линейна по признакам. После нелинейного преобразования признаков граница может быть нелинейной в исходных координатах.

> **`predict_proba` ≠ `predict`.** Первая операция оценивает вероятность; вторая применяет правило выбора класса. Изменение порога не требует переобучения вероятностной модели.

Accuracy не оценивает уверенность

Прогнозы 0.51 и 0.99 дают одинаковый класс при пороге 0.5, но разные последствия для риска и разные значения вероятностной потери. Высокая accuracy на несбалансированных данных может достигаться константой. В примере дохода нужно сравниваться с большинством классов, а не с 50%.

От правдоподобия к loss

При условной независимости наблюдений и фиксированных x_i:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i},$$

где $p_i = \sigma\big(x_i^T\theta\big)$; постоянная координата включена в x_i. Логарифм произведения превращается в сумму:

$$\log L(\theta) = \sum_i [y_i \log p_i + (1-y_i)\log(1-p_i)].$$

Максимизация $\log L$ равна минимизации средней бинарной кросс-энтропии:

$$Q(\theta) = -\frac{1}{n}\sum_i [y_i \log p_i + (1-y_i)\log(1-p_i)].$$

Для отдельного объекта, $z_i = x_i^T\theta$:

$$\ell(y_i, z_i) = \log(1 + \exp(z_i)) - y_i z_i.$$

Уверенная ошибка штрафуется сильно: для $y = 1$ и $p \to 0$ потеря $-\log p \to \infty$.

Градиент и выпуклость

По правилу цепочки:

$$\nabla Q(\theta) = \frac{1}{n}\sum_i (p_i - y_i)x_i = \frac{1}{n}X^T(p - y).$$

Для $W = \mathrm{diag}(p_i(1-p_i))$:

$$\nabla^2 Q(\theta) = \frac{1}{n}X^T W X \succcurlyeq 0.$$

Функция выпукла; при полном ранге и конечных параметрах гессиан положительно определён. Но это **не гарантирует существования конечного минимума**. Для полностью разделимых данных масштаб коэффициентов может уходить в бесконечность, а loss стремиться к нулю. Регуляризация ограничивает этот рост.

Закрытого решения обычного вида нет; применяются GD, SGD и более эффективные численные методы. Для батча I:

$$g_I(\theta) = \frac{1}{|I|}X_I^T(p_I - y_I).$$

Размер модели и стоимость прогноза — $O(d)$; сигмоида добавляет лишь скалярную операцию.

Численная устойчивость

Не вычислять наивно $\log(1 + \exp(z))$ при большом z:

$$\mathrm{softplus}(z) = \max(z, 0) + \log(1 + \exp(-|z|)).$$

Вычислять loss по логитам либо использовать устойчивую библиотечную реализацию. Логарифм нулевой численной вероятности — ошибка вычисления, не особенность теории.

Метод максимального правдоподобия · 29.09.2026 · Статистическая основа и примеры · Фрагменты: 00:57–01:53.

Что максимизируется

Наблюдения $Z_1, \dots, Z_n$ независимы и имеют распределение из семейства P_θ. Для непрерывной модели p_θ — плотность, для дискретной — масса вероятности:

$$L(\theta; z) = \prod_i p_\theta(z_i),$$

$$\hat{\theta} \in \arg\max_\theta L(\theta; z).$$

В правдоподобии **данные фиксированы**, меняется параметр. L не является распределением вероятности по θ. Значение плотности в точке не является вероятностью этой точки.

Если $L > 0$, монотонность логарифма сохраняет максимум:

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_i \log p_\theta(z_i).$$

Можно отбросить только слагаемые, не зависящие от **оцениваемого** параметра. Уравнение $\nabla\ell = 0$ — условие внутренней стационарной точки, не универсальный способ найти максимум. Проверять область параметров и границы.

Нормальное распределение

$$Z_i \sim \mathcal{N}\big(\mu, \sigma^2\big).$$

Лог-правдоподобие с точностью до константы:

$$\ell\big(\mu, \sigma^2\big) = -\frac{n}{2}\log\sigma^2 - \frac{\sum_i (z_i - \mu)^2}{2\sigma^2}.$$

Производная по μ даёт

$$\hat{\mu} = \bar{z} = \frac{1}{n}\sum_i z_i.$$

Если σ^2 тоже неизвестна:

$$\hat{\sigma}^2_{\mathrm{MLE}} = \frac{1}{n}\sum_i (z_i - \bar{z})^2.$$

Это ММП-оценка, **смещённая вниз** при конечном n. Несмещённая оценка использует знаменатель $n-1$. Если среднее известно заранее, коррекция на оценку среднего не нужна.

Свойства не бесплатны

При условиях регулярности и идентифицируемости ММП-оценки часто состоятельны, асимптотически нормальны и эффективны. Это асимптотические утверждения с предпосылками; они не обещают несмещённость на маленькой выборке или единственность любого найденного корня.

Несмещённость: $E[\hat{\theta}] = \theta$. **Состоятельность:** $\hat{\theta}_n \to \theta$ по вероятности. Одно свойство не заменяет другое; меньшая дисперсия иногда важнее небольшого смещения.

МНК как ММП

При фиксированном X:

$$y = X\theta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_n).$$

Тогда условная плотность y:

$$L(\theta, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{\|y - X\theta\|^2}{2\sigma^2}\right).$$

Для фиксированного σ^2 максимизация по θ равна минимизации SSE:

$$\hat{\theta}_{\mathrm{MLE}} = (X^T X)^{-1} X^T y.$$

Если одновременно оценивать шум:

$$\hat{\sigma}^2_{\mathrm{MLE}} = \frac{\left\|y - X\hat{\theta}\right\|^2}{n}.$$

Несмещённая оценка из предыдущей лекции делит на $n-d$. Нормальный шум объясняет квадратную потерю через ММП; несмещённость МНК сама по себе не требует нормальности.

Бернулли: частота как оценка

$$Z_i \sim \mathrm{Bern}(\theta), \quad \theta \in [0,1].$$

$$p_\theta(z) = \theta^z (1-\theta)^{1-z}.$$

Пусть $s = \sum_i z_i$:

$$L(\theta) = \theta^s (1-\theta)^{n-s},$$

$$\ell'(\theta) = \frac{s}{\theta} - \frac{n-s}{1-\theta}.$$

Для $0 < s < n$ получаем $\hat{\theta} = \frac{s}{n}$. При всех нулях или единицах максимум на границе: 0 или 1. Логистическая регрессия заменяет одну общую вероятность на $\sigma(x_i^T\theta)$ для каждого объекта.

Равномерное распределение: граница

$$Z_i \sim \mathrm{U}([0,\theta]), \quad \theta > 0.$$

В выбранной версии плотности

$$L(\theta) = \theta^{-n} \mathbb{1}\left\{\theta \geq \max_i z_i\right\}.$$

В допустимой области правдоподобие убывает, поэтому

$$\hat{\theta}_{\mathrm{MLE}} = \max_i z_i.$$

Производная внутри области не равна нулю в максимуме. Носитель зависит от параметра; стандартные регулярные аргументы нельзя переносить автоматически.

> **Шаблон вывода:** семейство и область параметров → плотность/масса → произведение → логарифм → оптимизация с проверкой границ → свойства оценки и их предпосылки.

Интерпретация и калибровка · 29.09.2026 · Доход, пропуски, кредитный риск · Фрагменты: 02:12–02:35; 02:40–03:06.

Odds ratio вместо «прироста вероятности»

Для $p = \sigma(b + x^T\theta)$:

$$\frac{p}{1-p} = \exp(b + x^T\theta),$$

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = b + x^T\theta.$$

Шансы $\frac{p}{1-p}$ — отношение вероятностей классов 1 и 0, не сама вероятность. При увеличении x_j на Δ и фиксированных прочих признаках:

$$\frac{\mathrm{odds}(x + \Delta e_j)}{\mathrm{odds}(x)} = \exp(\theta_j \Delta).$$

$\exp(\theta_j)$ — мультипликативный эффект единичного изменения на шансы. Коэффициент 0.7 умножает шансы примерно на 2, **не прибавляет 70 процентных пунктов**.

$$\frac{\partial p}{\partial x_j} = \theta_j p(1-p).$$

Изменение вероятности зависит от начального p. Например, удвоение шансов переводит $p = 0.1$ в 0.182, а $p = 0.5$ в 0.667. Все интерпретации условны на остальные признаки; коррелированные признаки и взаимодействия изменяют смысл коэффициентов.

Предобработка практического примера

Числовые признаки — стандартизировать; категории — one-hot; пропуски — заполнять по статистикам train: медиана / наиболее частое значение или осмысленная отдельная категория. Удаление всех объектов с пропусками — простой бейзлайн, но меняет состав выборки.

Для линейной модели со сдвигом исключение одной one-hot-категории устраняет точную зависимость. Нелинейные признаки (квадраты, произведения) могут улучшить форму логита, но требуют внешней проверки качества.

Локальная проверка формы зависимости

Ядерное сглаживание бинарного таргета по одному признаку:

$$\hat{m}_h(t) = \frac{\sum_i K\left(\frac{t - x_i}{h}\right) y_i}{\sum_i K\left(\frac{t - x_i}{h}\right)}.$$

Это оценка локальной частоты класса, не KDE-плотность. Используется для сопоставления формы данных с прогнозами. Одномерная зависимость усредняет остальные признаки; она не равна частному эффекту при фиксированных остальных координатах. В областях с малым количеством объектов вывод ненадёжен.

Решение по стоимости ошибок

Если C_{FP} — цена ложного класса 1, а C_{FN} — ложного класса 0, выбирать 1 при $C_{\mathrm{FP}}(1-p) \leq C_{\mathrm{FN}} p$:

$$\tau = \frac{C_{\mathrm{FP}}}{C_{\mathrm{FP}} + C_{\mathrm{FN}}}.$$

Это следствие минимизации ожидаемых затрат; порог 0.5 оправдан лишь при равных ценах.

Что означает калибровка

Идеальная калибровка:

$$E[Y \mid \hat{p}(X)] = \hat{p}(X) \quad \text{почти наверное.}$$


Эквивалентный смысл: среди объектов с прогнозом около 0.2 доля класса 1 должна быть около 20%. Точное равенство непрерывного score одному числу нельзя проверять простой частотой: на практике используют бины или сглаживание.

Для бина B_j и индексов $I_j = \{i : \hat{p}(x_i) \in B_j\}$:

$$\overline{p}_j = \frac{1}{|I_j|} \sum_{i \in I_j} \hat{p}(x_i),$$

$$\overline{y}_j = \frac{1}{|I_j|} \sum_{i \in I_j} y_i.$$

Калибровочная кривая соединяет $(\overline{p}_j, \overline{y}_j)$. Идеал — диагональ. По оси x именно **средняя предсказанная вероятность**, а не доля объектов, попавших в бин.



Фактическая доля класса 1 против среднего score в бине. · 29.09 · 03:04:20

Выше диагонали → риск класса 1 недооценён; ниже → переоценён. Смотреть число объектов в каждом бине: маленький бин даёт шумную частоту. Результат зависит от разбиения; одна кривая не является точным доказательством качества.

Калибровка не равна различению

Постоянный прогноз частоты класса может быть хорошо калиброван, но не различать объекты. Хороший классификатор, наоборот, может выдавать плохие вероятности. Для кредита или медицинского риска нужны и различение, и достоверные вероятности.

Как обучать калибратор

Train → обучить модель; calibration → обучить преобразование score; test → проверить результат. Либо использовать корректную cross-validation-схему.

Платт: сигмоидальное преобразование score s: $\sigma(as + b)$. **Изотоническая регрессия:** гибкое монотонное преобразование; требует больше данных и может переобучиться на малой калибровочной выборке. Нельзя обучать калибратор и оценивать его на тех же объектах. Даже логистическая форма сама по себе не гарантирует калибровку на новых данных.

04 · Польза регуляризации

06.10.2026 · Ridge, Lasso, коллинеарность, проксимальные методы.

Регуляризация: Ridge · 06.10.2026 · Центрирование, решение, смещение–дисперсия · Фрагменты: 00:02–01:00.

Зачем штрафовать параметры

Полином высокой степени может идеально пройти через несколько зашумлённых точек, но сильно колебаться между ними и вне обучающего диапазона. Большие компенсирующие коэффициенты — один из признаков нестабильности, **не универсальное доказательство переобучения**. Масштаб коэффициента зависит от единицы измерения признака.

Регуляризация ограничивает гибкость, сохраняя выбранное семейство модели:

$$F(\theta) + \lambda R(\theta) \to \min_{\theta}, \quad \lambda \geq 0.$$

Здесь $F = \|y - X\theta\|^2$ — **сумма**, не средняя потеря. Деление всего функционала на n не меняет решение; деление только data-loss изменяет относительный штраф.

> Ниже Ridge: $R(\theta) = \|\theta\|^2$; Lasso: $R(\theta) = \|\theta\|_1$. Для записи $\frac{F}{2n} + \alpha R$ соответствие $\lambda = 2n\alpha$. Значения параметра нельзя переносить между разными нормировками без пересчёта.

Свободный член не штрафуется

$$F(b, \theta) = \|y - b\mathbb{1} - X\theta\|^2 + \lambda\|\theta\|^2.$$

Производная по b даёт

$$\hat{b} = \overline{y} - \overline{x}^T\hat{\theta}.$$

Центрировать $X_c = X - \mathbb{1}\overline{x}^T$, $y_c = y - \overline{y}\mathbb{1}$:

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta}\left[\|y_c - X_c\theta\|^2 + \lambda\|\theta\|^2\right].$$

Статистики центрирования берутся по train; новый прогноз остаётся $\hat{b} + x^T\hat{\theta}$. Штраф на свободный член сделал бы ответ зависимым от произвольного сдвига таргета.

Точное решение Ridge

Далее X, y считаются центрированными; $A = X^TX$.

$$\nabla F = 2X^T(X\theta - y) + 2\lambda\theta.$$

$$(A + \lambda I)\hat{\theta} = X^Ty,$$

$$\hat{\theta}_\lambda = (A + \lambda I)^{-1}X^Ty.$$

При $\lambda > 0$ матрица положительно определена даже при вырожденном A:

$$v^T(A + \lambda I)v = \|Xv\|^2 + \lambda\|v\|^2 > 0.$$

Для штрафуемых коэффициентов решение единственно.

Что происходит при изменении λ

При $\lambda \to 0$ и обратимой A получаем МНК. Для вырожденной A предел выбирает МНК-решение минимальной нормы. При $\lambda \to \infty$ штрафуемые коэффициенты стремятся к 0, свободный член — к $\overline{y}$: прогноз становится константным. Увеличивать штраф бесконечно не означает улучшать качество бесконечно.

Пусть $A = V\,\mathrm{diag}(s_j)V^T$, $s_j \geq 0$. В невырожденных направлениях Ridge сжимает коэффициенты МНК множителем

$$\frac{s_j}{s_j + \lambda}.$$

Малые s_j — слабые направления данных — подавляются сильнее. При $\lambda > 0$ обусловленность системы улучшается:

$$\kappa(A + \lambda I) = \frac{s_{\max} + \lambda}{s_{\min} + \lambda}.$$

Цена устойчивости: смещение

Для верной модели $y = X\theta_* + \varepsilon$, $E[\varepsilon] = 0$, $\mathrm{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I$ и $G = A + \lambda I$:

$$E\left[\hat{\theta}_\lambda\right] = G^{-1}A\theta_*,$$

$$\mathrm{Bias} = -\lambda G^{-1}\theta_*,$$

$$\mathrm{Cov}\left(\hat{\theta}_\lambda\right) = \sigma^2 G^{-1}AG^{-1}.$$

В направлении $s_j > 0$ дисперсия вместо $\frac{\sigma^2}{s_j}$ равна

$$\sigma^2\frac{s_j}{(s_j + \lambda)^2}.$$

Она меньше, но появляется смещение. Центрирование со свободным членом требует рассматривать шум после соответствующей проекции; для ковариации коэффициентов формула сохраняется, поскольку $X_c^T\mathbb{1} = 0$.

Смещение–дисперсия прогноза

Пусть $f_*(x) = E[Y|X = x]$, новый шум независим от обучающей выборки D. Тогда при фиксированном x:

$$E\left[\left(Y - \hat{f}_D(x)\right)^2\right] = \sigma^2(x) + \mathrm{Bias}(x)^2 + \mathrm{Var}_D\left(\hat{f}_D(x)\right).$$

Первый член — неустранимый шум, второй — ошибка средней модели, третий — разброс модели при смене обучающей выборки. Регуляризация часто уменьшает третий ценой второго; суммарная ошибка может снизиться, но это не гарантировано для любого λ.

Выбор λ: по validation/CV, вместе с предобработкой, а не по минимальному train-loss. Сравнивать с МНК и константой на одном разбиении.

Lasso, геометрия и коллинеарность · 06.10.2026 · Разреженность, ElasticNet, коэффициенты, VIF · Фрагменты: 01:00–02:20.

Lasso и точные нули

Для центрированных данных:

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta}\left[\|y - X\theta\|^2 + \lambda\|\theta\|_1\right].$$

$\|\theta\|_1 = \sum_j|\theta_j|$. При $\theta_j \neq 0$ производная штрафа — $\lambda\,\mathrm{sign}(\theta_j)$; в нуле обычная производная не существует. Условие оптимальности использует субдифференциал, а не произвольное значение sign(0).

Для остатка $r = y - X\hat{\theta}$ и столбца X_j:

$$2X_j^Tr = \begin{cases}\lambda\,\mathrm{sign}(\hat{\theta}_j) & \hat{\theta}_j \neq 0 \\ \text{число из } [-\lambda, \lambda] & \hat{\theta}_j = 0\end{cases}.$$


Следовательно, нулевой коэффициент возможен, когда абсолютная корреляция остатка с признаком достаточно мала: $\left|2X_j^Tr\right| \leq \lambda$. При $\lambda \geq 2\left\|X^Ty\right\|_\infty$ нулевой вектор удовлетворяет условиям оптимальности.

Геометрическая причина разреженности

Штрафованные задачи связаны с ограниченными:

$$\min_{\theta}\|y - X\theta\|^2 \quad \text{при } R(\theta) \leq c.$$

Для соответствующих c и множителя Лагранжа λ решения совпадают; это не означает $c = \lambda$. Линии уровня data-loss касаются допустимой области. Шар L_2 гладкий; шар L_1 имеет углы на осях, где некоторые координаты равны нулю.



Ridge: круг; Lasso: ромб. Касание угла даёт нулевую координату. · 06.10 · 01:35:00


Ridge обычно сжимает без точного отбора; **Lasso** может обнулить признаки. Геометрия объясняет тенденцию, но не гарантирует правильный набор существенных признаков.

ElasticNet и масштаб

$$F(\theta) = \|y - X\theta\|^2 + \lambda_1\|\theta\|_1 + \lambda_2\|\theta\|^2.$$

Сочетает разреженность L_1 и устойчивость L_2. При $\lambda_2 > 0$ функционал строго выпуклый по штрафуемым коэффициентам. При коррелированных признаках Lasso может выбирать один вместо другого; Ridge распределяет вклад более плавно, ElasticNet сочетает эффекты.

Стандартизировать числовые признаки до штрафа: иначе цена одинакового влияния на прогноз зависит от выбранной единицы измерения. Сначала масштабировать train, затем применять те же статистики к остальным данным. One-hot и свободный член требуют осмысленного выбора параметризации и штрафов.



Траектории коэффициентов: Ridge, Lasso, ElasticNet; свободный член не штрафуется. · 06.10 · 01:45:20

Уменьшение нормы при усилении штрафа не означает монотонного уменьшения **каждого** модуля коэффициента: признаки могут перераспределять вклад. При смене λ отдельный коэффициент способен менять знак или временно расти.

Мультиколлинеарность

Если столбцы линейно зависимы, X^TX вырождена; если почти зависимы — плохо обусловлена. Например, копии признаков либо бухгалтерское тождество «прибыль = выручка − затраты». Даже при хорошем прогнозе коэффициенты могут быть огромны, нестабильны и плохо интерпретируемы. Малые возмущения данных существенно меняют их, потому что близкие признаки компенсируют друг друга.

Попарная корреляция не обнаруживает все зависимости: один столбец может выражаться через **несколько** других. Для каждого j регрессировать X_j на остальные признаки:

$$\mathrm{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2}.$$

R_j^2 — качество восстановления **признака**, не предсказания таргета. Большой VIF указывает на коллинеарность; порог — эвристика. Высокий VIF не означает сам по себе ненужность признака.

В примере Всемирного банка агрегаты регионов пересекаются с данными стран. Разнос связанных наблюдений по train/test может создать утечку. Плохое R^2 МНК при хороших отдельных признаках — повод проверить структуру данных и устойчивость.

Субградиенты и проксимальный шаг · 06.10.2026 · Почему Lasso обнуляет коэффициенты · Фрагменты: 02:22–02:59.

Субдифференциал выпуклой функции

Для выпуклой $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ вектор g — субградиент в x_0, если

$$f(x) \geq f(x_0) + g^T(x - x_0) \quad \forall x.$$

Правая часть — опорная гиперплоскость, лежащая не выше графика. Множество таких g обозначают $\partial f(x_0)$. При дифференцируемости оно состоит из одного градиента.

Для модуля:

$$\partial|x| = \begin{cases} \{1\} & x > 0 \\ \{-1\} & x < 0. \\ [-1, 1] & x = 0 \end{cases}$$

В нуле все наклоны от -1 до 1 задают опорные прямые. Для $\|\theta\|_1$ субдифференциал задаётся покоординатно.

Критерий минимума выпуклой функции:

$$x_* \in \arg\min f \Leftrightarrow 0 \in \partial f(x_*).$$

Если нулевой вектор — субградиент, неравенство определения сразу даёт $f(x) \geq f(x_*)$. Обратное следует из того же неравенства с $g = 0$.

Проксимальный оператор

Для выпуклого штрафа R и $a > 0$:

$$\mathrm{prox}_{aR}(v) = \arg\min_u \left[\frac{1}{2}\|u - v\|^2 + aR(u)\right].$$

Это компромисс: остаться рядом с v и уменьшить штраф. Квадратичный член делает задачу строго выпуклой, поэтому решение единственно для обычных замкнутых выпуклых штрафов. Условие оптимальности:

$$0 \in u - v + a\partial R(u),$$
$$v - u \in a\partial R(u).$$

Минимум как неподвижная точка

Для гладкой выпуклой F и выпуклой R:

$$0 \in \nabla F(\theta_*) + \lambda\partial R(\theta_*).$$

Подставить $v = \theta_* - \eta\nabla F(\theta_*)$, $a = \eta\lambda$:

$$\theta_* = \mathrm{prox}_{\eta\lambda R}(\theta_* - \eta\nabla F(\theta_*)).$$

Это условие оптимальности, а не ещё готовое закрытое решение; оно подсказывает итерационный алгоритм.

Мягкое пороговое отсечение

Для одномерного $R(u) = |u|$ решить

$$\min_u \left[\frac{1}{2}(u - v)^2 + a|u|\right].$$

1. $u > 0$: $u - v + a = 0$, значит $u = v - a$, допустимо при $v > a$.
2. $u < 0$: $u - v - a = 0$, значит $u = v + a$, допустимо при $v \leftarrow a$.
3. $u = 0$: $0 \in -v + a[-1, 1]$, значит $|v| \leq a$.

Итак,

$$S_a(v) = \begin{cases} v - a & v > a \\ 0 & |v| \le a. \\ v + a & v \leftarrow a \end{cases}$$

$$S_a(v) = \operatorname{sign}(v)\max(|v| - a, 0).$$

Для вектора оператор применяется независимо к координатам. **Точное обнуление** следует из интервала субградиентов в нуле; это не округление маленького коэффициента.

Проксимальный градиент для Lasso

При $F(\theta) = \|y - X\theta\|^2$:

$$v_t = \theta_t - 2\eta X^T(X\theta_t - y),$$
$$\theta_{t+1} = S_{\eta\lambda}(v_t).$$

Сначала обычный градиентный шаг по гладкой части, затем soft-thresholding. Свободный член, если выделен, обновляется **без** порогового отсечения. Для $L = 2\lambda_{\max}(X^TX)$ безопасный выбор $0 < \eta \le \frac{1}{L}$; при иных нормировках loss пересчитываются и шаг, и порог.

Для ортонормированных столбцов $X^TX = I$ задача разделяется:

$$\hat{\theta} = S_{\frac{\lambda}{2}}(X^Ty).$$

Множитель $\frac{1}{2}$ здесь появился из выбранного **SSE**, а не $\frac{\text{SSE}}{2}$. Для общего X нельзя просто применить этот порог к МНК-коэффициентам.

Почему не обычный градиент штрафа

У L_1 нет единственного градиента в нуле. Субградиентный шаг возможен, но может колебаться около нуля; проксимальный шаг решает негладкую часть точно. Для L_2 же проксимальный оператор — непрерывное сжатие:

$$\operatorname{prox}_{a\|\cdot\|^2}(v) = \frac{v}{1 + 2a}.$$

> **Контроль перед применением:** масштаб признаков; штрафуемые координаты; нормировка loss; соответствие λ; устойчивость по разбиениям; качество и интерпретируемость на новых данных.

05 · Статистические свойства моделей

13.10.2026 · Доверительные и предсказательные интервалы.

Доверительные интервалы · 13.10.2026 · Определение, построение, Вальд и Стюдент · 00:00–02:01; 02:43–02:54.

Что оценивает интервал

Точечная оценка меняется при смене выборки: несмещённость сама по себе не говорит, насколько точен конкретный результат. Интервал добавляет меру неопределённости к оценке параметра, коэффициента или среднего прогноза. Одна общая RMSE не описывает локальную точность: при разном разбросе шума полоса постоянной ширины избыточна в одной области и недостаточна в другой.

Пусть $D = (Z_1, \dots, Z_n)$ — выборка из P_θ. **Доверительный интервал (ДИ) уровня** α — пара статистик $L(D), U(D)$, для которой

$$P_\theta(L(D) \le \theta \le U(D)) \ge \alpha \quad \forall \theta.$$

Границы вычисляются по данным и не содержат неизвестных параметров. **Точный** ДИ даёт равенство для всех θ; **асимптотический** удовлетворяет

$$\liminf_{n\to\infty} P_\theta(L(D) \le \theta \le U(D)) \ge \alpha.$$

Нижний предел допускает колебания вероятности покрытия при росте n.

> **Случаен интервал, параметр фиксирован.** При повторении эксперимента доля интервалов, накрывающих истинный параметр, приближается к вероятности покрытия. Для уже вычисленных границ параметр либо внутри, либо снаружи; «вероятность параметра в этих числах равна 95%» — не частотная интерпретация.

В опыте с нормальным средним $n = 100$, $\sigma = 5$, $\theta = 0$: у 95%-интервалов разные центры, но одна полуширина $1.96 \cdot \frac{5}{10} = 0.98$.

Общая схема: найти опорную статистику

Найти $G(D, \theta)$ с известным распределением Q, не зависящим от неизвестных параметров, либо со сходимостью $G(D, \theta) \xrightarrow{d} Q$. Для непрерывного Q взять квантили q_p и выразить θ из

$$q_{\frac{1-\alpha}{2}} \le G(D, \theta) \le q_{\frac{1+\alpha}{2}}.$$

Центральная вероятность равна α точно либо в пределе. Квантиль — граница, слева от которой лежит доля p распределения. Для стандартного нормального закона обозначаем его z_p; при $\alpha = 0.95$ получаем $z_{0.975} \approx 1.96$ (на доске сначала округляли до 2).

ЦПТ и асимптотическая нормальность

Для независимых одинаково распределённых Z_i с $0 < \mathrm{Var}(Z_i) = \sigma^2 < \infty$:

$$\sqrt{n}\frac{\overline{Z} - EZ_1}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Для векторов: $\sqrt{n}\left(\overline{Z} - EZ_1\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathrm{Cov}(Z_1))$. В общем случае **асимптотически нормальная оценка** удовлетворяет

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta} - \theta\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma(\theta)).$$

$\Sigma(\theta)$ — ковариация предельного распределения; масштаб ковариации самой оценки — $\frac{\Sigma(\theta)}{n}$. ЦПТ — один из способов получить такую оценку. Универсального порога «достаточно $n = 30$» нет: точность приближения зависит от распределения.

Интервал Вальда

В одномерном случае пусть предельная дисперсия равна $s^2(\theta) > 0$. Неизвестное $s(\theta)$ заменяем **состоятельной** оценкой $\hat{s}$:

$$P_\theta(|\hat{s} - s(\theta)| > \varepsilon) \to 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Например, $\hat{s} = s(\hat{\theta})$ при состоятельности $\hat{\theta}$ и непрерывности s. По теореме Слуцкого нормальная сходимость сохраняется:

$$\sqrt{n}\frac{\hat{\theta} - \theta}{\hat{s}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Поэтому ДИ Вальда имеет вид

$$\hat{\theta} \pm z_{\frac{1+\alpha}{2}} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}.$$

$\frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$ — стандартная ошибка. Больше доверие — шире интервал; рост n обычно сужает его как $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Нормальное среднее: известная и неизвестная σ

Для $Z_i \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ и известной σ:

$$\overline{Z} \sim \mathcal{N}\left(\theta, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{\overline{Z} - \theta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Отсюда **точный** ДИ: $\overline{Z} \pm z_{\frac{1+\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

При неизвестной σ используем обозначение лекции:

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_i \left(Z_i - \overline{Z}\right)^2.$$

Вальд даёт $\overline{Z} \pm z_{\frac{1+\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$. Но для нормальной выборки известно **точное** распределение:

$$\sqrt{n-1}\frac{\overline{Z} - \theta}{S} \sim t_{n-1},$$

$$\overline{Z} \pm t_{n-1, \frac{1+\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n-1}}.$$

При исправленной дисперсии $s_Z^2 = n\frac{S^2}{n-1}$ последняя стандартная ошибка равна $\frac{s_Z}{\sqrt{n}}$. Важно согласовать знаменатель дисперсии и формулу интервала.

Стюдент: $T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{V}{k}}} \sim t_k$, если $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $V \sim \chi^2_k$ и они независимы. k — степени свободы; t_1 — Коши, при $k \to \infty$ получаем стандартный нормальный закон. Тяжёлые хвосты дают более широкий интервал при малых n. В демонстрации при $n = 10$ Вальд покрывал около 90% вместо 95%, тогда как интервал Стюдента сохранял заданный уровень.

Доля и преобразование параметра

Для $Z_i \sim \mathrm{Bern}(\theta)$: $\hat{\theta} = \overline{Z}$, $\mathrm{Var}(Z_i) = \theta(1 - \theta)$; ДИ Вальда:

$$\overline{Z} \pm z_{\frac{1+\alpha}{2}} \sqrt{\overline{Z} \cdot \frac{1 - \overline{Z}}{n}}.$$

Это применимо, например, к доле верных ответов фиксированного классификатора на независимом тесте. Нормальное приближение ненадёжно при малом числе успехов или неудач.

Дельта-метод: для гладкого преобразования g и его якобиана $J_{g(\theta)}$ предельная ковариация $g(\hat{\theta})$ равна

$$J_{g(\theta)} \Sigma(\theta) J_{g(\theta)}^T.$$

Пример лекции: $Z_i \sim \mathrm{Exp}(\theta)$, где θ — интенсивность; $EZ_i = \frac{1}{\theta}$, $\mathrm{Var}(Z_i) = \frac{1}{\theta^2}$. Для $g(u) = \frac{1}{u}$ получаем $\hat{\theta} = \frac{1}{\overline{Z}}$, предельную дисперсию θ^2 и ДИ

$$\frac{1}{\overline{Z}} \pm \frac{z_{\frac{1+\alpha}{2}}}{\overline{Z}\sqrt{n}}.$$

Интервалы в линейной регрессии · 13.10.2026 · Коэффициенты, средний отклик, новый объект · 02:01–02:43.

Нормальная гомоскедастичная модель

$$y = X\theta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_n).$$

$X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ фиксирована, $\operatorname{rank}(X) = d < n$; d включает свободный член. Предполагаются верная линейная форма среднего, нулевое среднее шума, его нормальность и одинаковая дисперсия при независимых наблюдениях. Обозначим $A = (X^TX)^{-1}$, $e = y - X\hat\theta$:

$$\hat\theta = AX^Ty, \quad \operatorname{Cov}(\hat\theta) = \sigma^2 A,$$

$$\hat\sigma^2 = \frac{\|e\|^2}{n-d}.$$

Для фиксированного $c \neq 0$:

$$\frac{c^T\hat\theta - c^T\theta}{\hat\sigma\sqrt{c^TAc}} \sim t_{n-d}.$$

Это одна опорная статистика для разных линейных функций коэффициентов. Далее $t_* = t_{n-d,\frac{1+\alpha}{2}}$.

Три разных объекта оценивания

1. Коэффициент θ_j: берём c с единицей в позиции j:

$$\hat\theta_j \pm t_*\hat\sigma\sqrt{A_{jj}}.$$

При коллинеарности неопределённость коэффициентов может быть велика: почти вырожденная X^TX приводит к широким интервалам.

2. Средний отклик $m(x) = E[Y|x] = x^T\theta$: берём $c = x$:

$$\hat m(x) \pm t_*\hat\sigma\sqrt{x^TAx},$$

где $\hat m(x) = x^T\hat\theta$. Это неопределённость положения регрессионной линии, а не разброс отдельных наблюдений.

3. Новый ответ $Y_0 = x_0^T\theta + \varepsilon_0$: новый шум независим от train и имеет распределение $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$. Ошибка прогноза складывается из ошибки оценки среднего и нового шума:

$$\operatorname{Var}(Y_0 - \hat m(x_0)) = \sigma^2(1 + x_0^TAx_0).$$

Предсказательный интервал:

$$\hat m(x_0) \pm t_*\hat\sigma\sqrt{1 + x_0^TAx_0}.$$

Суммируются **дисперсии**, затем извлекается корень. При росте данных ДИ среднего может стянуться к точке; предсказательный интервал сохраняет ширину из-за нового шума. Для времени поездки это различие между точностью оценки среднего времени и разбросом конкретных поездок.

> Интервал для коэффициента, ДИ среднего и предсказательный интервал отвечают на разные вопросы. Приведённые ДИ среднего — **поточечные**: уровень 95% относится к фиксированному x, а не к одновременному накрытию всей регрессионной линии.

Гетероскедастичность и sandwich-оценка

Пусть $E[\varepsilon|X] = 0$, но $\operatorname{Cov}(\varepsilon|X) = V$. Для независимых ошибок $V = \operatorname{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$, причём дисперсии могут различаться, а нормальность не обязательна. МНК сохраняет несмещённость, но формула σ^2A уже не подходит:

$$C = \operatorname{Cov}(\hat\theta|X) = AX^TVXA.$$

Подстановка оценок дисперсий даёт **sandwich-оценку**

$$\hat C = AX^T\hat VXA.$$

При условиях асимптотической нормальности и состоятельности этой оценки:

$$\frac{c^T\hat\theta - c^T\theta}{\sqrt{c^T\hat Cc}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

Значит, робастный ДИ для $c^T\theta$:

$$c^T\hat\theta \pm z_{\frac{1+\alpha}{2}}\sqrt{c^T\hat Cc}.$$

Для коэффициента берём $c = e_j$, для среднего отклика — $c = x$. Это асимптотический результат, а не точный закон Стюдента при произвольном шуме.

HC0–HC3: что подставлять в V

Пусть $H = XAX^T$, $h_i = H_{ii}$, $e_i = y_i - \hat y_i$. В диагональ $\hat V$ подставляются:

$$\text{HC0}: \ e_i^2; \quad \text{HC1}: \ \frac{n}{n-d}e_i^2;$$

$$\text{HC2}: \ \frac{e_i^2}{1-h_i}; \quad \text{HC3}: \ \frac{e_i^2}{(1-h_i)^2}.$$

HC0 — базовая оценка Уайта; HC1 учитывает потерю степеней свободы; HC2 и HC3 корректируют остатки с учётом влияния наблюдения h_i.

Мотивация HC2: даже при гомоскедастичном шуме остатки не имеют ковариацию σ^2I:

$$e = (I-H)y = (I-H)\varepsilon,$$

$$\operatorname{Cov}(e) = \sigma^2(I-H), \quad E\left[e_i^2\right] = \sigma^2(1-h_i).$$

Поэтому e_i^2 занижает дисперсию особенно при большом h_i. HC3 делит ещё на $1-h_i$, давая более консервативную поправку. Эти формулы оценивают ковариацию коэффициентов в совокупности; один квадрат остатка не даёт точного знания локальной дисперсии.

Что именно меняет робастная ковариация

При смене обычной ковариации на HC3 коэффициенты МНК и точечные прогнозы **те же**. Меняются стандартные ошибки и доверительные интервалы. Поправка на гетероскедастичность не устраняет неверную форму среднего и не заменяет модель шума для нового объекта. Независимость наблюдений остаётся существенным условием приведённых HC-формул.

Практика: интервалы и их проверка · 13.10.2026 · Statsmodels, цены квартир, модель дисперсии · 02:43–03:18.

От модели к интервалам в statsmodels

В лекции цена московской квартиры моделируется по площади. Формульный интерфейс:

```
import statsmodels.formula.api as smf
fit = smf.ols("price ~ total_area",
data=train).fit()
fit.conf_int(alpha=0.05)
fit.cov_params()
pred = fit.get_prediction(new_data)
frame = pred.summary_frame(alpha=0.05)
```

Формула включает свободный член; `- 1` убирает его. В матричном интерфейсе порядок аргументов — `OLS(y, X)`. В `summary()` полезны коэффициенты, `std err`, число наблюдений и степени свободы остатков $n - d$.

Столбцы `summary_frame`: `mean` — точечный прогноз; `mean_se` — стандартная ошибка оценки среднего; `mean_ci_lower/upper` — ДИ среднего; `obs_ci_lower/upper` — предсказательный интервал. В обозначениях лекции $\alpha = 0.95$ — доверие, но аргумент библиотеки `alpha=0.05` — вероятность ошибки, то есть $1 - \alpha$ лекции.

Диагностика по остаткам

У больших квартир разброс цен выше; полоса с единой оценкой шума слишком широка для маленьких квартир и слишком узка для больших. Однако разброс Y по одному признаку ещё не доказывает гетероскедастичность: на него могут влиять другие признаки модели. Проверять следует графики **остатков** e_i относительно признаков, прогнозов или порядка наблюдений.

Робастная оценка включается через `.fit(cov_type="HC3")`; для готовой модели есть `get_robustcov_results`. В примере это меняет ДИ коэффициентов и среднего, но **не обеспечивает корректный локальный предсказательный интервал**: стандартный расчёт `obs_ci_*` всё ещё использует общую дисперсию нового шума.



Узкий ДИ среднего и широкая предсказательная полоса с общей оценкой шума. · 13.10 · 03:08:00

Отдельная модель дисперсии

Для $Y_0 = m(x_0) + \varepsilon_0$ с $\mathrm{Var}(\varepsilon_0 | x_0) = \sigma^2(x_0)$ требуется оценить два слагаемых:

$$\hat{v}_{\mathrm{pred}(x_0)} = x_0^T \hat{C} x_0 + \hat{\sigma}^2(x_0).$$

Первое — неопределённость среднего из робастной ковариации; второе — шум нового наблюдения, который нельзя получить одной заменой ковариации. Приём из лекции:

1. Обучить модель среднего и получить остатки e_i на train.
2. Обучить вторую регрессию $x_i \mapsto e_i^2$.
3. Её неотрицательный прогноз использовать как $\hat{\sigma}^2(x_0)$; добавить к `mean_se` в квадрате.
4. Построить полосу $\hat{m}(x_0) \pm q\sqrt{\hat{v}_{\mathrm{pred}(x_0)}}$, затем проверить покрытие на новых данных.

В ноутбуке используется квантиль Стюдента, но для такой двухмодельной процедуры это **приближение**, не точный ДИ из нормальной гомоскедастичной модели. Асимптотическая нормальность коэффициентов сама по себе не делает новый шум нормальным. Форма шума и качество второй модели существенны для покрытия. Сравниваются линейная регрессия, kNN и регрессия Хьюбера для квадратов остатков: гибкость второй модели меняет форму полосы, хотя средний прогноз остаётся линейным.



Отдельная модель дисперсии позволяет ширине полосы зависеть от площади. · 13.10 · 03:17:45

Как оценивать качество интервалов

Для известного параметра в симуляции повторять генерацию выборки и построение ДИ:

$$\hat{p}_{\mathrm{cover}} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} \mathbb{1}\{\theta \in I(D_b)\}.$$

Для предсказательного интервала проверять включение **нового ответа**, а не параметра. В опыте лекции ДИ среднего накрывал новые наблюдения лишь примерно в 25% случаев: высокий уровень доверия не переносится на другой объект оценивания.

Вместе с покрытием смотреть ширину: бесконечно широкий интервал покрывает всё, но не помогает принимать решения. Цель — заданное покрытие при небольшой ширине; у конечного числа повторов доля сама случайна. Для квартир важно также сравнить покрытие в разных диапазонах площади: хорошая общая доля может скрывать слишком узкие интервалы для дорогих объектов.

> **Рабочая цепочка:** определить объект оценивания → проверить предположения → выбрать ковариацию и квантиль → учесть новый шум, если нужен прогноз → проверить покрытие и ширину.

06 · Проверка гипотез и GLM

20.10.2026 · Статистические критерии и обобщённые линейные модели.

Проверка гипотез: постановка и ошибки · 20.10.2026 · Сравнение моделей, биномиальный критерий · 00:00–01:29.

Различие метрик или случайный разброс?

Две модели могут немного отличаться по качеству на одной выборке, но это ещё не означает устойчивого улучшения на новых данных. В продукте сравнивают не только ML-метрики, но и деньги, клики, регистрации, длительность сессии: внедрение новой модели имеет цену и риски. Требуется отделить эффект от случайности наблюдений.

Простой опыт: пользователю показывают два ответа, и он выбирает предпочтительный. Пусть $X_i = 1$ — голос за модель 1, $X_i = 0$ — за модель 0; $X_1, \dots, X_n$ независимы и имеют распределение $\mathrm{Bern}(\theta)$. Гипотезы:

$$H_0 : \theta = \frac{1}{2}, \quad H_1 : \theta \neq \frac{1}{2}.$$

При H_0 обе модели выбирают одинаково часто. Направленные альтернативы: $\theta > \frac{1}{2}$ либо $\theta < \frac{1}{2}$. Это разные задачи: найти любое отличие или преимущество конкретной модели.

Статистика и критическая область

Статистика $T(D)$ — вычисляемая по выборке величина для принятия решения. Здесь достаточно числа голосов:

$$T = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathrm{Bin}(n, \theta).$$

При H_0 распределение $\mathrm{Bin}\left(n, \frac{1}{2}\right)$ известно и сосредоточено около $\frac{n}{2}$. При $\theta = \frac{3}{4}$ оно сдвигается к $3\frac{n}{4}$. Крайние значения говорят против H_0, но не невозможны при ней: любое число голосов от 0 до n имеет положительную вероятность при $0 < \theta < 1$.

Критерий задаёт множество S выборок, при которых H_0 отвергается. Часто его записывают через статистику: $S = \{D : T(D) \in C\}$, где C — критическая область значений статистики. Наблюдаем выборку и решение, но не знаем, истинна ли гипотеза.

> **Отвергаем** H_0 — обнаружили статистически значимое противоречие с ней. **Не отвергаем** H_0 — данных недостаточно для отвержения, а не доказано равенство моделей. Отсутствие доказательств против гипотезы не является доказательством её истинности.

Два вида ошибок

I рода: отвергли верную H_0 — например, внедрили модель без реального выигрыша. **II рода:** не отвергли неверную H_0 — пропустили существующее отличие. Какую ошибку считать более опасной, определяет прикладная задача; в рассматриваемом подходе явно контролируется ошибка I рода.

Уровень значимости и мощность

Для $H_0 : \theta = \theta_0$ вероятность ошибки I рода:

$$P_{\theta_0}(D \in S) \leq \alpha.$$

α — **уровень значимости**, обычно 0.05. В этой лекции это вероятность ошибки, а не уровень доверия: ей соответствует ДИ уровня $1 - \alpha$ (в предыдущей главе доверие обозначалось α). Индекс у P_θ задаёт распределение данных при фиксированном параметре; это не вероятность того, что сама гипотеза верна.

При $\theta \in H_1$ вероятность ошибки II рода равна

$$P_{\theta(D \notin S)}.$$

Она зависит от истинного эффекта θ. **Мощность** критерия — вероятность обнаружить отличие:

$$\pi_{S(\theta)} = P_{\theta(D \in S)} = 1 - P_{\theta(D \notin S)}.$$

На доске мощность обозначалась $\beta_{S(\theta)}$. Задача: ограничить ошибку I рода уровнем α и сделать мощность как можно выше. Всегда не отвергать H_0 безопасно по ошибке I рода, но даёт нулевую мощность. Расширение области отвержения повышает и мощность, и риск ошибки I рода. Лучшего критерия одновременно для всех альтернатив может не существовать.

Точный биномиальный пример

Для двусторонней альтернативы берём два хвоста распределения при H_0, каждый с вероятностью не более $\frac{\alpha}{2}$. Обозначим F_0 функцию распределения $\mathrm{Bin}\left(n, \frac{1}{2}\right)$ и

$$u = \inf\left\{t : F_0(t) \geq \frac{\alpha}{2}\right\}.$$

Консервативное симметричное правило из лекции:

$$\text{Отвергнуть } H_0 \quad \text{при } T < u \text{ или } T > n - u.$$

Для целого T это $T \leq u - 1$ либо $T \geq n - u + 1$. **Дискретность существенна:** нельзя без проверки включать граничный столбик — его вероятность может вывести ошибку I рода за заданный уровень. Поэтому фактический размер теста может быть меньше α.

При $\alpha = 0.05$:

- $n = 20$: отвергаем при $T \leq 5$ или $T \geq 15$.
- $n = 100$: отвергаем при $T \leq 39$ или $T \geq 61$.

Границы считаются **при нулевой гипотезе**, а не по предполагаемому эффекту. Одни и те же границы затем используются для оценки ошибок при разных θ. В опыте с $\theta = \frac{3}{4}$ маленькая выборка иногда не выявляла отличие; с увеличением n отвержений становилось больше: мощность возрастала.

```
u = scipy.stats.binom.ppf(alpha / 2, n=n, p=0.5)
reject = (votes < u) | (votes > n - u)
```

Для $H_1 : \theta > \frac{1}{2}$ нужен правый хвост, для $\theta < \frac{1}{2}$ — левый. Направление альтернативы выбирают по задаче до просмотра результата.

Вальд, линейная регрессия и A/B-тест · 20.10.2026 · Направление альтернативы, значимость коэффициентов · 01:29–02:32.

Критерий Вальда из АНО

Если $\sqrt{n}(\hat{\theta}-\theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, s^2(\theta))$, а $\hat{s}$ состоятельно оценивает $s(\theta) > 0$, то при $H_0 : \theta = \theta_0$

$$W = \frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}-\theta_0)}{\hat{s}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$


Теперь статистику можно вычислить: неизвестное значение в числителе заменено на значение из H_0. Правила отвержения асимптотического уровня α:

- $H_1 : \theta \neq \theta_0$: $|W| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$.
- $H_1 : \theta > \theta_0$: $W > z_{1-\alpha}$.
- $H_1 : \theta < \theta_0$: $W < z_{\alpha}$.

Для доли $\hat{\theta} = \overline{X}$ и $\hat{s} = \sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}$. Это приближение, в отличие от точного биномиального критерия. При всех одинаковых ответах знаменатель Вальда обращается в ноль; нормальное приближение на границе не работает.

Чувствительность зависит от альтернативы

Односторонний критерий тратит весь допустимый риск на один хвост, поэтому лучше обнаруживает эффект в выбранном направлении. Двусторонний распределяет риск между хвостами: обнаруживает изменения обоих знаков, но имеет меньшую мощность в каждом заданном направлении. Эффект противоположного знака односторонний тест может не выявить.



Эскиз мощности: односторонние критерии чувствительны к своему направлению, двусторонний — к обоим. · 20.10 · 01:50:00

Значимость коэффициента линейной модели

Пусть $y = X\theta + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$, $\operatorname{rank}(X) = d < n$, где d включает свободный член. Обозначим $A = (X^T X)^{-1}$ и $\hat{\sigma}^2 = \frac{\|y - X\hat{\theta}\|^2}{n-d}$. При $H_0 : \theta_j = 0$:

$$T_j = \frac{\hat{\theta}_j}{\hat{\sigma}\sqrt{A_{jj}}} \sim t_{n-d}.$$

Двусторонний тест отвергает H_0 при $|T_j| > t_{n-d,1-\frac{\alpha}{2}}$. Это тот же результат, что отсутствие 0 в соответствующем ДИ уровня $1-\alpha$. Значимость относится к коэффициенту при прочих включённых признаках, а не доказывает причинное влияние или полезность признака во всех моделях.

Если дисперсия шума неодинакова

Вместо $\hat{\sigma}^2 A$ используем робастную оценку ковариации $\hat{C}$ из главы 5:

$$T_j = \frac{\hat{\theta}_j}{\sqrt{\hat{C}_{jj}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \quad \text{при } H_0.$$

В лекции для конечной выборки предложено брать более широкий порог Стюдента. Это поправка-приближение: при гетероскедастичности точного распределения t_{n-d} для такой статистики в общем случае нет.

A/B-тест как регрессия на индикатор группы

Пользователи случайно разделены на две независимые группы: A использует старую модель, B — новую. $Y_{\{iA\}}$ и $Y_{\{iB\}}$ — продуктовая метрика; сравниваем средние a и b:

$$H_0 : a = b, \quad H_1 : a \neq b.$$

Объединим ответы и введём $G_i = 0$ для A, $G_i = 1$ для B:

$$Y_i = \theta_0 + \theta_1 G_i + \varepsilon_i.$$

Тогда $\theta_0 = a$, $\theta_1 = b - a$ — эффект эксперимента. Проверка равенства средних сводится к $H_0 : \theta_1 = 0$ обычным тестом коэффициента. Знак оценки показывает направление эффекта; двустороннее отвержение само по себе ещё не означает, что новая модель **лучше**. Новая модель может изменить не только среднее, но и разброс метрики. Поэтому одинаковые дисперсии групп не следует предполагать автоматически: в лекции рекомендуется робастная ковариация. Это не исправляет зависимость наблюдений — для неё нужны отдельные методы.

Снижение дисперсии: добавляем доступные до эксперимента признаки Z_i, например прошлые покупки и возраст:

$$Y_i = \theta_0 + \theta_1 G_i + \gamma^T Z_i + \varepsilon_i.$$

Коэффициент θ_1 описывает изменение при смене группы и фиксированных Z_i. Объяснение части разброса метрики может уменьшить стандартную ошибку эффекта и повысить мощность; в лекции это связывается с подходом CUPED. С дополнительными признаками θ_0 — базовый отклик при $Z = 0$, а не обязательно безусловное среднее A.

Практика в statsmodels

```
fit = smf.ols("price ~ total_area + living_area",
              data=train).fit(cov_type="HC3")
fit.t_test("total_area = 0")
fit.t_test("2 * total_area = 1")
fit.f_test("(total_area = 0), (living_area = 0)")
fit.f_test("total_area = living_area")
```

В строке ограничения имя признака означает **его коэффициент**, не значение признака. `f_test` позволяет проверять несколько линейных ограничений совместно. Столбец `P>|t|` или `P>|z|` — p-value: в лекции используется только правило «меньше 0.05 — отвергаем на уровне 5%»; подробное определение не разбирается. Формульный интерфейс может исключить строки с пропусками: проверять `nobs`.

Обобщённые линейные модели (GLM) · 20.10.2026 · Средний таргет, функция связи, ММП и интервалы · 02:32–03:09.

Что обобщаем

В обычной линейной регрессии прогнозируем среднее $\mu(x) = E[Y|x] = x^T\theta$, а наблюдение отличается от среднего шумом. Для счётчиков и бинарных ответов нормальный закон с постоянной дисперсией не соответствует природе таргета. GLM сохраняет линейный предиктор, но меняет распределение отклика и связь со средним:

$$\eta(x) = x^T\theta, \quad g(\mu(x)) = \eta(x),$$
$$\mu(x) = g^{-1}(\eta(x)), \quad Y_i|x_i \sim P_{\mu(x_i)}.$$

g — **функция связи**, в лекции «линеаризация ожидаемого таргета». Линеаризуется среднее, а не каждое наблюдаемое Y_i.

Счётчики: пуассоновская регрессия

При фиксированной интенсивности число событий за единицу времени имеет закон Пуассона; в пуассоновском процессе время между событиями экспоненциально. Примеры: клиенты в час, запросы к серверу в минуту, заказы такси. Интенсивность может зависеть от погоды, пробок, времени суток и других признаков. Для одинаковых интервалов наблюдения:

$$Y_i|x_i \sim \text{Pois}(\lambda(x_i)), \quad E[Y_i|x_i] = \lambda(x_i) > 0.$$

Выбираем логарифмическую связь:

$$\log\lambda(x) = x^T\theta, \quad \lambda(x) = \exp(x^T\theta).$$

Экспонента обеспечивает положительность; аддитивное изменение предиктора превращается в мультипликативное изменение интенсивности. Если $\eta = 0$, интенсивность равна 1; сдвиги $+a$ и $-a$ дают множители $\exp(a)$ и $\exp(-a)$. При увеличении признака x_j на единицу, прочие равны, среднее число событий умножается на $\exp(\theta_j)$. Прогноз среднего может быть нецелым, хотя наблюдения — целые неотрицательные числа.

Бинарный ответ: логистическая регрессия

$$Y_i|x_i \sim \text{Bern}(p(x_i)), \quad E[Y_i|x_i] = p(x_i).$$

Вероятность нельзя неограниченно умножать: из 0.9 нельзя получить 1.8. Вместо неё рассматриваем шансы $\frac{p}{1-p} > 0$ и логарифм шансов:

$$g(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right) = x^T\theta,$$
$$p(x) = \frac{1}{1+\exp(-x^T\theta)}.$$

При $\eta = 0$ вероятность $1/2$; η и $-\eta$ дают взаимодополняющие вероятности. Множитель $\exp(\theta_j)$ относится к **шансам**, а не к вероятности. Например, при $p = 0.9$ шансы равны 9. Так логистическая регрессия становится частным случаем GLM; гауссовская модель соответствует тождественной связи $g(\mu) = \mu$.

Условия статистических выводов: предполагается верная модель среднего, в частности линейность логита. Экспоненциальное семейство само по себе не гарантирует конечного единственного ММП: нужны идентифицируемость и существование решения. Например, при полной разделимости логистические коэффициенты могут уходить в бесконечность.

Оценивание и информация Фишера

Для независимых наблюдений оцениваем параметры методом максимального правдоподобия:

$$L(\theta) = \prod_i p_{g^{-1}(x_i^T\theta)}(y_i) \to \max_\theta.$$

Решение обычно ищется численно. Для регулярной корректно заданной модели при невырожденной информации ММП асимптотически нормальна:

$$(\mathcal{I}_n(\theta))^{\frac{1}{2}}(\hat\theta - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I_d),$$
$$\mathcal{I}_n(\theta) = -E\left[\nabla^2_\theta \log L(\theta)\right].$$

Здесь информация относится ко **всей выборке**, поэтому отдельного $\sqrt{n}$ нет. Приближённая ковариация оценки: $\hat C = \left(\mathcal{I}_n(\hat\theta)\right)^{-1}$. Частные случаи:

$$\text{Гаусс}: \quad \mathcal{I}_n = \sigma^{-2}X^TX;$$
$$\text{Логит}: \quad \mathcal{I}_n = X^T\,\text{diag}(p_i(1-p_i))X;$$
$$\text{Пуассон}: \quad \mathcal{I}_n = X^T\,\text{diag}(\lambda_i)X.$$

Интервалы: сначала линейная шкала

Обозначим $z_* = z_{1-\frac{\alpha}{2}}$. Для коэффициента получаем приближённый ДИ

$$\hat\theta_j \pm z_*\sqrt{\hat C_{jj}}.$$

Деление $\hat\theta_j$ на стандартную ошибку даёт статистику проверки $\theta_j = 0$. Для нового фиксированного x_0:

$$\hat\eta_0 = x_0^T\hat\theta, \quad \delta = z_*\sqrt{x_0^T\hat C x_0}.$$

ДИ для η_0: $[\hat\eta_0 - \delta, \hat\eta_0 + \delta]$. Если g^{-1} возрастает, преобразуем **обе границы**:


$$\left[g^{-1}(\hat\eta_0 - \delta), g^{-1}(\hat\eta_0 + \delta)\right].$$

Для логита применяем сигмоиду, для Пуассона — экспоненту. Полоса на шкале среднего обычно несимметрична и остаётся в допустимой области. Это ДИ **среднего/вероятности**, не предсказательный интервал отдельного ответа.

Пример: вероятность доброкачественной опухоли

```
fit = smf.glm(formula, data=train,
              family=sm.families.Binomial()).fit()
fit.conf_int(alpha=0.05)
pred = fit.get_prediction(new_data)
pred.summary_frame(alpha=0.05)
```

Сводка содержит коэффициенты, стандартные ошибки, z-статистики, p-value и интервалы. Для интерпретации можно варьировать один признак, фиксируя остальные на средних значениях.



Вероятность доброкачественной опухоли и поточечные 95%-ДИ при варьировании признаков. · 20.10 · 03:08:20

Пересечение полосой порога 0.5 показывает неопределённость оценки вероятности около порога, но не является диагнозом или гарантией качества классификации.