

תגובות קשות | תגובה אנפילקטית



תופעות שונות

התגובה מחמירה, תחושה לא טובה או מופיעים סימנים במספר מערכות



לוע*

תחושת צריבה או מלאות בלוע, צרידות, כחכוך



דרכי עיכול

בחילה, כאב בטן, עווית, הקאה, שלשול חמור



לב*

דופק חלש, עירפול הכרה, התעלפות, חיוורון, הכחלה



ריאות*

קוצר נשימה, שיעול, צפצופים



פה

נפיחות רצינית, בשפתיים, בלשון או בפה



עור

פריחה מופשט, נפיחות בגפיים

הזרק אפיפן מיד

מינון 0.3mg IM \ 0.15mg

במקרה ויש תגובה נשימתית או תגובה המערבת שתי מערכות - להזריק אדרנלין מיד

- חומרת התסמינים וערוב המערכות יכולות להשתנות במהירות.
- כל התסמינים המופיעים ב * עלולים להתפתח לתגובה מסכנת חיים

תגובות קלות



עור

פריחה וגרד קל



אף

גרד, עיטושים, נזלת מימית



דרכי עיכול

בחילה קלה, חוסר נוחות



פה

גרד ונפיחות, בשפתיים, בלשון או בפה


אנטיהיסטמין

(פנסטיל וכו')


1 - הוצאת המזרק מהקופסא השקופה.
2 - הוצאת הנצרה הכחולה במשיכה כלפי מעלה.



3 - קירוב הקצה הכתום לחלק החיצוני של הירך.
4 - הצמדת החלק הכתום לירך בלחיצה עד לשמיעת קליק. השארת המזרק בלחיצה על הירך כ- 3 שניות.



5 - לאחר ההזרקה יש לדאוג שהילד/ה נמצא בשיבה או שכיבה בלבד.



6 - מזעיקים נידת טיפול נמרץ לפינוי הילד. חשוב לציין בשיחה שהילד קיבל אפיפן עקב תגובה אלרגית.



7 - מתקשרים להורים לעדכן.



8 - בסיום הפעולה כדאי להחזיר את המזרק לתוך הקופסא שלו ולכתוב עליו את שעת ההזרקה.



9 - לאחר ההזרקה יש לדאוג שהילד/ה נמצא בשיבה או שכיבה בלבד.

