

## Blatt 2

Ruedi Lüthi

15. Mai 2019

### 5

Sei  $f(x, y, z) = 4 \cos z \arctan(ye^{-x^2})$

Mit Definition:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hr) - f(x_0)}{h} &= \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 \cos\left(\frac{\pi}{4} + h\sqrt{14}\right) \arctan\left((1+h)e^{-(0+h)^2}\right) - 4 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \arctan\left(1e^{-0^2}\right)}{h} &= \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 \cos\left(\frac{\pi}{4} + h\sqrt{14}\right) \arctan\left((1+h)e^{-h^2}\right) - 4 \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\pi}{4}}{h} &\stackrel{\text{Regel von de l'Hospital}}{=} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4 \sin\left(\frac{\pi}{4} + h\sqrt{14}\right) \sqrt{14} \arctan\left((1+h)e^{-h^2}\right) + 4 \cos\left(\frac{\pi}{4} + h\sqrt{14}\right) \frac{e^{h^2}(1-2h-2h^2)}{e^{2h^2} + (1+h)^2}}{1} &= \\ -4 \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{14} \frac{\pi}{4} + 4 \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{2} &= -\sqrt{7}\pi + \sqrt{2} \end{aligned}$$

Mit Jacobi-Matrix:

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= \begin{pmatrix} 4 \cos z \frac{1}{1+(ye^{-x^2})^2} \cdot ye^{-x^2} \cdot -2x = -8 \cos z \cdot xy \frac{e^{-x^2}}{e^{-2x^2}(e^{2x^2}+y^2)} = -\frac{8 \cos z \cdot xy \cdot e^{x^2}}{e^{2x^2}+y^2} \\ 4 \cos z \frac{1}{1+(ye^{-x^2})^2} \cdot e^{-x^2} = 4 \cos z \frac{e^{-x^2}}{e^{-2x^2}(e^{2x^2}+y^2)} = \frac{4 \cos z \cdot e^{x^2}}{e^{2x^2}+y^2} \\ -4 \sin z \arctan(ye^{-x^2}) \end{pmatrix} \\ \nabla f(x_0) = \nabla f\left(0, 1, \frac{\pi}{4}\right) &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\frac{4}{\sqrt{2}}}{1+1} = \frac{2}{\sqrt{2}} \\ -4 \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ \nabla f(x_0)^\top r &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2}{\sqrt{2}} \\ -\frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \sqrt{14} \end{pmatrix} = 0 + \frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{\pi\sqrt{14}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} - \pi\sqrt{7} \end{aligned}$$

### 6

Warum gilt  $|y| < \delta$ ?

Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig und  $\delta_\varepsilon = \varepsilon$ , dann gilt für  $f(x, y)$  stetig:

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = \left| \frac{|x|y}{|x| + y^2} - 0 \right| \stackrel{|x| \neq 0}{=} \left| \frac{y}{1 + \frac{y^2}{|x|}} \right| \stackrel{\frac{y^2}{|x|} \geq 0}{\leq} |y| < \delta_\varepsilon = \varepsilon$$

Sei  $r = (r_x, r_y)^\top$  eine beliebige Richtung:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} f(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hr) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + hr_x, 0 + hr_y) - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{|hr_x| |hr_y|}{|hr_x| + (hr_y)^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|hr_x| r_y}{|hr_x| + h^2 r_y^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|hr_x| r_y}{|hr_x| (1 + \underbrace{\frac{h^2 r_y^2}{|hr_x|}}_{\xrightarrow{h \rightarrow 0} 0})} = r_y \end{aligned}$$

Die Funktion ist nicht total differenzierbar da die Jacobi-Matrix nicht existiert, denn:

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{|x|y}{|x| + y^2} \Rightarrow \text{nicht diff'bar da } |x| \text{ nicht diff'bar in } x = 0 \text{ ist}$$

7

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & (x, y) = (0, 0) \\ \frac{y \sin(xy)}{x^2 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

Nebenrechnung: Für  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$  gilt:

$$\frac{2\alpha}{\pi} < \sin(\alpha) < 1$$

Nicht stetig, da

$$x_0(t) = \begin{pmatrix} t \\ \sqrt{t} \end{pmatrix} \quad \lim_{t \rightarrow 0} f(x_0(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t} \sin(t\sqrt{t})}{t^2 + \sqrt{t}^4} > \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t} \frac{2}{\pi} t \sqrt{t}}{t^2 + t^2} = \frac{2}{\pi} \frac{t^2}{2t^2} = \pi$$

Sei  $r = (r_x, r_y)^\top$  eine beliebige Richtung:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} f(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hr) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + hr_x, 0 + hr_y) - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{hr_y \sin(h^2 r_x r_y)}{h^2 r_x^2 + h^4 r_y^4}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r_y \sin(h^2 r_x r_y)}{h^2 r_x^2 + h^4 r_y^4} \stackrel{\text{IH}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r_y \cos(h^2 r_x r_y) 2hr_x r_y}{2hr_x^2 + 4h^3 r_y^4} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r_x r_y^2 \overbrace{\cos(h^2 r_x r_y)}^{\xrightarrow{h \rightarrow 0} 1}}{r_x^2 + \underbrace{2h^2 r_y^4}_{\xrightarrow{h \rightarrow 0} 0}} = \frac{r_y^2}{r_x} \end{aligned}$$

## 10

a)

Sei  $(a_k) = \begin{pmatrix} (a_k)_1 \\ \vdots \\ (a_k)_n \end{pmatrix} \subset \mathbb{R}^n$  eine Folge und sei  $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ .

$$\text{zu zeigen: } \lim_{k \rightarrow \infty} (a_k) = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} (a_k)_j = a_j \quad \forall j = 1, \dots, n$$

es gilt:

$$|(a_k)_j - a_j| = \sqrt{|(a_k)_j - a_j|^2} \leq \underbrace{\sqrt{|(a_k)_1 - a_1|^2 + \dots + |(a_k)_n - a_n|^2}}_{= \|(a_k) - a\|_2} \leq \sqrt{n} \max_{j \in \{1, \dots, n\}} ((a_k)_j - a_j)$$

Gilt  $\lim_{k \rightarrow \infty} \max_{j \in \{1, \dots, n\}} ((a_k)_j - a_j) \rightarrow 0$  so gehen auch alle andere Komponenten gegen Null.

b)

Wegen  $(a_k) \subset \mathbb{R}^n$  beschränkt gilt:

$$\exists c > 0 \text{ mit } \|(a_k)\| < c \quad \forall k$$

Weiter gilt:

$$c > \|(a_k)\| > \underbrace{\|(a_k) \cdot e_i\|}_{=(b_k)} \text{ mit } (b_k) \subset (a_k)$$

Aus der Konstruktion von  $(b_k)$  folgt:

$$(b_k) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ (b_k)_i \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dabei ist  $(b_k)_i$  eine beschränkte Folge in  $\mathbb{R}$  und nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß besitzt diese eine konvergente Teilfolge.