



合肥工业大学

HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

复变函数与积分变换

张神星 (合肥工业大学)

办公室: 翡翠科教楼 B1810 东

Email: zhangshenxing@hfut.edu.cn

课件地址: <https://zhangshenxing.gitee.io>

第四章 级数

① 复数项级数

第一节 幂级数

- 复数项级数
- 绝对收敛和条件收敛

复变函数级数与实变量函数级数也是类似的.

定义

复变函数级数与实变量函数级数也是类似的.

定义

- 设 $\{f_n(z)\}_{n \geq 1}$ 是一个复变函数列, 其中每一项都在区域 D 上有定义.

复变函数级数与实变量函数级数也是类似的.

定义

- 设 $\{f_n(z)\}_{n \geq 1}$ 是一个复变函数列, 其中每一项都在区域 D 上有定义. 表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 称为复变函数项级数.

复变函数级数与实变量函数级数也是类似的.

定义

- 设 $\{f_n(z)\}_{n \geq 1}$ 是一个复变函数列, 其中每一项都在区域 D 上有定义. 表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 称为复变函数项级数.
- 对于 $z_0 \in D$, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z_0)$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 z_0 处收敛, 相应级数的值称为它的和.

复变函数级数与实变量函数级数也是类似的.

定义

- 设 $\{f_n(z)\}_{n \geq 1}$ 是一个复变函数列, 其中每一项都在区域 D 上有定义. 表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 称为复变函数项级数.
- 对于 $z_0 \in D$, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z_0)$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 z_0 处收敛, 相应级数的值称为它的和.
- 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 上处处收敛, 则它的和是一个函数, 称为和函数.

定义

称形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的函数项级数为**幂级数**.

定义

称形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的函数项级数为**幂级数**.

我们只需要考虑 $a=0$ 情形的幂级数, 因为二者的收敛范围与和函数只是差一个平移.

定义

称形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的函数项级数为**幂级数**.

我们只需要考虑 $a = 0$ 情形的幂级数, 因为二者的收敛范围与和函数只是差一个平移.

对于复变函数幂级数, 我们也有阿贝尔定理.

阿贝尔定理

定义

称形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的函数项级数为**幂级数**.


我们只需要考虑 $a=0$ 情形的幂级数, 因为二者的收敛范围与和函数只是差一个平移.

对于复变函数幂级数, 我们也有阿贝尔定理.

阿贝尔定理

- (1) 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z_0 \neq 0$ 处收敛, 那么对任意 $|z| < |z_0|$ 的 z , 该级数必绝对收敛.
- (2) 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z_0 \neq 0$ 处发散, 那么对任意 $|z| > |z_0|$ 的 z , 该级数必发散.

从阿贝尔定理我们可以得到幂级数的收敛域.



绝对收敛


发散

证明

(2)可由(1)的逆否命题得到.



都有可能



发散


证明

(2)可由(1)的逆否命题得到. 我们来证明(1). 因为级数收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n z_0^n = 0$. 于是存在 M 使得 $|c_n z_0^n| < M$. 如果 $|z| < |z_0|$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n| = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n z_0^n| \cdot \left| \frac{z}{z_0} \right|^n$$



都有可能



发散


证明

(2)可由(1)的逆否命题得到. 我们来证明(1). 因为级数收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n z_0^n = 0$. 于是存在 M 使得 $|c_n z_0^n| < M$. 如果 $|z| < |z_0|$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n| = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n z_0^n| \cdot \left| \frac{z}{z_0} \right|^n \leq M \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{z}{z_0} \right|^n = \frac{M}{1 - \left| \frac{z}{z_0} \right|}.$$



都有可能



发散

证明

(2)可由(1)的逆否命题得到. 我们来证明(1). 因为级数收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n z_0^n = 0$. 于是存在 M 使得 $|c_n z_0^n| < M$. 如果 $|z| < |z_0|$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n| = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n z_0^n| \cdot \left| \frac{z}{z_0} \right|^n \leq M \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{z}{z_0} \right|^n = \frac{M}{1 - \left| \frac{z}{z_0} \right|}.$$

所以级数在 z 处绝对收敛.



例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots$ 的收敛半径与和函数.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots$ 的收敛半径与和函数.

解

如果幂级数收敛, 则由 $z^n \rightarrow 0$ 可知 $|z| < 1$.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots$ 的收敛半径与和函数.

解

如果幂级数收敛, 则由 $z^n \rightarrow 0$ 可知 $|z| < 1$. 当 $|z| < 1$ 时, 和函数为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z}.$$

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots$ 的收敛半径与和函数.

解

如果幂级数收敛, 则由 $z^n \rightarrow 0$ 可知 $|z| < 1$. 当 $|z| < 1$ 时, 和函数为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z}.$$

因此收敛半径为 1.

由正项级数的相应判别法容易得到公式 $R = \frac{1}{r}$, 其中

(1) 达朗贝尔公式 (比值法): $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|$ (假设存在);

由正项级数的相应判别法容易得到公式 $R = \frac{1}{r}$, 其中

(1) 达朗贝尔公式 (比值法): $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|$ (假设存在);

(2) 柯西公式 (根式法): $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$ (假设存在);

由正项级数的相应判别法容易得到公式 $R = \frac{1}{r}$, 其中

(1) 达朗贝尔公式 (比值法): $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|$ (假设存在);

(2) 柯西公式 (根式法): $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$ (假设存在);

(3) 柯西-阿达马公式: $r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$.

由正项级数的相应判别法容易得到公式 $R = \frac{1}{r}$, 其中

(1) 达朗贝尔公式 (比值法): $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|$ (假设存在);

(2) 柯西公式 (根式法): $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$ (假设存在);

(3) 柯西-阿达马公式: $r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$.

如果 $r = 0$ 或 $+\infty$, 则 $R = +\infty$ 或 0 .

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ 的收敛半径, 并讨论 $z=0, 2$ 的情形.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ 的收敛半径, 并讨论 $z=0, 2$ 的情形.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ 可知收敛半径为 1.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ 的收敛半径, 并讨论 $z=0, 2$ 的情形.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ 可知收敛半径为 1.

当 $z=2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ 的收敛半径, 并讨论 $z=0, 2$ 的情形.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ 可知收敛半径为 1.

当 $z=2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

当 $z=0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ 的收敛半径, 并讨论 $z=0, 2$ 的情形.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ 可知收敛半径为 1.

当 $z=2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

当 $z=0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛.

事实上, 收敛圆周上既可能处处收敛, 也可能处处发散, 也可能既有收敛的点也有发散的点.

例题：收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(in) z^n$ 的收敛半径.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(in)z^n$ 的收敛半径.

解

我们有 $c_n = \cos(in) = \frac{e^n + e^{-n}}{2}$.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(in)z^n$ 的收敛半径.

解

我们有 $c_n = \cos(in) = \frac{e^n + e^{-n}}{2}$. 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1} + e^{-n-1}}{e^n + e^{-n}} = e \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + e^{-2n-2}}{1 + e^{-2n}} = e$$

可知收敛半径为 $\frac{1}{e}$.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n$ 的收敛半径.

例题: 收敛半径的计算

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n$ 的收敛半径.

解

由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = |1+i| = \sqrt{2}$$

可知收敛半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

例题: 收敛半径的计算 *

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径并讨论在收敛圆周上的情形, 其中 $p \in \mathbb{R}$.

例题: 收敛半径的计算 *

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径并讨论在收敛圆周上的情形, 其中 $p \in \mathbb{R}$.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = 1$ 可知收敛半径为 1.

例题: 收敛半径的计算 *

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径并讨论在收敛圆周上的情形, 其中 $p \in \mathbb{R}$.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = 1$ 可知收敛半径为 1. 设 $|z| = 1$.

例题: 收敛半径的计算 *

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径并讨论在收敛圆周上的情形, 其中 $p \in \mathbb{R}$.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = 1$ 可知收敛半径为 1. 设 $|z| = 1$.

- 若 $p > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛,

例题: 收敛半径的计算 *

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径并讨论在收敛圆周上的情形, 其中 $p \in \mathbb{R}$.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = 1$ 可知收敛半径为 1. 设 $|z| = 1$.

- 若 $p > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 原级数在收敛圆周上处处绝对收敛.

例题: 收敛半径的计算 *

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径并讨论在收敛圆周上的情形, 其中 $p \in \mathbb{R}$.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = 1$ 可知收敛半径为 1. 设 $|z| = 1$.

- 若 $p > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 原级数在收敛圆周上处处绝对收敛.
- 若 $p \leq 0$, $\left| \frac{z^n}{n^p} \right| = \frac{1}{n^p} \not\rightarrow 0$,

例题: 收敛半径的计算 *

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径并讨论在收敛圆周上的情形, 其中 $p \in \mathbb{R}$.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = 1$ 可知收敛半径为 1. 设 $|z| = 1$.

- 若 $p > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 原级数在收敛圆周上处处绝对收敛.
- 若 $p \leq 0$, $\left| \frac{z^n}{n^p} \right| = \frac{1}{n^p} \not\rightarrow 0$, 原级数在收敛圆周上处处发散.

例题: 收敛半径的计算 *

回忆狄利克雷判别法: 若 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 部分和有界, 实数项数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 单调趋于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

例题: 收敛半径的计算 *

回忆狄利克雷判别法: 若 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 部分和有界, 实数项数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 单调趋于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

续解

例题: 收敛半径的计算 *

回忆狄利克雷判别法: 若 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 部分和有界, 实数项数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 单调趋于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

续解

- 若 $0 < p \leq 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散,

例题: 收敛半径的计算 *

回忆狄利克雷判别法: 若 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 部分和有界, 实数项数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 单调趋于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

续解

- 若 $0 < p \leq 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散, 而在收敛圆周上其它点 $z \neq 1$ 处,

$$|z + z^2 + \cdots + z^n| = \left| \frac{z(1 - z^n)}{1 - z} \right| \leq \frac{2}{|1 - z|}$$

有界, 数列 $\{n^{-p}\}_{n \geq 1}$ 单调趋于 0,

例题: 收敛半径的计算 *

回忆狄利克雷判别法: 若 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 部分和有界, 实数项数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 单调趋于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

续解

- 若 $0 < p \leq 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散, 而在收敛圆周上其它点 $z \neq 1$ 处,

$$|z + z^2 + \cdots + z^n| = \left| \frac{z(1 - z^n)}{1 - z} \right| \leq \frac{2}{|1 - z|}$$

有界, 数列 $\{n^{-p}\}_{n \geq 1}$ 单调趋于 0, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 收敛.

例题: 收敛半径的计算 *

回忆狄利克雷判别法: 若 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 部分和有界, 实数项数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 单调趋于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

续解

- 若 $0 < p \leq 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散, 而在收敛圆周上其它点 $z \neq 1$ 处,

$$|z + z^2 + \dots + z^n| = \left| \frac{z(1 - z^n)}{1 - z} \right| \leq \frac{2}{|1 - z|}$$

有界, 数列 $\{n^{-p}\}_{n \geq 1}$ 单调趋于 0, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 收敛. 故该级数在 $z = 1$ 发散, 在收敛圆周上其它点收敛.

定理

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 R , 则在 $|z| < R$ 上:

(1) 它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 解析,

(2) $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n z^{n-1}$,

定理

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 R , 则在 $|z| < R$ 上:

(1) 它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 解析,

(2) $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n z^{n-1}$,

(3) $\int_0^z f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} z^{n+1}$.

定理

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 R , 则在 $|z| < R$ 上:

(1) 它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 解析,

(2) $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n z^{n-1}$,

(3) $\int_0^z f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} z^{n+1}$.

也就是说, 在收敛圆内, 幂级数的和函数解析, 且可以逐项求导, 逐项积分.

由于和函数在 $|z| > R$ 上没有定义, 因此在 $|z| = R$ 上处处不解析.

由于和函数在 $|z| > R$ 上没有定义, 因此在 $|z| = R$ 上处处不解析.

如果函数 $g(z)$ 在该幂级数收敛的点处和 $f(z)$ 均相同, 则 $g(z)$ 也一定在收敛圆周上有奇点.

由于和函数在 $|z| > R$ 上没有定义, 因此在 $|z| = R$ 上处处不解析.

如果函数 $g(z)$ 在该幂级数收敛的点处和 $f(z)$ 均相同, 则 $g(z)$ 也一定在收敛圆周上有奇点. 这是因为一旦 $g(z)$ 在收敛圆周上处处解析, 该和函数就可以在一个半径更大的圆域上作泰勒展开.

例题: 幂级数展开

例

把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的幂级数, 其中 $a \neq b$.

例题: 幂级数展开

例

把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的幂级数, 其中 $a \neq b$.

解

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{(z-a) - (b-a)}$$

例题: 幂级数展开

例

把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的幂级数, 其中 $a \neq b$.

解

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{(z-a) - (b-a)} = \frac{1}{a-b} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}}.$$

例题: 幂级数展开

例

把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的幂级数, 其中 $a \neq b$.

解

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{(z-a) - (b-a)} = \frac{1}{a-b} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}}.$$

当 $|z-a| < |b-a|$ 时,

例题: 幂级数展开

例

把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的幂级数, 其中 $a \neq b$.

解

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{(z-a) - (b-a)} = \frac{1}{a-b} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}}.$$

当 $|z-a| < |b-a|$ 时, $\frac{1}{z-b} = \frac{1}{a-b} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{b-a} \right)^n,$

例题: 幂级数展开

例

把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的幂级数, 其中 $a \neq b$.

解

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{(z-a) - (b-a)} = \frac{1}{a-b} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}}.$$

当 $|z-a| < |b-a|$ 时, $\frac{1}{z-b} = \frac{1}{a-b} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^n$, 即

$$\frac{1}{z-b} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(b-a)^{n+1}}, \quad |z-a| < |b-a|.$$

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1}$ 的收敛半径与和函数.

典型例题: 幂级数的收敛半径与和函数

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1}$ 的收敛半径与和函数.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} - 1}{2^n - 1} = 2$ 可知收敛半径为 $\frac{1}{2}$.

典型例题: 幂级数的收敛半径与和函数

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1}$ 的收敛半径与和函数.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} - 1}{2^n - 1} = 2$ 可知收敛半径为 $\frac{1}{2}$. 当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时, $|2z| < 1$.

典型例题: 幂级数的收敛半径与和函数

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1}$ 的收敛半径与和函数.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} - 1}{2^n - 1} = 2$ 可知收敛半径为 $\frac{1}{2}$. 当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时, $|2z| < 1$. 从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1}$$

典型例题：幂级数的收敛半径与和函数

例

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1}$ 的收敛半径与和函数.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} - 1}{2^n - 1} = 2$ 可知收敛半径为 $\frac{1}{2}$. 当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时, $|2z| < 1$. 从而

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1} &= \sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1} \\ &= \frac{2}{1 - 2z} - \frac{1}{1 - z} = \frac{1}{(1 - 2z)(1 - z)}. \end{aligned}$$

典型例题：幂级数的收敛半径与和函数

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n$ 的收敛半径与和函数.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ 可知收敛半径为 1.

典型例题: 幂级数的收敛半径与和函数

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n$ 的收敛半径与和函数.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ 可知收敛半径为 1. 当 $|z| < 1$ 时,

$$\int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n+1} = \frac{z}{1-z} = -1 - \frac{1}{z-1},$$

典型例题: 幂级数的收敛半径与和函数

例

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n$ 的收敛半径与和函数.

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ 可知收敛半径为 1. 当 $|z| < 1$ 时,

$$\int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n+1} = \frac{z}{1-z} = -1 - \frac{1}{z-1},$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n = \left(-\frac{1}{z-1} \right)' = \frac{1}{(z-1)^2}, \quad |z| < 1.$$

典型例题：幂级数的收敛半径与和函数

练习

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ 的和函数.

答案

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} = \ln(1 - z), \quad |z| < 1.$$

典型例题: 幂级数的收敛半径与和函数

例

$$\text{求 } \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-1}^{\infty} z^n \right) dz.$$

典型例题：幂级数的收敛半径与和函数

例

$$\text{求 } \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-1}^{\infty} z^n \right) dz.$$

注意这里并不能逐项积分，因为该级数并不是幂级数，它的和函数不解析。

解

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 在 $|z| < 1$ 收敛，

典型例题：幂级数的收敛半径与和函数

例

$$\text{求 } \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-1}^{\infty} z^n \right) dz.$$

注意这里并不能逐项积分，因为该级数并不是幂级数，它的和函数不解析。

解

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 在 $|z| < 1$ 收敛，它的和函数解析。

典型例题: 幂级数的收敛半径与和函数

例

$$\text{求 } \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-1}^{\infty} z^n \right) dz.$$

注意这里并不能逐项积分, 因为该级数并不是幂级数, 它的和函数不解析.

解

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 在 $|z| < 1$ 收敛, 它的和函数解析. 因此

$$\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-1}^{\infty} z^n \right) dz = \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z} dz + \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n \right) dz$$

典型例题: 幂级数的收敛半径与和函数

例

$$\text{求 } \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-1}^{\infty} z^n \right) dz.$$

注意这里并不能逐项积分, 因为该级数并不是幂级数, 它的和函数不解析.

解

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 在 $|z| < 1$ 收敛, 它的和函数解析. 因此

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-1}^{\infty} z^n \right) dz &= \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z} dz + \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n \right) dz \\ &= 2\pi i + 0 = 2\pi i. \end{aligned}$$

典型例题：幂级数的收敛半径与和函数

另解

当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=-1}^{\infty} z^n$ 收敛且

$$\sum_{n=-1}^{\infty} z^n = \frac{z^{-1}}{1-z} = \frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z-1},$$

另解

当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=-1}^{\infty} z^n$ 收敛且

$$\sum_{n=-1}^{\infty} z^n = \frac{z^{-1}}{1-z} = \frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z-1},$$

故

$$\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-1}^{\infty} z^n \right) dz = \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z-1} \right) dz = 2\pi i.$$