



合肥工业大学

HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

数学 (下)

## 第二章 极限和连续




### 2.1 数列的极限

- **例** 我们知道, 双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  的图像有两条渐近线  $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$ .
- 所谓的渐近线, 指的是曲线上一点  $M$  沿曲线**趋近**于无穷远或某个间断点时, 如果  $M$  到一条直线的距离无限**趋近**于零, 那么这条直线称为这条曲线的**渐近线**。
- 在这个定义中, 为了严格地描述“趋近”的含义, 我们需要引入极限的概念。
- **例** 一辆汽车沿着直线行驶, 它的**瞬时速率**  $v$  定义为  $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ , 其中  $\Delta s$  为一小段位移,  $\Delta t$  需要**充分小**. 严格地描述它需要引入极限的概念。



- 例 我国古代数学家刘徽为了计算圆周率  $\pi$ , 采用无限逼近的思想建立了割圆法.
- 计算单位圆内接正六边形的面积  $A_1 = 3\sin\frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ .
- 计算单位圆内接正12边形的面积  $A_2 = 6\sin\frac{\pi}{6} = 3$ .
- 计算单位圆内接正24边形的面积  $A_3 = 12\sin\frac{\pi}{12} = 3(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ .
- 计算单位圆内接正  $3 \cdot 2^n$  边形的面积  $A_n = 3 \cdot 2^{n-1} \sin\frac{\pi}{3 \cdot 2^{n-1}}$ .
- 如此下去, 这个面积越来越接近圆的面积  $\pi$ . 其中正弦值可以通过半角公式计算得到.
- 为什么这样下去会越来越趋近于  $\pi$  呢? 这也需要用到极限的概念.





- **极限的非严格定义**: 对于一个数的过程和实数  $a$ , 如果对于任意的正数  $\varepsilon > 0$ , 均存在某个过程的截断, 在这个截断之后, 这个过程和  $a$  相差不超过  $\varepsilon$ .
- 我们先来看数列的极限. 所谓**(无穷)数列**, 就是指按一定规则排列的无穷多个实数  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$
- 记为  $\{a_n\}$ ,  $a_n$  被称为第  $n$  项, 用于描述所有项的式子  $a_n = f(n)$  被称为它的通项.
- 注意和集合不同, 这里  $a_i$  有顺序, 而且可以有相同的.
- 数列等价于一个函数  $f: \mathbb{N}_+ = \{1, 2, 3, \dots\} \rightarrow \mathbb{R}$ .



- 不同的数列当  $n \rightarrow \infty$  时具有不同的表现行为.
- $\left\{\frac{1}{2^n}\right\}: \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \dots$  递减地越来越接近 0
- $\{n\}: 1, 2, 3, 4, 5, \dots$  无限增大
- $\left\{3 \cdot 2^{n-1} \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^{n-1}}\right\}: \frac{3\sqrt{3}}{2}, 3, 3(\sqrt{6} - \sqrt{2}), 24 \sin \frac{\pi}{24}, \dots$  递增地越来越接近  $\pi$
- $\left\{1 + \frac{(-1)^n}{n}\right\}: 0, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{4}, \frac{4}{5}, \frac{7}{6}, \frac{6}{7}, \dots$  交错地越来越接近 1.
- $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}: 0, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{4}, -\frac{4}{5}, \frac{7}{6}, -\frac{6}{7}, \dots$  交错地分别越来越接近 1 和 -1.



- **定义** 设有数列  $\{a_n\}$  和常数  $a$ .
- 如果对于  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $|a_n - a| < \varepsilon$ , 则称  $a$  为  $\{a_n\}$  当  $n \rightarrow \infty$  时的**极限**, 记为  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  或  $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ .
- 如果不存在这样的常数  $a$ , 则称该数列**发散**(没有极限, 不收敛).
- 我们将红字部分称为  $\varepsilon$ - $N$  语言.
- $\varepsilon$  的任意性保证了  $a_n$  和  $a$  可以**任意接近**. 由于  $\varepsilon$  小的情形可以推出更大的  $\varepsilon$  成立, 因此我们实际只需要考虑很接近 0 的  $\varepsilon$ .
- 而  $N = N_\varepsilon$  则与  $\varepsilon$  相对应, 不同的  $\varepsilon$  可能对应不同的  $N_\varepsilon$ . 该数值可以换成任何一个比它大的数值, 所以我们只关心它的存在性, 而不关心它具体的数值. 所以我们可以根据需要假设  $N > 0$  或者  $N$  是正整数.



- **例** 证明当  $|q| < 1$  时  $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ .
- **分析** 这种问题的证明通常分为两步:
  - 估计  $|a_n - a|$ , 得到它和  $n$  的不等式关系, 从而求得  $N = N_\varepsilon$ . 这个过程中可以进行适当的放缩.
  - 将上述  $N$  代入极限的定义中.
- **证明**  $|q^n - 0| = |q|^n < \varepsilon, n > \log_{|q|} \varepsilon$ .
- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $N = \log_{|q|} \varepsilon$ . 当  $n > N$  时, 有  $|q^n - 0| = |q|^n < \varepsilon$ . 所以
$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0.$$
- 对于其它情形, 我们只需替换红字部分.



- 例 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$ .
- 证明 我们有  $\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| \leq \frac{1}{n}$ .
- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $N = \frac{1}{\varepsilon}$ . 当  $n > N$  时, 有  $\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$ . 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$ .





- 例 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 2n - 4}{n^2 - 8} = 2$ .
- 证明 我们有  $\left| \frac{2n^2 + 2n - 4}{n^2 - 8} - 2 \right| = \left| \frac{2n + 12}{n^2 - 8} \right|$ . 若  $n \geq 12$ , 则  $\left| \frac{2n + 12}{n^2 - 8} \right| \leq \frac{3n}{n^2 - n} = \frac{3}{n-1}$ .
- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $N = \max \left\{ 1 + \frac{3}{\varepsilon}, 12 \right\}$ . 当  $n > N$  时, 有  $\left| \frac{2n^2 + 2n - 4}{n^2 - 8} - 2 \right| \leq \frac{3}{n-1} < \varepsilon$ . 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 2n - 4}{n^2 - 8} = 2$ .



- **例** "极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  存在" 的充要条件是 " $\forall \varepsilon > 0, ( \quad )$ ".
  - (A) 必有无穷多项  $a_n$  满足  $|a_n - a| < \varepsilon$
  - (B) 所有项  $a_n$  满足  $|a_n - a| < \varepsilon$
  - (C) 只有有限项  $a_n$  满足  $|a_n - a| \geq \varepsilon$
  - (D) 可能有无穷多项  $a_n$  满足  $|a_n - a| \geq \varepsilon$
- **解**  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$  使得当  $n > N$  时, 有  $|a_n - a| < \varepsilon$ . 这等价于至多只有有限项  $a_1, \dots, a_N$  满足  $|a_n - a| \geq \varepsilon$ . 故选 C, 而 BD 均不正确.
- 对于 A, 反例  $a_n = (-1)^n, a = 1$ .



### 收敛数列的性质

- **定理(唯一性)** 收敛数列的极限唯一.
- **证明** 设  $a$  和  $b$  都是  $\{a_n\}$  的极限.  $\forall \varepsilon > 0, \exists N, M > 0$  使得当  $n > N$  时  $|a_n - a| < \varepsilon$ ; 当  $n > M$  时  $|a_n - b| < \varepsilon$ . 从而由三角不等式

$$|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon.$$

- 若  $a \neq b$ , 则可取  $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2} > 0$ . 代入得到  $2\varepsilon < 2\varepsilon$ , 矛盾! 因此  $a = b$ .



- **定理(有界性)** 收敛数列是有界数列.
- **证明** 设数列  $\{a_n\}$  收敛到  $a$ , 则对于  $\varepsilon = 1$ , 存在正整数  $N$  使得当  $n > N$  时  $|a_n - a| < \varepsilon = 1$ , 从而  $|a_n| < |a| + 1$ .
- 因此对于  $M = \max\{a_1, \dots, a_N, |a| + 1\}$ , 有  $|a_n| \leq M$ . 这说明  $\{a_n\}$  是有界数列.
- **例** 对于数列  $\{a_n = (-1)^n\}$ , 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = -1, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = 1$ , 因此该数列不收敛. 但它是有界的, 这表明**有界未必收敛**.



- **定理(保号性)** 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ , 则  $\exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $a_n > 0$ .
- **证明** 对于  $\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$ ,  $\exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $|a_n - a| < \varepsilon = \frac{a}{2}$ , 从而  $a_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0$ , 证毕.
- **注** 这里  $> 0$  **不能换成**  $\geq 0$ , 例如  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = 0$ .
- 同理, **定理** 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a < 0$ , 则  $\exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $a_n < 0$ .
- **推论(逆否命题)** 如果收敛数列  $\{a_n\}$  从某项起  $\geq 0$ , 则它的极限  $\geq 0$ .
- 如果收敛数列  $\{a_n\}$  从某项起  $\leq 0$ , 则它的极限  $\leq 0$ .
- **注** 这里  $\geq$  **不能换成**  $>$ , 例如  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ .
- **推论** 如果收敛数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  满足从某项起  $a_n \geq b_n$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ .



- 对于正整数集的一个无限子集合  $S \subseteq \mathbb{N}_+$ , 将其中元素从小到大排成一列

$$S = \{k_1, \dots, k_n, \dots\},$$

- 则它对应了数列  $\{a_n\}$  的一个子数列,  $\{a_{k_n}\}: a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}, \dots$
- 特别地, 当  $S$  为全体正奇数时, 称  $\{a_{2n-1}\}$  为奇子数列;
- 当  $S$  为全体正偶数时, 称  $\{a_{2n}\}$  为偶子数列.



- **定理**  $\{a_n\}$  收敛于  $a$  当且仅当  $\{a_{2n-1}\}$  和  $\{a_{2n}\}$  均收敛于  $a$ .
- **证明** 必要性(" $\Rightarrow$ "): 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $|a_n - a| < \varepsilon$ .
- 因此  $|a_{2n-1} - a| < \varepsilon, |a_{2n} - a| < \varepsilon$ . 从而  $\{a_{2n-1}\}$  和  $\{a_{2n}\}$  均收敛于  $a$ .
- 充分性(" $\Leftarrow$ "): 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = a$ , 则  $\forall \varepsilon > 0$ ,  
 $\exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $|a_{2n-1} - a| < \varepsilon$ ;  
 $\exists M$  使得当  $n > M$  时, 有  $|a_{2n} - a| < \varepsilon$ .
- 所以当  $n > \max\{2N-1, 2M\}$  时, 有  $|a_n - a| < \varepsilon$ . 故数列  $\{a_n\}$  收敛到  $a$ .
- **定理**  $\{a_n\}$  收敛于  $a$  当且仅当它的所有子数列均收敛于  $a$ .



- 实际上, 设  $S_1, \dots, S_m \subseteq \mathbb{N}_+$  是有限多个无限集合, 且对充分大的正整数  $n$  总落在其中一个集合内. 那么  $\{a_n\}$  收敛于  $a \Leftrightarrow \{a_{k_{1,n}}\}_n, \dots, \{a_{k_{m,n}}\}_n$  均收敛于  $a$ , 其中  $S_i = \{k_{i,1}, \dots, k_{i,n}, \dots\}$ .
- 这是因为  $\forall \varepsilon > 0$ , 每个  $S_i$  除去有限多项后满足  $|a_{k_{i,n}} - a| < \varepsilon$ . 从而一共也只除去了有限多项. 然而对于无穷多个  $S_i$ , 这是不对的.
- 我们将第一象限内的整点按如下规律排列成一排  
 $(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1), (1,4), (2,3), (3,2), (4,1), \dots$
- 设第  $n$  个数为  $(x_n, y_n)$ . 令  $a_n = \frac{y_n}{x_n}$ .
- 对于每一个正整数  $y$ , 集合  $S_y = \{n: y_n = y\}$  对应的子数列  $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$  收敛于 0.
- 由于集合  $S = \{n: x_n = y_n\}$  对应的子数列  $\frac{1}{1}, \frac{2}{2}, \frac{3}{3}, \dots$  收敛于 1, 因此  $\{a_n\}$  不收敛.





### 2.2 函数的极限

- 我们参照数列极限的定义来定义函数的极限. 我们先考虑当  $x \rightarrow +\infty$  时  $f(x)$  的极限. 回忆数列的极限

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \text{ 使得当 } n > N \text{ 时, 有 } |a_n - a| < \varepsilon.$$

- 定义** 设函数  $f(x)$  当  $x$  充分大时有定义,  $A$  为常数. 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X \text{ 使得当 } x > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon,$$

- 则称  $A$  为  $f(x)$  当  $x \rightarrow +\infty$  时的**极限**, 记为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  或  $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$ .
- 从几何角度来看, 就是函数在  $(X, +\infty)$  上的限制的图像被夹在直线  $y = A \pm \varepsilon$  之间.
- 我们将红字部分称为  $\varepsilon$ - $X$  语言.



- 类似地, 我们有:
- **定义** 设函数  $f(x)$  当  $x$  充分小时有定义,  $A$  为常数. 如果
$$\forall \varepsilon > 0, \exists X \text{ 使得当 } x < -X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon,$$
- 则称  $A$  为  $f(x)$  当  $x \rightarrow -\infty$  时的**极限**, 记为  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$  或  $f(x) \rightarrow A \ (x \rightarrow -\infty)$ .
- **定义** 设函数  $f(x)$  当  $|x|$  充分大时有定义,  $A$  为常数. 如果
$$\forall \varepsilon > 0, \exists X \text{ 使得当 } |x| > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon,$$
- 则称  $A$  为  $f(x)$  当  $x \rightarrow \infty$  时的**极限**, 记为  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$  或  $f(x) \rightarrow A \ (x \rightarrow \infty)$ .
- 注意, 函数极限中需要分清  $x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty$ , 而数列情形只有  $n \rightarrow \infty$ , 因为  $n$  是正整数.



- 类似于数列极限的性质, 我们有
- **定理**  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$
- 当  $y \rightarrow \infty$  时,  $x = x_0 + \frac{1}{y} \rightarrow x_0$ . 因此如果存在  $\delta > 0$  使得函数  $f(x)$  在  $x_0$  的**去心  $\delta$  邻域**

$$\overset{\circ}{U}(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$$

- 上有定义, 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  应当定义为  $\lim_{y \rightarrow \infty} f\left(x_0 + \frac{1}{y}\right)$ . 于是我们得到下述定义:
- **定义** 设函数  $f(x)$  在  $x_0$  的某个去心邻域内有定义,  $A$  为常数. 如果
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ 使得当 } x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta) \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon,$$
- 则称  $A$  为  $f(x)$  当  $x \rightarrow x_0$  时的**极限**, 记为  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$  或  $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$ .



- 从几何角度来看, 就是函数在  $\overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$  上的限制的图像被夹在直线  $y = A \pm \varepsilon$  之间.
- 类似地可以定义单侧极限
- $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  使得当  $x \in (x_0, x_0 + \delta)$  时, 有  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .
- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  使得当  $x \in (x_0 - \delta, x_0)$  时, 有  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .
- 我们将红字部分称为  $\varepsilon$ - $\delta$  语言.
- **定理**  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ .
- 如果  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ , 我们记  $f(x_0^+) = A$ . 如果  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ , 我们记  $f(x_0^-) = A$ .



- **例** 证明  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ .
- **分析** 和数列极限类似, 这种问题的证明通常也分为两部分
  - 先估计  $|f(x) - A|$ , 得到它和  $|x - x_0| < \delta$  或  $|x| > X$  的不等式关系, 从而求得  $\delta$  或  $X$ . 这个过程中可以进行适当的放缩.
  - 将  $\delta$  或  $X$  代入极限的定义中.
- $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{|x|} < \varepsilon, |x| > \frac{1}{\varepsilon}$ , 因此我们可以取  $X = \frac{1}{\varepsilon}$ .
- **证明**  $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $X = \frac{1}{\varepsilon}$ . 当  $|x| > X$  时, 有  $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{|x|} < \varepsilon$ . 所以  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ .



- **例** 证明  $a > 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ .
- **分析** 由于  $a > 1$  时,  $\log_a x$  是单调递增的. 因此  $|a^x - 0| = a^x < \varepsilon, x < \log_a \varepsilon$ .
- **证明**  $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $X = -\log_a \varepsilon$ . 当  $x < -X$  时, 有  $|a^x - 0| = a^x < \varepsilon$ . 所以  $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ .
- **例** 证明  $\lim_{x \rightarrow x_0} (ax + b) = ax_0 + b$ .
- **分析**  $|(ax + b) - (ax_0 + b)| = |a| \cdot |x - x_0| < \varepsilon$ , 因此我们可以取  $\delta = \frac{\varepsilon}{|a|}$ .  
注意我们需要单独考虑  $a = 0$  的情形.



- **证明** 我们有  $|(ax + b) - (ax_0 + b)| = |a| \cdot |x - x_0|$ .

- 如果  $a = 0$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $\delta = 1$ . 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有

$$|(ax + b) - (ax_0 + b)| = |a| \cdot |x - x_0| = 0 < \varepsilon.$$

- 如果  $a \neq 0$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $\delta = \frac{\varepsilon}{|a|}$ . 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有

$$|(ax + b) - (ax_0 + b)| = |a| \cdot |x - x_0| < |a|\delta = \varepsilon.$$

- 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0} (ax + b) = ax_0 + b$ .

- **注记** 当  $f(x) = A$  时, 我们可以取任一正数作为  $\delta$ , 只要  $\dot{U}(x, \delta)$  包含在该函数的定义域范围内即可.



- 例 证明  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$ .

- 与三角函数有关的放缩往往要用到和差化积公式

$$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}, \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2},$$

- 然后将不含  $x - x_0$  的项放缩到 1; 以及三角函数基本不等式

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in (-\infty, +\infty), \quad |x| \leq |\tan x|, \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

- 证明 我们有  $|\sin x - \sin x_0| = \left| 2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cos \frac{x+x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \frac{x-x_0}{2} \right| = |x - x_0|$ .

- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $\delta = \varepsilon$ . 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有

$$|\sin x - \sin x_0| \leq |x - x_0| < \delta = \varepsilon.$$

- 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$ .





- 例 证明  $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$  不存在.
- 分析 从图像上可以看出  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ . 我们想要使用  $|x|$  来控制  $\left| \arctan x - \frac{\pi}{2} \right|$ . 不过这个形式不容易估计, 我们令  $t = \arctan x$ , 则问题变成了  $\left| t - \frac{\pi}{2} \right|$  和  $|\tan t|$  的关系. 再令  $s = \arctan x - \frac{\pi}{2}$ , 则  $|s| \leq |\tan s|$ .
- 不过这个不等式并不总是对的, 我们需要估计  $s = \arctan x - \frac{\pi}{2}$  的范围. 由于我们考虑的是  $x \rightarrow +\infty$ , 不妨设  $x > 0$ , 那么  $\arctan x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $s = \arctan x - \frac{\pi}{2} \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ .



- **证明** 我们来证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ . 当  $x > 0$  时,  $\arctan x - \frac{\pi}{2} \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ .

因此  $\left| \arctan x - \frac{\pi}{2} \right| \leq \left| \tan \left( \frac{\pi}{2} - \arctan x \right) \right| = \left| \frac{1}{\tan(\arctan x)} \right| = \frac{1}{x}$ .

- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $X = \frac{1}{\varepsilon} > 0$ . 当  $x > X$  时, 有

$$\left| \arctan x - \frac{\pi}{2} \right| \leq \frac{1}{x} < \frac{1}{X} = \varepsilon.$$

- 所以  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ .
- 同理,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$ . 因此  $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$  不存在.



- 例 证明  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ .
- 分析 这种极限是  $\frac{f}{g}$  型, 其中  $f \rightarrow 0, g \rightarrow 0$ . 我们称之为  $\frac{0}{0}$  型不定式. 它的极限可能存在, 可能不存在. 这种一般要去掉公因式, 将其变为定式.
- 证明  $\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| = |x + 2 - 4| = |x - 2|$ .
- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $\delta = \varepsilon$ . 当  $0 < |x - 2| < \delta$  时, 有

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| = |x - 2| < \varepsilon.$$

- 所以  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ .



- **例** 如果函数  $f(x) = \begin{cases} a \sin x, & x < \frac{\pi}{2} \\ x + b, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$  满足  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = 1$ , 求  $a, b$ .
- **分析** 这种是典型的由分段函数性质求待定参数的问题, 我们后续会经常遇到. 由于一点处极限等价于两侧极限都存在且为 1, 因此我们会得到两个等式, 从而可以解出两个未知参数.
- 由于  $f(x)$  的两个分段都是我们已经求过极限的函数, 因此我们可以直接用前面已经证明的结论.
- **解** 由于  $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} f(x) = \frac{\pi}{2} + b$ ,  $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} f(x) = a$ , 因此  $a = 1, b = 1 - \frac{\pi}{2}$ .



- 例 对于哪些  $x_0$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} [x]$  存在.

- 分析 与  $[x]$  有关的问题往往需要用到两个不等式,

$$[x] \leq x < [x] + 1 \text{ 或 } x - 1 < [x] \leq x.$$

- 我们回忆  $[x]$  的图像. 从图像上可以看出  $x_0 \in \mathbb{Z}$  时左右极限不相等, 从而该点极限不存在. 解答时, 我们取一个很小的邻域, 使得在这个邻域的左右各自半边内, 该函数是常值函数, 从而得到单侧极限.
- 当  $x_0 \notin \mathbb{Z}$  时, 我们同样希望取一个小邻域使得  $[x]$  是常值函数. 这需要  $\delta$  不超过  $x_0$  和两边的最近的整数的距离. 所以

$$\delta = \min \{x - [x_0], [x_0] + 1 - x\}.$$



- 解 如果  $x_0 \in \mathbb{Z}$ , 则
  - 当  $x \in \left(x_0, x_0 + \frac{1}{2}\right)$  时,  $[x] = x_0$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} [x] = x_0$ ;
  - 当  $x \in \left(x_0 - \frac{1}{2}, x_0\right)$  时,  $[x] = x_0 - 1$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} [x] = x_0 - 1$ .
- 因此  $\lim_{x \rightarrow x_0} [x]$  不存在.
- 如果  $x_0 \notin \mathbb{Z}$ , 令  $\delta = \min \{x_0 - [x_0], [x_0] + 1 - x_0\} > 0$ . 于是
$$[x_0] \leq x_0 - \delta < x_0 + \delta \leq [x_0] + 1.$$
- 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有  $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ , 从而  $[x_0] < x < [x_0] + 1$ ,  $[x] = [x_0]$ . 因此  $\lim_{x \rightarrow x_0} [x] = [x_0]$ .
- 故当且仅当  $x_0 \notin \mathbb{Z}$  时,  $\lim_{x \rightarrow x_0} [x]$  存在.



- 现在我们可以严格定义渐近线了. 我们知道  $ax + by + c = 0$  当  $a, b$  不全为零时表示一条直线, 无论是  $y = kx + b$  还是  $x = a$  都可以统一为这种形式.
- 点  $P = (x, y)$  到这条直线的距离是  $\frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ . 点  $P$  趋向于无穷远可以表达为  $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ .
- **定义** 对于曲线  $C$ , 如果  $\lim (ax + by + c) = 0$ , 其中  $x^2 + y^2 \rightarrow \infty$ ,  $(x, y) \in C$ , 则称直线  $ax + by + c = 0$  是曲线  $C$  的一条**渐近线**.
- 用  $\varepsilon$ - $X$  语言表达就是:  
 $\forall \varepsilon > 0, \exists X$  使得当  $x^2 + y^2 > X$ ,  $(x, y) \in C$  时, 有  $|ax + by + c| < \varepsilon$ .



- 渐近线可分为：水平渐近线、竖直渐近线和斜渐近线三种，相应的判定方法等价于
  - $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0$  或  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0$ , 直线  $y = kx + b$ ;
  - $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{f(x)} = 0$  或  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{f(x)} = 0$ , 直线  $x = a$ .
- 注意两个单侧极限有一个存在即可.
- 函数的渐近线指的就是它的图像的渐近线.
- 例**  $f(x) = \frac{1}{x-1} + x$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f(x)} = 0$ , 因此  $y = x$ ,  $x = 1$  是它的全部渐近线.





### 2.3 极限的性质

- 与数列极限类似, 对于函数的六种极限我们均有:
- **定理(唯一性)** 如果  $\lim f(x)$  存在, 则必唯一.
- **定理(局部有界性)** 如果  $\lim f(x)$  存在, 则  $f(x)$  局部有界.
- 所谓的局部, 是指极限定义中  $|f(x) - A| < \varepsilon$  成立的某个区间范围. 以  $x \rightarrow +\infty$  为例, 局部有界是指存在  $X$  使得  $f|_{(X, +\infty)}$  有界.
- **定理(局部保号性)** 如果  $\lim f(x) = a > 0$ , 则  $f(x)$  局部大于 0.
- **推论** 如果  $\lim f(x)$  存在且局部非负, 则极限非负.
- **推论** 如果  $\lim f(x), \lim g(x)$  存在且局部  $f(x) \geq g(x)$ , 则  $\lim f(x) \geq \lim g(x)$ .



- 极限的四则运算性质

- 定理 设  $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$ .

- (1)  $\lim (f \pm g)(x) = A \pm B$ .

- (2)  $\lim (fg)(x) = AB$ .

- (3) 当  $B \neq 0$  时,  $\lim \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{A}{B}$ .

- 证明 我们只证明  $x \rightarrow x_0$  的情形, 其它情形类似.

- (1)  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_1$  时, 有  $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ ;

- $\exists \delta_2 > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_2$  时, 有  $|g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}$ .

- 因此, 当  $0 < |x - x_0| < \delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$  时, 有

- $|(f \pm g)(x) - (A \pm B)| = |(f(x) - A) \pm (g(x) - B)| \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| < \varepsilon$ .

- 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \pm g)(x) = A \pm B$ .



- (2) 分析  $|f(x)g(x) - AB| = |f(x)(g(x) - B) + B(f(x) - A)|$   
 $\leq |f(x)| \cdot |g(x) - B| + |B| \cdot |f(x) - A|.$
- 由局部有界性,  $\exists \delta_1, M > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_1$  时, 有  $|f(x)| \leq M.$
- $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_2$  时, 有  $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B| + 1)};$
- $\exists \delta_3 > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_3$  时, 有  $|g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2M}.$
- 因此, 当  $0 < |x - x_0| < \delta = \min \{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$  时, 有
$$|f(x)g(x) - AB| \leq M \cdot |g(x) - B| + |B| \cdot |f(x) - A|$$
$$\leq M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |B| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|B| + 1)} < \varepsilon.$$
- 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = AB.$



- (3) 我们只需要证明  $\frac{1}{g} \rightarrow \frac{1}{B}$  然后利用(2). 这需要对  $\frac{1}{g}$  在  $x_0$  附近进行估计使得其有个非零下界.
- 对于  $\varepsilon = \frac{|B|}{2} > 0, \exists \delta_1 > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_1$  时, 有  $|g(x) - B| \leq \varepsilon = \frac{|B|}{2}$ . 于是

$$|g(x)| \geq |B| - |g(x) - B| \geq \frac{|B|}{2},$$

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|g(x) - B|}{|B| \cdot |g(x)|} \leq \frac{2}{|B|^2} |g(x) - B|.$$



- $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_2$  时, 有  $|g(x) - B| < \frac{|B|^2}{2} \varepsilon$ .
- 因此当  $0 < |x - x_0| < \delta = \min \{\delta_1, \delta_2\}$  时,

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|g(x) - B|}{|B| \cdot |g(x)|} \leq \frac{2}{|B|^2} |g(x) - B| < \varepsilon.$$

- 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}$ . 由(2)可知  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{A}{B}$ .
- **推论** 设  $\lim f(x) = A$ , 则
  - (1)  $\lim [Cf(x)] = CA$ .
  - (2)  $\lim [f(x)]^k = A^k, k \in \mathbb{N}_+$ .



### • 数列与函数的关系

- 设  $\{a_n\}$  是一个数列. 定义  $f(x) = a_{[x]}$ , 它是  $[1, +\infty)$  上的一个分段函数.
- 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $|a_n - a| < \varepsilon$ . 因此当  $x > N + 1$  时,  $[x] > N, |f(x) - a| < \varepsilon$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ .
- 反过来也成立, 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . 从而与函数极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty}$  相关的概念和性质可以移植到数列上.
- **定理** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = ab, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (C a_n) = C a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = a^k, \quad k \in \mathbb{N}_+.$$



- 例 对于多项式  $P(x)$ , 有  $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$ .
- 例 对于多项式  $P(x)$ ,  $Q(x)$ , 如果  $Q(x_0) \neq 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ .
- 例 求  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$ .
- 分析 该极限是  $\frac{0}{0}$  型不定式.
- 解 由于  $x \rightarrow 1$  时,  $x - 1 \neq 0$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{x^2 + x + 1} = \frac{2}{3}$ .
- 可以看出, 利用极限的四则运算性质, 我们可以得到很多的极限. 下面我们介绍极限的函数复合运算性质. 我们在未来会看到, 在研究函数连续性和可导性时, 也会通过研究简单函数、四则运算性质和函数复合运算性质来研究复杂函数的相应性质.



### 极限的复合运算性质

- **定理** 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a, \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$ . 若函数  $u = \varphi(x)$  在点  $x_0$  的某个去心邻域内不等于  $a$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A.$$

- **证明** 由  $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$  知  $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$  使得当  $0 < |u - a| < \eta$  时, 有  $|f(u) - A| < \varepsilon$ .
- 由  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$  知  $\exists \delta_1 > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_1$  时, 有  $|\varphi(x) - a| < \eta$ .
- 设  $u = \varphi(x)$  在  $\overset{\circ}{U}(x_0, \delta_2)$  上不等于  $a$ , 则当  $0 < |x - x_0| < \delta = \min \{\delta_1, \delta_2\}$  时, 有
$$0 < |\varphi(x) - a| < \eta, \quad |f[\varphi(x)] - A| < \varepsilon.$$
- 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = A$ .
- **注记** 如果  $f(a) = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$ , 则可以不要要求  $u = \varphi(x)$  在点  $x_0$  的某个去心邻域内不等于  $a$ .





- **例** 证明  $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$ .

- **证明** 上一节中我们已经证明了  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$ .

- 设  $u = \varphi(x) = \frac{\pi}{2} - x$ , 则  $\sin u = \cos x$ . 由于  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0) = \frac{\pi}{2} - x_0$ , 因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \lim_{x \rightarrow x_0} \sin \varphi(x) = \lim_{u \rightarrow \frac{\pi}{2} - x_0} \sin u = \sin \left( \frac{\pi}{2} - x_0 \right) = \cos x_0.$$

- **例** 证明  $x_0 \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$  时,  $\lim_{x \rightarrow x_0} \tan x = \tan x_0$ .

- **证明** 由于  $\cos x_0 \neq 0$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow x_0} \tan x = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin x_0}{\cos x_0} = \tan x_0$ .



- 例 求  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2}$ .
- 该极限是  $\frac{0}{0}$  型不定式, 分子分母代入均为 0. 利用  $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$  可将极限为 0 的根式化为有理形式, 这种技巧我们会常常使用.
- 解 我们先证明  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$  ( $x_0 > 0$ ). 注意到  $\sqrt{x} - \sqrt{x_0} = \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}$ .
- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $\delta = \min \left\{ \frac{x_0}{2}, \sqrt{x_0} \varepsilon \right\}$ . 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有
$$\sqrt{x} + \sqrt{x_0} > \sqrt{x_0}, \quad |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} < \frac{\sqrt{x_0} \varepsilon}{\sqrt{x_0}} = \varepsilon.$$
- 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$ .



- 现在  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3-x) - (1+x)}{(x-1)(x+2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})}$
- $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{(x+2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} = \frac{-2}{3(\sqrt{2} + \sqrt{2})} = -\frac{\sqrt{2}}{6}.$
- 其中最后一步使用了极限的复合函数运算以及  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}.$



### 2.4 无穷小和无穷大

- 我们知道  $\lim f(x) = A$  等价于  $\lim [f(x) - A] = 0$ . 这反映了研究极限可以转化到研究极限为 0 的函数上来.
- **定义** 如果  $\lim f(x) = 0$ , 就称  $f(x)$  为该极限过程时的**无穷小**.
- 下面是一些无穷小的例子:

$$x - 1 \quad (x \rightarrow 1), \quad \sqrt{x} \quad (x \rightarrow 0^+), \quad \frac{1}{x} \quad (x \rightarrow \infty), \quad \frac{\sin n}{n} \quad (n \rightarrow \infty).$$

- 无穷小是一个函数或者数列, 它不是一个具体的数, 所以我们谈论无穷小时需要带上极限过程.



- **定理** 在自变量的同一变化过程中, 有限个无穷小的代数和或乘积仍然是无穷小.

- 这由无穷小的定义和极限四则运算法则得到.

- **注意** 无穷多个无穷小的和未必还是无穷小. 例如  $n \rightarrow \infty$  时,

- $a_{m,n} = \begin{cases} \frac{1}{n}, & 0 \leq m \leq n; \\ 0, & m > n \end{cases}$  是无穷小, 但  $b_n = \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n} = 1$  不是无穷小.

- **注意** 无穷多个无穷小的乘积未必还是无穷小. 例如  $n \rightarrow \infty$  时,

- $a_{m,n} = \begin{cases} \frac{1}{n}, & 1 \leq m \leq n; \\ \frac{1}{n}, & n < m \leq 2n; \\ 1, & m > 2n \end{cases}$  是无穷小, 但  $b_n = \prod_{m=1}^{\infty} a_{m,n} = 1$  不是无穷小.



- **定理** 有界函数和无穷小的乘积仍然是无穷小.
- **证明** 我们只证明  $x \rightarrow x_0$  的情形, 其它情形类似.
- 设  $f(x)$  有界,  $g(x)$  是无穷小, 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ . 设  $|f(x)| < M$ .
- $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有  $|g(x)| < \frac{\varepsilon}{M}$ . 于是

$$|f(x)g(x)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

- 所以  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$ , 即  $f(x)g(x)$  是无穷小.
- **推论** 常数和无穷小的乘积仍然是无穷小.



- **定义** 在某个极限过程中, 如果  $\frac{1}{f(x)}$  为无穷小, 则称  $f(x)$  为**无穷大**.
- 以  $x \rightarrow x_0$  为例, 我们可以将其表述为
$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ 使得当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x)| > M.$$
- 记作  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ . 注意此时  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  实际上是不存在的.
- 如果将  $|f(x)| > M$  换为  $f(x) > M$  (或  $f(x) < -M$ ), 则称  $f(x)$  为  $x \rightarrow x_0$  时的**正无穷大**(或**负无穷大**), 记为  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$  或  $-\infty$ . 这等价于  $\frac{1}{f(x)}$  是局部大于零(或小于零)的无穷小.
- 对于其它五种极限过程可以类似地定义. 和无穷小类似, 无穷大是一个函数或者数列, 它不是一个具体的数, 所以我们谈论无穷大时需要带上极限过程.
- 函数无穷大意味着函数无界, 但反之未必. 例如  $x \rightarrow \infty$  时  $f(x) = x \cos x$  无界但并不是无穷大.



- 例 求  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{x+2}{x^3-1} \right)$ .
- 解 原式  $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x+1-(x+2)}{x^3-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x^3-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+x+1} = \frac{2}{3}$ .
- 可以看出  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x^3-1} = \infty$ . 这种极限被称为  $\infty \pm \infty$  型不定式, 通常我们需要将其化成  $\frac{0}{0}$  型来处理.





- 例  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}} = \frac{2}{1} = 2$ , 或者  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x}{x^2 - 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{t^2} - \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2} - 1} =$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 - t}{1 - t^2} = \frac{2}{1} = 2.$$

- 这种极限被称为  $\frac{\infty}{\infty}$  型不定式. 为了简便, 我们往往将  $x \rightarrow \infty$  化为  $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ .

- 例  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1 - 0} = 0.$



- 一般地, 设  $a_0 b_0 \neq 0$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & m = n, \\ 0, & m < n, \\ \infty, & m > n. \end{cases}$$

- 例 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ , 则 ( ).

(A)  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = \infty$       (B)  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = \infty$

(C)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$       (D)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

- 解 取  $g(x) = \pm f(x)$  可知 (A)(B) 错误. 取  $g(x) = 2f(x)$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{2}$ , 因此选 (C).



- 我们来讨论下两个函数相加时的极限与各自极限的关系. 如果  $f$  极限存在,  $g$  极限不存在, 则由  $g = (f + g) - f$  可知  $f + g$  极限也不存在.

$\lim f$	$\lim g$	$\lim (f + g)$
$A$ (存在)	$B$ (存在)	$A + B$ (存在)
$A$ (存在)	不存在	不存在
局部有界或 $+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
局部有界或 $-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
不存在	不存在	都有可能
$+\infty$	$-\infty$	都有可能( $\infty \pm \infty$ 型不定式)



- 两个函数相乘时的极限与各自极限的关系如下:

$\lim f$	$\lim g$	$\lim (fg)$
$A$ (存在)	$B$ (存在)	$AB$ (存在)
$A \neq 0$ (存在)	不存在或 $\infty$	不存在或 $\infty$
$0$ (存在)	不存在或 $\infty$	都有可能( $0 \cdot \infty$ 型不定式)
不存在	不存在	都有可能
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$



- 两个函数相除时的极限与各自极限的关系如下:

$\lim f$	$\lim g$	$\lim \left( \frac{f}{g} \right)$
$A$ (存在)	$B \neq 0$ (存在)	$\frac{A}{B}$ (存在)
$A \neq 0$ (存在)	$0$ (存在)	$\infty$
$0$ (存在)	$0$ (存在)	都有可能( $\frac{0}{0}$ 型不定式)
不存在	不存在	都有可能
$\infty$	$\infty$	都有可能( $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式)



- 无穷小的比较

- 我们知道两个无穷小的加减乘均是无穷小, 但两个无穷小的商却未必.

- 例如  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$ .

- 这种  $\frac{0}{0}$  型不定式之所以这些情形结果不同, 是因为分子分母趋于零的速度不同. 例如  $x^2$  比  $x$  趋于零的速度要快, 因此二者相除仍然是无穷小.



- **定义** 设在自变量的同一变化过程中,  $\alpha = \alpha(x)$  和  $\beta = \beta(x)$  ( $\beta \neq 0$ ) 是两个无穷小.
- (1) 若  $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 0$ , 则称  $\alpha$  是  $\beta$  的**高阶无穷小**, 记作  $\alpha = o(\beta)$ , 也称  $\beta$  是  $\alpha$  的**低阶无穷小**.
- (2) 若  $\lim \frac{\alpha}{\beta} = C \neq 0$ , 则称  $\alpha$  与  $\beta$  是**同阶无穷小**. 特别地, 如果  $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$ , 则称  $\alpha$  与  $\beta$  是**等价无穷小**, 记作  $\alpha \sim \beta$ .
- **例**  $x \rightarrow 0$  时,  $x^2$  是  $x$  的高阶无穷小, 即  $x^2 = o(x)$ .
- **例**  $x \rightarrow 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^3-1} = \frac{1}{3} \neq 0$ , 因此  $x-1$  是  $x^3-1$  的同阶无穷小, 且  $x^3-1 \sim 3(x-1)$ .



- **例** 设在自变量的同一变化过程,  $\alpha$  是  $\beta$  的高阶无穷小 ( $\alpha, \beta \neq 0$ ), 则下列结论不正确的是( ).

(A)  $\alpha\beta$  是  $\beta$  的高阶无穷小      (B)  $\frac{\alpha}{\beta}$  是  $\beta$  的低阶无穷小

(C)  $\alpha - \beta$  是  $\beta$  的同阶无穷小      (D)  $\alpha + \beta$  是  $\beta$  的等价无穷小

- **解**  $\frac{\alpha\beta}{\beta} = \alpha \rightarrow 0$ , 因此(A)正确.  $\frac{\alpha-\beta}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta} - 1 \rightarrow -1$ , 因此(C) 正确.

- $\frac{\alpha+\beta}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta} + 1 \rightarrow 1$ , 因此(D)正确.

- $\frac{\beta}{\alpha/\beta} = \frac{\beta^2}{\alpha}$  未必趋于 0, 因此(B)错误, 例如  $\alpha = x^2, \beta = x \rightarrow 0$ .





- **定理** 设在自变量的同一变化过程中,  $\alpha \sim \alpha_1$ ,  $\beta \sim \beta_1$ , 且  $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1}$  存在, 则

$\lim \frac{\alpha}{\beta}$  存在且

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1}.$$

- **证明**  $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha}{\alpha_1} \cdot \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cdot \frac{\beta_1}{\beta} = \lim \frac{\alpha}{\alpha_1} \cdot \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} \cdot \lim \frac{\beta_1}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1}.$
- 该定理被称为**等价无穷小代换定理**. 由于无穷大时无穷小的倒数, 因此也有等价无穷大代换定理.
- 这些结论可以用在  $\frac{0}{0}$  型,  $\frac{\infty}{\infty}$  型,  $0 \cdot \infty$  型不定式中, 注意我们**只能对其中的因式做等价代换, 不能对相加或相减的项做代换.**



- 如果  $\alpha \rightarrow A \neq 0$ ,  $\beta$  是无穷小, 则  $\lim \frac{\alpha\beta}{A\beta} = \lim \frac{\alpha}{A} = 1$ ,  $\alpha\beta \sim A\beta$ .
- 若  $\beta = o(\alpha)$ , 则  $\left(1 + \frac{\beta}{\alpha}\right) \rightarrow 1$ , 因此  $\alpha + \beta = \alpha \left(1 + \frac{\beta}{\alpha}\right) \sim \alpha$ , 即两个阶不同的无穷小之和等价于其中阶较小的那个.
- **定义** 我们称与  $\alpha^r$  同阶的无穷小为  $\alpha$  的  **$k$  阶无穷小**,  $r > 0$ .
- 如果两个无穷小  $\alpha, \beta$  均有阶, 则  $\alpha$  是  $\beta$  的高阶/低阶/同阶指的就是相应的阶的比较.
- **注记** 并不是所有的无穷小都有阶, 例如  $\frac{1}{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}$  是  $x \rightarrow 0^+$  时的无穷小, 但它不与任意  $x^r$  同阶.



- 例  $x + x^2 = x(1 + x) \sim x$  为  $x \rightarrow 0$  的 1 阶无穷小.
- 例  $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \sim x^{\frac{1}{8}} \sqrt{x^{\frac{3}{4}} + \sqrt{\sqrt{x} + 1}} \sim x^{\frac{1}{8}}$  为  $x \rightarrow 0^+$  的  $\frac{1}{8}$  阶无穷小.
- 也可以这么看,  $x + \sqrt{x} \sim \sqrt{x}$ ,  $x + \sqrt{x + \sqrt{x}} \sim x^{\frac{1}{4}}$ .
- 例  $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} = \frac{2x}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \sim x$  为  $x \rightarrow 0$  的 1 阶无穷小.
- 例 求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \cos x}$ .
- 解 该极限为  $\frac{\infty}{\infty}$  型不定式. 原式 =  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{x}}$ . 由于  $\frac{1}{x}$  是无穷小,  $\sin x, \cos x$  有界, 因此  $\frac{\sin x}{x}, \frac{\cos x}{x}$  是无穷小, 从而原式 =  $\frac{1}{1} = 1$ .



### 2.5 极限的存在准则

- 本节中我们将要介绍极限存在的两个准则——**夹逼准则**和**单调有界收敛准则**.
- 由此我们可以得到两个重要极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ 和 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

- 并由此得到一些计算极限的方法.
- **夹逼准则** 假设三个数列  $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$  满足下列条件:
  - 从某一项起有  $a_n \leq c_n \leq b_n$ .
  - $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ .
- 则数列  $\{c_n\}$  收敛, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$ .



- **证明** 设从第  $N_0$  项起,  $a_n \leq c_n \leq b_n$ . 由极限定义,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1, N_2$  使得

当  $n > N_1$  时, 有  $|a_n - a| < \varepsilon$ ; 当  $n > N_2$  时, 有  $|b_n - a| < \varepsilon$ .

- 当  $n > N = \max \{N_0, N_1, N_2\}$  时,

$$-\varepsilon < a_n - a \leq c_n - a \leq b_n - a < \varepsilon,$$

- 即  $|c_n - a| < \varepsilon$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$ .

- **夹逼准则(函数版本)** 设在自变量的同一变化过程中,  $g(x), f(x), h(x)$  都有定义, 且满足:

- $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ;
- $\lim g(x) = \lim h(x) = A$ .

- 则  $\lim f(x) = A$ .



- **例** 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^3+1} + \frac{2^2}{n^3+2} + \cdots + \frac{n^2}{n^3+n} \right)$ .
- **分析** 注意到这个求和无法直接计算, 我们将其进行放缩, 使其变得可计算.
- 估计时, 我们需要保留分子分母的最高次项, 这样放缩可以保证上下界的极限相等.
- **解** 由于  $\frac{1}{n^3+n} \leq \frac{1}{n^3+i} \leq \frac{1}{n^3}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , 所以

$$\frac{1}{n^3+1} + \frac{2^2}{n^3+2} + \cdots + \frac{n^2}{n^3+n} \geq \frac{1 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3+n} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6(n^3+n)},$$

$$\frac{1}{n^3+1} + \frac{2^2}{n^3+2} + \cdots + \frac{n^2}{n^3+n} \leq \frac{1 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6(n^3+n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}$ , 因此由夹逼准则可知原极限为  $\frac{1}{3}$ .



- **例** 设  $f(x)$  满足  $|f(x)| \leq x^2$ . 证明  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ .
- **证明** 我们有  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0$  和  $-x^2 \leq f(x) \leq x^2$ . 由夹逼准则可知  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ .
- 作为夹逼准则的一个应用, 我们来证明**定理**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ , 即  $\sin x \sim x$ .
- **证明** 由于  $\frac{\sin x}{x}$  对一切  $x \neq 0$  有定义, 且它是偶函数, 因此我们可以将  $x \rightarrow 0$  等价地转化为  $x \rightarrow 0^+$ , 并将  $x$  限制在  $(0, \frac{\pi}{2})$  范围内讨论.
- 由三角函数基本不等式  $\tan x > x > \sin x > 0$  可知  $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ .
- 而  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$ , 因此由夹逼准则可知  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ .



- 在极限过程中, 我们可以将  $x \rightarrow 0$  换成任何一个函数  $y = f(x) \rightarrow 0$ . 由于  $x \rightarrow 0$  当且仅当  $\arcsin x \rightarrow 0$ , 因此

$$\sin(\arcsin x) \sim \arcsin x \quad (\arcsin x \rightarrow 0),$$

- 即

$$\arcsin x \sim x \quad (x \rightarrow 0).$$

- 例**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot 1 = 1$ , 即  $\tan x \sim x \quad (x \rightarrow 0)$ . 同理,

$$\arctan x \sim x \quad (x \rightarrow 0).$$





- 例  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left(\frac{x}{2}\right)^2}{x^2} = \frac{1}{2}$ . 这里我们利用了极限的复合运算性质以及等价无穷小替换.
- 由上述讨论我们得到了一些等价无穷小: 当  $x \rightarrow 0$  时,

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2.$$

- 需要注意第一个重要极限和  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$  的差别. 我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$



- 例  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cos \frac{x+x_0}{2}}{x - x_0}$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \cos \frac{x+x_0}{2} = \cos x_0.$$

- 也可以设  $y = x - x_0$ , 则

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin (y + x_0) - \sin x_0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y \cos x_0 + (\cos y - 1) \sin x_0}{y}$

- $= \cos x_0 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} - \sin x_0 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos y}{y} = \cos x_0 - \sin x_0 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{2} = \cos x_0.$



- **注记** 当我们把要求极限的函数拆成两项极限之和时,
- 如果最终两项极限都存在,那么这种拆分是合理的.
- 如果最终两项极限有一个存在, 一个不存在, 那么最终极限是不存在的.
- 如果最终两项极限都不存在, 那么**这种拆分是不合理的**, 此时需要使用其它方法来求极限.
- 例如  $x_0 \neq 0$  时,  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x}{x - x_0} - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x_0}{x - x_0} = \infty - \infty = 0$  是不对的.
- **例**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x \cdot (1 - \cos x)}{(\arcsin 5x)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \cdot \frac{x^2}{2}}{(5x)^3} = \frac{3}{250}.$



- **单调有界收敛准则** 单调有界数列一定收敛.
- 这里, 数列  $\{x_n\}$  单增是指:  $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq \cdots$
- 数列  $\{x_n\}$  单减是指:  $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq \cdots$
- **推论** 如果单增数列  $\{x_n\}$  有上界  $M$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq M$ .
- **推论** 如果单减数列  $\{x_n\}$  有下界  $M$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq M$ .



- **例** 设数列  $\{x_n\}$  满足  $0 < x_i < \pi$ ,  $x_{n+1} = \sin x_n$ . 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在并求该极限.
- **解** 容易看出  $x_n \geq 0$  有下界. 当  $n \geq 2$  时,  $x_{n+1} = \sin x_n \leq x_n$ ,  $\{x_n\}$  单减. 由单调有界收敛准则可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在.
- 设极限为  $A$ , 在递推公式两边同时取极限可得  $A = \sin A$ ,  $A = 0$ . 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .
- **例** 设  $x_1 = \sqrt{2}$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ ,  $n \in \mathbb{N}_+$ . 证明该数列极限存在并求其值.
- **分析** 这种递归数列的极限问题一般分为两步:
  - 1. 证明  $\{x_n\}$  是单调有界数列, 如果不能直接证明的话一般需要使用数学归纳法. 然后由单调有界收敛准则可知极限存在.
  - 2. 设极限为  $A$ , 代入递推公式中, 解方程求得极限.
- 实际中, 我们可以通过计算数列前几项来判断它是单增还是单减, 并计算(2)中的  $A$ , 它必定是这个单增数列的上界或单减数列的下界. 然后我们归纳证明(1).



- 由于  $x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > x_1 = \sqrt{2}$ , 因此我们猜测  $\{x_n\}$  单增. 由于  $A = \sqrt{2 + A}$ ,  $A = 2$ , 因此我们猜测  $x_n \leq 2$ .

• **解** 我们归纳地证明  $2 \geq x_{n+1} \geq x_n$ .

- (1)  $n = 1$  时, 由  $2 > x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > x_1 = \sqrt{2}$  可知成立.

- (2) 假设  $2 > x_k > x_{k-1}$ , 则

$$x_{k+1} - x_k = \sqrt{2 + x_k} - \sqrt{2 + x_{k-1}} = \frac{x_k - x_{k-1}}{\sqrt{2 + x_k} + \sqrt{2 + x_{k-1}}} > 0$$

- 且  $x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k} < \sqrt{2 + 2} = 2$ .
- 由数学归纳法,  $2 > x_{n+1} > x_n$  对任意  $n$  成立. 因此  $\{x_n\}$  单增有界, 由单调有界收敛准则可知极限存在.
- 设极限为  $A$ , 在递推公式两边同时取极限可得  $A = \sqrt{2 + A}$ ,  $A^2 - A - 2 = 0$ ,  $A = 2$ . 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ .



- 第二个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

- 证明** 我们先讨论数列情形  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ . 设  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ , 则由几何-算术平均不等式

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1 < \left[ \frac{\overbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \cdots + \left(1 + \frac{1}{n}\right)}^{n \text{项}} + 1}{n + 1} \right]^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1}$$

知该数列单增.



• 由

$$\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n < \left[ \frac{\overbrace{\frac{1}{2} + \left(1 + \frac{1}{2n}\right) + \cdots + \left(1 + \frac{1}{2n}\right)}^{n \text{项}}}{n+1} \right]^{n+1} = 1$$

知  $a_{2n-1} < a_{2n} = \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} < 4$ . 从而该数列有界.

• 由单调有界收敛准则可知该数列极限存在, 记  $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ .





- 对于函数形式, 设  $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ ,  $n = [x]$ . 由

$$f(x) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \frac{n+1}{n} a_n, \quad f(x) \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{n+1}{n+2} a_{n+1}$$

以及夹逼准则可知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e$ .

- 最后, 令  $y = -x - 1$ , 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y}{y+1}\right)^{-y-1} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{y}\right)^y \cdot \frac{y+1}{y}\right] \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y \cdot \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y+1}{y} = e \cdot 1 = e. \end{aligned}$$



- 以  $e$  为底的对数称为自然对数, 记为  $\ln x$ ,  $e$  被称为自然对数的底.
- $e = 2.718281828459045\cdots$  是无理数.

- 后续我们会看到  $e = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$ .

- 由于  $2^n = (1 + 1)^n \geq C_n^1 = n$ , 因此  $4^n \geq n^2$ . 当  $4^n \leq x < 4^{n+1}$  时,

$$x \geq n^2 > \left( \frac{\ln x}{\ln 4} - 1 \right)^2, \quad 0 \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq \frac{\ln 2x \cdot \ln 16}{(\ln x - \ln 4)^2} \leq \frac{(\ln x + \ln 2) \ln 16}{(\ln x - \ln 4)^2}.$$

- 因此由夹逼准则,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$ .

- 需要注意第二个重要极限和该极限的差别:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1.$$



- 例  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+1}{n-1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{(n-1)/2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{(n-1)/2} \right)^{\frac{n-1}{2} \times 2} \cdot \frac{n+1}{n-1} = e^2.$
- 例  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 5x)^{\frac{2}{x}} = \lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{-\frac{10}{y}} = \left[ \lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{1}{y}} \right]^{-10} = e^{-10}.$
- 这种极限被称为  **$1^\infty$  型**不定式. 这种极限一般要用到第二重要极限, 我们将会在下一节介绍如何处理该类型不定式.
- 现在我们来证明单调有界收敛准则. 该准则和我们前面遇到的各种命题有一个本质的区别, 前面我们所说的极限的概念和性质以及夹逼准则等定理, 在我们仅考虑有理数范围时仍然成立. 而单调有界收敛准则在有理数范围内是不成立的, 原因是有理数域不是**完备**的.



- **定义** 设  $S$  是一个集合,  $R \subseteq S \times S$ . 如果有
  - 自反性:  $\forall a \in S, (a, a) \in R$
  - 对称性:  $\forall a, b \in S, (a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R$
  - 传递性:  $\forall a, b, c \in S, (a, b) \in R \text{ 且 } (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R$
- 则称  $R$  是  $S$  上的一个**等价关系**.
- **定义**  $[x] = \{y \in S | (x, y) \in R\}$ , 则我们得到一个新的集合  $S/R = \{[x] | x \in S\}$ , 称之为  $S$  关于  $R$  的**商集**.
- **例**  $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ . 一张正方形的纸对边粘合得到什么?



- **定义** 设  $\{x_n\}$  是一个有理数数列. 如果对于任意有理数  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists N$  使得当  $m, n > N$  时, 有  $|x_m - x_n| < \varepsilon$ , 则称它是一个**柯西数列**.
- **定义** 设  $\{x_n\}, \{y_n\}$  是两个有理数数列. 如果对于任意有理数  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $|x_n - y_n| < \varepsilon$ , 则称这两个柯西数列**等价**.
- 例如  $0.3, 0.33, 0.333, 0.333, \dots$  和  $0.2, 0.32, 0.332, 0.3332, \dots$  等价.
- 定义**实数**集合为

$$\mathbb{R} = \frac{\{\text{所有柯西数列}\}}{\{\text{所有柯西数列的等价关系}\}}.$$



- 设  $x = [\{x_n\}]$ ,  $y = [\{y_n\}]$ , 定义  $x + y = [\{x_n + y_n\}]$ ,  $x \cdot y = [\{x_n \cdot y_n\}]$ .
- 定义  $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto [\{x, x, x, \dots\}]$ . 容易看出不同的  $x$  对应的常值数列不是等价的, 因此  $f$  是单射,  $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ .
- 容易证明, 如果对于  $X > 0$ , 存在  $m, n > X$  使得  $x_m \geq 0, x_n \leq 0$ , 则  $\{x_n\}$  和 0 等价. 如果  $n$  充分大时,  $x_n > y_n$ , 则我们称  $x > y$ . 那么  $x > 0 \Leftrightarrow -x < 0$ .



- **定理** 实数的柯西序列一定收敛.
- **证明** 设  $a_n = [\{x_{n,k}\}]$ ,  $\{a_n\}$  是实数的柯西序列. 那么对于  $\varepsilon = \frac{1}{2^n} > 0$ , 存在正整数  $N_n$  使得  $|a_n - a_m| < \varepsilon, \forall n, m \geq N_n$ . 按照定义, 存在正整数  $M_n$  使得  $|x_{n,k} - x_{m,k}| < \varepsilon, \forall k \geq M_n$ . 我们可以不妨假设  $N_1 < N_2 < \dots, M_1 < M_2 < \dots$
- 现在我们得到一个柯西序列  $x_{N_1, M_1}, x_{N_2, M_2}, \dots$ . 令  $a = [\{x_{N_1, M_1}, x_{N_2, M_2}, \dots\}]$ .
- 对于任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $u$  使得  $\varepsilon > \frac{1}{2^{u-1}}$ . 当  $n \geq N_u, k \geq M_u$  时,

$$|x_{n,k} - x_{N_k, M_k}| \leq |x_{n,k} - x_{N_u, k}| + |x_{N_u, k} - x_{N_u, M_u}| < \frac{1}{2^u} + \frac{1}{2^u} < \varepsilon.$$

- 换言之,  $|a_n - a| < \varepsilon$ . 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .



- **定理** 单调有界数列一定收敛.
- **证明** 我们只考虑单增情形, 单减情形类似.
- 设  $\{x_n\}$  是单增数列, 且存在  $M_0$  使得  $\forall n, x_n < M_0$ . 对于任意  $\varepsilon > 0$ , 存在最小的  $k \in \mathbb{N}$  使得  $[M_0 - (k+1)\varepsilon, M_0 - k\varepsilon)$  区间内有该数列的点. 那么  $\forall n, x_n < M = M_0 - k\varepsilon$ .
- 设  $x_N > M - \varepsilon$ , 则  $\forall m, n > N, |x_m - x_n| < \varepsilon$ , 因此  $\{x_n\}$  是柯西数列, 从而存在极限.
- 最后, 我们来证明实数集是不可数无穷集合.





- **证明** 由于  $\tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right): (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$  是一一对应, 因此  $|\mathbb{R}| = |(0,1)|$ .
- 对于每个数  $x \in (0,1)$ , 令  $0.x_1x_2\cdots$  为其十进制展开, 其中有限小数

$$0.x_1\cdots x_{n-1}x_n = 0.x_1\cdots x_{n-1}y_n999\cdots, \quad y_n = x_n - 1.$$

- 假设  $(0,1)$  中只有可数个元素, 我们将其排成一行:

$$a_1 = a_{1,1}a_{1,2}a_{1,3}\cdots$$

$$a_2 = a_{2,1}a_{2,2}a_{2,3}\cdots$$

$$a_3 = a_{3,1}a_{3,2}a_{3,3}\cdots$$

$\vdots$

- 对于每个  $a_{i,i}$ , 存在整数  $1 \leq b_i \leq 9$ ,  $b_i \neq a_{i,i}$ . 实数  $0.b_1b_2b_3\cdots$  不等于这列数中的任意一个, 矛盾! 因此  $|\mathbb{R}| > |\mathbb{Z}|$ ,  $\mathbb{R}$  是不可数无穷集合.



### 2.6 函数的连续性

- 在客观世界中, 很多现象都是连续变化的, 例如气温的升降, 植物的生长等.
- 那么如何用数学语言来刻画连续呢?
- 直观的理解就是, 自变量距离很近时, 函数值也不会相差太远.
- **定义** 设函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  的某个邻域内有定义. 如果  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ , 则称  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处**连续**.
- 我们可以引入**增量**的概念来理解连续. 记  $\Delta x = x - x_0$ , 则  $x \rightarrow x_0$  即指  $\Delta x \rightarrow 0$ .
- 记  $\Delta y = f(x) - f(x_0)$ , 则函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处连续是指  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ .



- 和极限一样, 连续也有单侧连续的概念:
- 设存在  $\delta > 0$  使得  $y = f(x)$  在  $[x_0, x_0 + \delta)$  上有定义. 如果  $f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ , 则称函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处**右连续**.
- 设存在  $\delta > 0$  使得  $y = f(x)$  在  $(x_0 - \delta, x_0]$  上有定义. 如果  $f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ , 则称函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处**左连续**.
- **定理** 函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处连续当且仅当  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处既左连续又右连续, 即  $f(x_0^+) = f(x_0^-) = f(x_0)$ .
- **例** 由于  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 = \sqrt{0}$ , 因此  $\sqrt{x}$  在 0 处右连续.
- **例** 设  $f(x)$  满足  $|f(x)| \leq x^2$ . 则由  $-x^2 \leq f(x) \leq x^2$  和夹逼准则可知  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ , 从而  $f(x)$  在 0 处连续.



- **定义** 如果函数  $y = f(x)$  在开区间  $(a, b)$  内的每一个点都连续, 则称  $y = f(x)$  在  $(a, b)$  内**连续**, 或称  $y = f(x)$  是  $(a, b)$  上的**连续函数**.
- 如果函数  $y = f(x)$  在  $(a, b)$  内连续, 且在  $a$  处左连续, 在  $b$  处右连续, 则称  $y = f(x)$  在  $[a, b]$  上**连续**, 或称  $y = f(x)$  是  $[a, b]$  上的**连续函数**.
- 类似地, 我们可以定义在半开半闭区间上的连续性.
- 从图像上看, 连续函数的图像是一条连续不断的曲线.
- **例** 由于  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$  对任意实数  $x_0$  均成立, 因此  $\sin x$  是  $(-\infty, +\infty)$  上的连续函数.



- **定理** 设函数  $f_1(x)$  在  $(a, b)$  内连续,  $f_2(x)$  在  $(b, c)$  内连续. 则函数

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & a < x < b; \\ f(b), & x = b; \\ f_2(x), & b < x < c \end{cases}$$

在  $(a, c)$  内连续当且仅当  $f_1(b^-) = f(b) = f_2(b^+)$ .

- **证明** 当  $x_0 \in (a, b)$  时, 存在  $f_1(x_0^+) = f_1(x_0^-) = f_1(x)$ , 从而  $f(x_0^+) = f(x_0^-) = f(x)$ ,  $f(x)$  在  $x_0$  处连续.
- 同理  $f(x)$  在  $x_0 \in (b, c)$  处连续.
- 当  $x_0 = b$  时,  $f(b^-) = f_1(b^-)$ ,  $f(b^+) = f_2(b^+)$ . 因此该命题成立.



- **推论** 设函数  $f_1(x)$  在  $(a, b]$  上连续,  $f_2(x)$  在  $[b, c)$  上连续. 则函数

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & a < x < b; \\ f_2(x), & b \leq x < c \end{cases}$$

在  $(a, c)$  内连续当且仅当  $f_1(b) = f_2(b)$ .

- 这两个命题常常用于判断分段函数分点处的连续性.

- **例**  $f(x) = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0; \\ 0, & x = 0; \\ 1, & x > 0. \end{cases}$  由于  $f(0^-) = -1$ ,  $f(0^+) = 1$ ,  $f(0) = 0$ , 因此

$f(x)$  在 0 处既不左连续又不右连续, 在其它点都连续.

- **例**  $f(x) = |x| = \begin{cases} -x, & x < 0; \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$  由于  $(-x)|_{x=0} = x|_{x=0} = 0$ , 因此  $f(x)$  处处连续.



- **例**  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 1; \\ 3 - x, & x < 1. \end{cases}$  由于  $(x^2 + 1)|_{x=1} = 2 = (3 - x)|_{x=1}$ , 因此  $f(x)$  处处连续.
- **例** 当  $a$  取何值时, 函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos 2x}{\tan^2 x}, & x < 0; \\ a + x, & x \geq 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续.
- **解** 当  $f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos 2x}{\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2} = 2 = f(0) = f(0^+) = a$ , 因此  $a = 2$ .





- **例** 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$  则  $f(0^+) = f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0)$ , 因此  $f(x)$  处处连续.
- 从这个例子可以看出, 函数  $\frac{\sin x}{x}$  尽管在 0 处没有定义, 却可以通过补充定义来得到一个在 0 处连续的函数. 不过并非所有的不连续点都可以这样做.
- **定义** 称函数  $f(x)$  的不连续点为它的**间断点**, 也称函数在该点**间断**.
- 有三种情形会产生间断点:
  - (1)  $f(x_0)$  无意义;
  - (2)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  不存在;
  - (3)  $f(x_0)$  有意义且  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在, 但  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$ .





- 我们将间断点分为两类.
- **第一类间断点** 点  $x_0$  为函数  $f(x)$  的间断点, 且  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  存在.
- (1) **可去间断点**: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ , 即  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在但  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$  或  $f(x_0)$  不存在.
  - 例如 0 是  $\frac{\sin x}{x}$  的可去间断点.
  - 该情形可通过补充或修改函数  $f(x)$  在  $x_0$  处的函数为  $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  将其不连续性去除, 这是唯一的一种调整后可使函数连续的间断点.
- (2) **跳跃间断点**:  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ , 此时  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  不存在.
  - 例如 0 是  $\text{sgn}(x)$  的跳跃间断点.




- **第二类间断点**  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  和  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  至少有一个不存在, 包括
  - 无穷间断点: 例如  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ .
  - 振荡间断点: 例如  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  在 0 附近在  $-1, 1$  之间无限次振荡.
- **例** 求函数  $f(x) = \frac{x}{\sin x}$  的间断点和间断点的类型, 如果是可去间断点, 补充定义使之连续.
- **解** 当  $\sin x \neq 0$ , 即  $x \neq k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  时,  $f(x)$  总是连续的, 这由极限的四则运算法则得到.
- 当  $x = 0$  时, 由  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$  知 0 是可去间断点, 补充定义  $f(0) = 1$  可以使之连续.
- 当  $x = k\pi \neq 0$  时, 由于  $\lim_{x \rightarrow k\pi} f(x) = \infty$ , 因此  $k\pi$  是第二类间断点.



- 例 讨论函数  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$  的连续性.

- 解 求极限得

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & |x| < 1; \\ 1, & x = 1; \\ 0, & x = -1; \\ 0, & |x| > 1. \end{cases} = \begin{cases} 1+x, & |x| < 1; \\ 1, & x = 1; \\ 0, & x > 1 \text{ 或 } x \leq -1. \end{cases}$$



- 当  $x = -1$  时, 由于  $f((-1)^-) = f((-1)^+) = f(-1) = 0$ , 因此  $f(x)$  在  $x = -1$  处连续.
- 当  $x = 1$  时, 由于  $f(1^-) = 2$ ,  $f(1^+) = 0$ , 因此 1 是跳跃间断点.
- 由此可见, 连续函数数列的极限不一定还连续.



- 例 求函数  $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$  的间断点和间断点的类型.
- 解 当  $e^{\frac{x}{x-1}} - 1 = 0$  时,  $\frac{x}{x-1} = 0, x = 0$ . 因此间断点为 0, 1.
- 由于  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ , 因此 0 是第二类间断点.
- 由于  $\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{x}{x-1}} = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{x}{x-1}} = 0$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$ , 1 是跳跃间断点.



- 例 函数  $f(x) = \frac{1}{x(e^{\frac{1}{x}} + e)} \tan x$  在  $[-\pi, \pi]$  上的第一类间断点是  $x = ( \quad )$   
(A) 0      (B) 1      (C)  $-\frac{\pi}{2}$       (D)  $\frac{\pi}{2}$
- 解 容易看出  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上的间断点为  $0, 1, \pm \frac{\pi}{2}$ .
- 由于  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}} f(x) = \infty$ , 因此  $1, \pm \frac{\pi}{2}$  是第二类间断点.
- 由于  $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ , 故 0 是第一类跳跃间断点, 选(A).



- 连续函数的运算

- 定理** 设函数  $f(x), g(x)$  在  $x_0$  处均连续, 则

$$f(x) \pm g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x_0) \neq 0)$$

均在  $x_0$  处连续.

- 这由连续的概念和极限的运算可得.

- 例** 证明  $\tan x$  在其定义域内连续.

- 证明** 由于  $\sin x, \cos x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 因此  $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$  在其定义域内连续. 同理  $\cot x$  在其定义域内连续.

- 定理** 如果函数  $f(x)$  在区间  $I_x$  上单调且连续, 则它的反函数在  $I_y = f(I_x)$  上也连续.



- 我们首先来证明  $I_y$  也是一段区间. 不妨设  $f(x)$  单调递增. 设  $y_1 = f(x_1) < y < y_2 = f(x_2)$ ,  $x_i \in I_x$ , 我们来说明  $y \in I_y$ .
- 令  $a_1 = x_1, b_1 = x_2$ . 若  $f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) \geq y$ , 令  $a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$ ; 否则令  $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}, b_{n+1} = b_n$ .
- 我们可以归纳地证明  $f(a_{n+1}) \leq y \leq f(b_{n+1})$ .
- 现在由  $f(a_n) \leq f(a_{n+1})$  可知  $a_n \leq a_{n+1} \leq y$ , 故  $\{a_n\}$  是单增有上界数列, 从而有极限. 同理  $\{b_n\}$  有极限, 且  $0 < b_n - a_n = 2^{1-n}(x_2 - x_1)$  极限是零, 因此二者极限相同, 记为  $x$ , 则  $f(a_n) \leq f(x) \leq f(b_n)$ .
- 而同理  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$ , 这迫使  $f(x) = y$ . 显然  $x \in I_x$ , 故  $y \in I_y$ .





- 设  $y_0 = f(x_0)$  在  $I_y$  内部.  $\forall \varepsilon > 0, \exists \varepsilon_1 \in \left(0, \frac{\varepsilon}{2}\right)$  s. t.  $U(x_0, 2\varepsilon_1) \subseteq I_x$ .
- 设  $y_1 = f(x_0 - \varepsilon_1)$ ,  $y_2 = f(x_0 + \varepsilon_1)$ ,  $\delta = \min\{y_2 - y_0, y_0 - y_1\}$ .
- $\forall y \in U(y_0, \delta)$ ,  $y_1 < y < y_2$ , 从而  $x_0 - \varepsilon_1 < f^{-1}(y) < x_0 + \varepsilon_1$ . 因此  $f^{-1}$  在  $y_0$  处连续.
- 若  $I_x$  为半开半闭区间或闭区间, 在闭端点处也可类似证明.
- **例** 由此可知,  $\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x$  在相应区间上都是连续的.
- **定理** 如果奇/偶函数  $f(x)$  在  $(a, b)$ ,  $a > 0$  上连续, 它在  $(-b, -a)$  上也连续.
- **定理** 如果奇/偶函数  $f(x)$  在  $[0, a)$  上连续, 则它在  $(-a, a)$  上也连续.
- 奇/偶函数的间断点集合总是关于原点对称.





- **例** 证明  $f(x) = a^x (a > 1)$  连续.
- **证明** 设  $x_0$  是任一实数.  $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $\delta = \log_a (1 + \varepsilon a^{-x_0}) > 0$ .
- $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$ ,  $a^x - a^{x_0} = a^{x_0} (a^{x-x_0} - 1) < a^{x_0} (a^\delta - 1) = \varepsilon$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}$ .
- $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$ ,  $a^{x_0} - a^x = a^{x_0} (1 - a^{x-x_0}) < a^{x_0} (1 - a^{-\delta}) = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon a^{-x_0}} < \varepsilon$ .
- 从而  $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}$ , 即  $a^x$  在  $x_0$  处连续.
- $0 < a < 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = \lim_{y \rightarrow -x_0} \left(\frac{1}{a}\right)^y = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x_0} = a^{x_0}$ . 因此指数函数都是连续的.
- 由于指数函数是单调的, 从而对数函数在  $(0, +\infty)$  上连续.
- 由此双曲函数  $\operatorname{sh} x$ ,  $\operatorname{ch} x$ ,  $\operatorname{th} x$  也都是连续的.
- 再根据双曲函数的单调性 ( $\operatorname{ch} x$  需要限制在  $[0, +\infty)$  上), 可知反双曲函数也是连续的.



- **定理** 设  $u = \varphi(x)$ , 若函数  $y = f(u)$  在点  $u_0 = a = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$  处连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f\left[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)\right] = f(a).$$

- **证明** 这由极限的复合函数性质和连续的定义得到.
- **推论** 设函数  $u = \varphi(x)$  在点  $x_0$  处连续, 函数  $y = f(u)$  在点  $u_0 = \varphi(x_0)$  处连续, 则复合函数  $f[\varphi(x)]$  在点  $x_0$  处连续.
- **例** 证明幂函数  $y = x^\mu$  在  $(0, +\infty)$  内连续.
- **证明** 这是因为  $y = x^\mu = e^{\mu \ln x}$ , 而对数函数和指数函数都是连续的.
- 我们知道, 幂函数的定义域和  $\mu$  的取值有关. 由奇/偶函数的连续的对称性可知在每种情形下, 幂函数都是连续的.



- **结论** 一切初等函数在其有定义的区间内都是连续的.
- **结论** 如果初等函数  $f(x)$  在  $x_0$  处有定义, 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .
- 所以这里我们可以看出, 连续性可以用来计算极限.
- **例**  $\lim_{x \rightarrow 1} \arccos \frac{2-x}{1+x}$ . 由于它是初等函数, 因此
- 该极限  $= \arccos \frac{2-x}{1+x} \Big|_{x=1} = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$ .
- **例**  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left( 5 - \frac{\sin 2x}{x} \right)$ . 0 不在它的定义域内, 但是  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( 5 - \frac{\sin 2x}{x} \right) = 5 - 2 = 3$ , 于是  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left( 5 - \frac{\sin 2x}{x} \right) = \ln 3$ .



- 例  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x+2)(x-1)} \cdot \frac{3-x-1-x}{\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x}}$
- $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{(x+2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} = \frac{-2}{3 \cdot (\sqrt{2} + \sqrt{2})} = -\frac{\sqrt{2}}{6}.$
- 例  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$
- 例  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(1+t)} \quad (t = a^x - 1 \rightarrow 0)$
- $= \ln a \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = \ln a.$



- 例  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x}$ . 令  $t = (1+x)^\alpha - 1 \rightarrow 0$ , 则  $\ln(1+t) = \alpha \ln(1+x)$ ,

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{t}{x} = \frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} \rightarrow \alpha.$$

故  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha.$

- 由此我们又得到了一些等价无穷小, 包括前面的我们有:  $x \rightarrow 0$  时,

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim x, \quad 1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2,$$

$$e^x - 1 \sim x \sim \ln(1+x), \quad a^x - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1),$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \neq 0)$$



- **例** 设  $a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$ ,  $a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$ ,  $a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$ . 当  $x \rightarrow 0^+$  时, 这些无穷小量按照从低阶到高阶的排序是( )  
(A)  $a_1, a_2, a_3$     (B)  $a_2, a_3, a_1$     (C)  $a_2, a_1, a_3$     (D)  $a_3, a_2, a_1$
- 当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $a_1 \sim x \cdot \left(-\frac{1}{2}x\right) = -\frac{1}{2}x^2$ ,  $a_2 = \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{\frac{5}{6}}$ ,  $a_3 \sim \frac{1}{3}x$ , 故选(B).
- **例**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^2)}{(e^{2x} - 1)\ln(1-x)}$
- **分析** 我们观察发现它是  $\frac{0}{0}$  型不定式, 于是可以用等价无穷小替换.
- **解**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^2)}{(e^{2x} - 1)\ln(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(2x)(-x)} = -\frac{1}{2}.$



- 例  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{(2^x - 1)\ln(1-x)}$ .
- 分析 我们观察发现它是  $\frac{0}{0}$  型不定式, 其中分子是两层函数的复合, 我们**从外往里**逐层使用等价无穷小替换.
- 解 当  $x \rightarrow 0$  时,  $\cos x \rightarrow 1$ .
- 由于  $\ln(1+x) \sim x$  ( $x \rightarrow 0$ ), 因此  $\ln \cos x \sim \cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$  ( $x \rightarrow 0$ ).
- 由  $(2^x - 1) \sim x \ln 2$ ,  $\ln(1-x) \sim -x$  可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{(2^x - 1)\ln(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{(x \ln 2) \cdot (-x)} = \frac{1}{2 \ln 2}.$$



• 例 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$ , 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $b = \underline{\hspace{2cm}}$ .

• 解 由于  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x (\cos x - b) = 0$ , 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - a) = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \sin x (\cos x - b)}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b)} = 0,$$

•  $a = 1$ . 于是  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - 1} = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x - b) = 1 - b = 5$ ,  $b = -4$ .





- 例  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n})$ .
- 分析 这是  $\infty - \infty$  型不定式, 我们用变量替换  $t = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ .
- 解  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}) = \lim_{t \rightarrow 0} \left( \sqrt{\frac{1}{t} + \sqrt{\frac{1}{t}}} - \sqrt{\frac{1}{t}} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{t}} - 1}{\sqrt{t}}$
- $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{t}} + 1} = \frac{1}{2}$ .



• **定理** 如果  $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = \infty$ , 则  $\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim [u(x) - 1]v(x)}$ .

• **证明** 由于  $\ln u(x) \sim u(x) - 1$ , 因此

$$\lim \ln u(x) \cdot v(x) = \lim [u(x) - 1]v(x).$$

• 由于  $e^x$  是连续函数, 因此

$$\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim \ln u(x) \cdot v(x)} = e^{\lim [u(x) - 1]v(x)}.$$

• **注** 由此可知,  $1^\infty$  型不定式总可以化为  $0 \cdot \infty$  型不定式.

• **例**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda}{n} \cdot n} = e^\lambda.$

• **例**  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin 5x)^{\frac{2}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 5x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-10x}{x}} = e^{-10}.$

• **例**  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{2}{\tan x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\tan x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x}} = e^2.$



- 我们来讨论下幂指函数的极限与各自极限的关系. 假设  $u(x) > 0$ .

$\lim u$	$\lim v$	$\lim u^v$
$A \geq 0$ (存在)	$B$ (存在)	$A^B$ (存在)
1 (存在)	$\infty$	都有可能 ( $1^\infty$ 型不定式)
$A > 1$ (存在)	$+\infty$	$+\infty$
$0 < A < 1$ (存在)	$-\infty$	$+\infty$
$A > 1$ (存在)	$-\infty$	0
$0 < A < 1$ (存在)	$+\infty$	0
0 (存在)	$+\infty$	0
0 (存在)	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$B > 0$ (存在) 或 $+\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$B < 0$ (存在) 或 $-\infty$	0
$+\infty$	0 (存在)	都有可能



- 有限闭区间上连续函数的性质

- 在有界闭区间  $[a, b]$  上连续的函数有许多重要的性质, 这些性质在理论和实践中都有重要的作用.
- 我们将要介绍几个常见的性质, 这些性质从几何角度非常直观, 但严格证明则需要较深的数学理论.

- 定义** 设函数  $f(x)$  在区间  $I$  上(内)有定义. 如果

$\exists x_0 \in I$  使得当  $x \in I$  时, 有  $f(x) \leq f(x_0)$  (或有  $f(x) \geq f(x_0)$ ),

- 则称函数  $f(x)$  在区间  $I$  上(内)有最大值  $f(x_0)$  (或有最小值  $f(x_0)$ ), 记做

$\max_{x \in I} f(x)$  或  $\min_{x \in I} f(x)$ , 即


$$f(x_0) = \max_{x \in I} f(x) \quad (\text{或 } f(x_0) = \min_{x \in I} f(x)).$$



- 注意  $\sup_{x \in I} f(x)$  和  $\max_{x \in I} f(x)$  的不同.  $\max_{x \in I} f(x)$  如果存在, 则必定是某一点的函数值, 但  $\sup_{x \in I} f(x)$  有可能并不是某一点的函数值, 即使  $\sup_{x \in I} f(x) \neq +\infty$ .
- 如果函数存在最大值或最小值, 则最大值或最小值一定是唯一的, 但最大值点  $x_0$  或最小值点  $x_0$  却未必唯一.
- 例 函数  $f(x) = \sin x$  在  $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$  处取得最大值 1, 在  $x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$  处取得最小值 -1, 其中  $k \in \mathbb{Z}$ .



- **定理(最值定理)** 如果函数  $f(x)$  在有限闭区间  $[a, b]$  上连续, 则函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上一定有最大值和最小值.
- 例如下图的函数  $f(x)$  在  $x_1$  处取得最小值  $f(x_1) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ , 在  $x_2$  处取得最大值  $f(x_2) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ .






- **推论(有界定理)** 如果函数  $f(x)$  在有限闭区间  $[a, b]$  上连续, 则函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界.
- 对于开区间内的连续函数或闭区间上不连续的函数, 这些结论不一定成立.
- **例** 函数  $f(x) = \tan x$  在  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  内连续但无界, 也无最大值或最小值.
- **例** 函数  $f(x) = x^2$  在  $(-\infty, \infty)$  内连续但无界, 无最大值, 最小值为 0.
- **例** 函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & -1 \leq x \leq 1, x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  在  $[-1, 1]$  上不连续, 无界, 无最大值或最小值.




- **定理(介值定理)** 如果函数  $f(x)$  在有限闭区间  $[a, b]$  上连续,  $f(a) \neq f(b)$ ,  $C$  介于  $f(a)$ ,  $f(b)$  之间, 则  $\exists \xi \in (a, b)$  使得  $f(\xi) = C$ .
- **推论** 如果函数  $f(x)$  在有限闭区间  $[a, b]$  上连续, 设  $M = f(x_1)$  为最大值,  $m = f(x_2)$  为最小值,  $M > m$ ,  $M > C > m$ , 则  $\exists \xi$  介于  $x_1, x_2$  之间使得  $f(\xi) = C$ .
- **推论** 如果函数  $f(x)$  在有限闭区间  $[a, b]$  上连续, 则它的值域也是有限闭区间.







- **推论(零点定理)** 如果函数  $f(x)$  在有限闭区间  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a)f(b) < 0$ , 则  $\exists \xi \in (a, b)$  使得  $f(\xi) = 0$ .
- 从图像上看, 如果连续的曲线的两个端点分别位于  $x$  轴的上下侧, 则该曲线与  $x$  轴至少有一个交点. 如果这个曲线是连续函数  $f(x)$  的图像, 则这是说  $f(x) = 0$  在开区间  $(a, b)$  内至少有一个根.
- 更常见的情形是  $f(a)f(b) \leq 0$ , 则  $\exists \xi \in [a, b]$  使得  $f(\xi) = 0$ .





- **例** 证明方程  $x = \cos x$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内有解.
- **证明** 令  $f(x) = x - \cos x$ , 则它在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上连续, 且  $f(0) = -1 < 0$ ,  $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} > 0$ . 由零点定理知  $\exists \xi \in (0, \frac{\pi}{2})$  使得  $f(\xi) = 0$ , 即  $f(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内有解.
- 由于  $f(x)$  是单调递增函数, 因此这个零点是唯一的. 我们可以用计算器快速求得这个解的近似值.
- 我们随便从一个值, 例如  $x_0 = 1$  开始, 令  $x_{n+1} = \cos x_n$ . 设  $x = \cos x$ , 则
$$|x_{n+1} - x| = |\cos x_n - \cos x| = \left| -2 \sin \frac{x_n + x}{2} \sin \frac{x_n - x}{2} \right| \leq 2 \cdot \left| \frac{x_n - x}{2} \right| = |x_n - x|.$$
- 由于  $x_0 > x$ , 归纳可知  $(-1)^n(x_n - x) > 0$ . 从而  $\{x_{2n}\}, \{x_{2n-1}\}$  是单调有界数列. 设它们的极限是  $a, b$ , 则由递推公式两边同时取极限可知  $a = \cos b, b = \cos a$ . 同理, 由和差化积可知,  $|a - b| \leq 2 \left| \sin \frac{a-b}{2} \right| \leq |a - b|, a = b, a = \cos a$ , 因此  $a = x$ .



- **例** 证明方程  $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$  在  $(0,1)$  内有解.
- **证明** 令  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 1$ , 则它在  $[0,1]$  上连续,  $f(0) = 1 > 0$ ,  $f(1) = -2 < 0$ . 由零点定理知  $\exists \xi \in (0,1)$  使得  $f(\xi) = 0$ .
- 对于连续函数  $f(x)$ , 我们可以利用二分法来逼近函数的零点.
- 不妨设  $f(x)$  满足  $f(a) < 0$ ,  $f(b) > 0$ . 记  $a_0 = a$ ,  $b_0 = b$ .
- 如果  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq 0$ , 令  $a_1 = \frac{a+b}{2}$ ,  $b_1 = b$ ; 如果  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$ , 令  $a_1 = a$ ,  $b_1 = \frac{a+b}{2}$ .
- 我们递归地构造处一串单增有界数列  $\{a_n\}$  和单减有界数列  $\{b_n\}$ , 因此二者极限存在. 由于二者之差  $a_n - b_n$  趋于零, 因此二者极限相同. 可以证明, 这个极限是  $f(x)$  的零点.



- **例** 设函数  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续,  $f(0) + f(1) = 1$ . 证明在  $[0,1]$  上至少存在一点  $\xi$  使得  $f(\xi) = \xi$ .
- **分析** 这种问题一般条件为一个连续函数满足某些性质, 然后证明存在一个点满足一个等式. 我们从结论构造一个辅助函数  $F$ , 将其变成找  $F$  零点的问题.
- 然后利用条件验证 (1)  $F$  在一个闭区间  $[a, b]$  上连续; (2)  $F(a)F(b) \leq 0$ .
- 当等号成立时, 我们还需要单独讨论下.
- **证明** 令  $F(x) = f(x) - x$ , 则它在  $[0,1]$  上连续, 且
$$F(1) = f(1) - 1 = -f(0) = -F(0).$$
- 如果  $f(0) = 0$ , 则取  $\xi = 0$  即可.
- 如果  $f(0) \neq 0$ ,  $F(1)F(0) = -f(0)^2 < 0$ , 从而由零点定理知  $\exists \xi \in (0,1)$  使得  $F(\xi) = 0$ , 即  $f(\xi) = \xi$ .



- **例** 设函数  $f(x)$  在  $[0, 2a]$  上连续,  $f(0) = f(2a)$ . 证明存在  $\xi \in [0, a]$  使得  $f(a + \xi) = f(\xi)$ .
- **证明** 令  $F(x) = f(a + x) - f(x)$ , 则它在  $[0, a]$  上连续, 且
$$F(a) = f(2a) - f(a) = f(0) - f(a) = -F(0).$$
- 如果  $F(0) = 0$ , 则取  $\xi = 0$  即可.
- 如果  $F(0) \neq 0$ ,  $F(a)F(0) = -F(0)^2 < 0$ , 从而由零点定理知  $\exists \xi \in (0, a)$  使得  $F(\xi) = 0$ , 即  $f(a + \xi) = f(\xi)$ .



- **例** 一名游客去黄山二日游. 第一天早上8:00从山脚出发, 经过6个小时到达山顶. 第二天早上8:00从山顶出发沿着第一天的路线下山, 恰好也花了6个小时到达山脚. 证明这个游客两天内在某个相同的时间点经过同一个地点.
- **证明** 令  $f(x)$  为游客第一天自出发经过  $x$  小时到达的地点距离山脚的距离,  $g(x)$  为游客第二天自出发经过时间  $x$  小时到达的地点距离山脚的距离. 则山脚和山顶的距离为  $f(6) = g(0) \neq 0$ . 另一方面,  $f(0) = g(6) = 0$ .
- 设  $F(x) = f(x) - g(x)$ , 则它在  $[0, 6]$  上连续,  $F(0) = -g(0)$ ,  $F(6) = f(6) = g(0)$ . 因此  $F(0)F(6) = -g(0)^2 < 0$ , 从而由零点定理知存在  $\xi \in (0, 6)$  使得  $F(\xi) = 0$ .
- 因此在8:00经过  $\xi$  小时后的时间点, 这个游客两天经过同一个地点.
- 想象一下, 另一名游客第二天沿着该游客第一天的路线上山, 且上山进度完全一致, 那么这两名游客自然会在某个时间点相遇.



### 综合训练

- **例** 求  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[ \frac{1}{x} \right]$ , 其中  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数.
- **解** 我们利用有界函数乘以无穷小仍然是无穷小.  
由于  $0 \leq \frac{1}{x} - \left[ \frac{1}{x} \right] < 1$ , 且  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left( \frac{1}{x} - \left[ \frac{1}{x} \right] \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( 1 - x \left[ \frac{1}{x} \right] \right) = 0$ .  
从而  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[ \frac{1}{x} \right] = 1$ .
- **另解** 我们利用夹逼准则. 由于  $[x] \leq x < [x] + 1$ , 因此  $x - 1 < [x] \leq x$ , 从而当  $x > 0$  时,  $x \left( \frac{1}{x} - 1 \right) < x \left[ \frac{1}{x} \right] \leq x \cdot \frac{1}{x}$ , 即  $1 - x < x \left[ \frac{1}{x} \right] \leq 1$ .
- 由于  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$ , 由夹逼准则可知  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[ \frac{1}{x} \right] = 1$ .





- 例 求  $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + \cos x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$ .
- 解 注意到这是  $1^\infty$  型不定式.  $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + \cos x)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \cos x - 1}{\sin^2 x}}$ .
- 由于  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \cos x - 1}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}$ , 因此原式  $= e^{\frac{1}{2}}$ .
- 注意红色等式不能直接代入  $\sin x \sim x$ .





- 例 求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2}{\pi} \arctan x - \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \right)$ .
- 解  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2}{\pi} \arctan x - \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) \neq \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \neq \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} - 1 = 0$ .
- 正确的解
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{\pi} \arctan x - \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} - 1 = 0$$
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{2}{\pi} \arctan x - \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{2}{\pi} \cdot \left( -\frac{\pi}{2} \right) + 1 = 0.$$
- 因此  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2}{\pi} \arctan x - \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) = 0$ .
- 注 遇到  $\arctan x, e^{\frac{1}{x}}, |x|, \sqrt{x}$  这些函数时, 要当心是否要区分左右极限.



- **例** 设  $f(x) = \frac{ax^3 + bx^2 + cx}{x^2 - 1}$  满足  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = d$ . 求常数  $a, b, c, d$  的值.
- **解** 由  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$  可知  $a = 0, b = 2$ .
- 由  $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + cx) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + cx}{x^2 - 1} = 0 \cdot d = 0$  可知  $2 + c = 0$ , 因此  $c = -2$ ,  $d = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{x+1} = 1$ .
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{u(x)}{v(x)}$  型极限, 当  $u(x) \rightarrow C \neq 0$  而  $v(x) \rightarrow 0$  时, 它趋于无穷. 由此可知  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + cx}{x^2 - 1}$  存在时其分子极限必定为 0.



- **例** 设数列  $\{a_n\}$  满足  $0 < a_n < 1$ ,  $a_{n+1}(1 - a_n) > \frac{1}{4}$ . 证明数列  $\{a_n\}$  收敛, 并求它的极限.
- 我们利用单调有界收敛准则, 由于题目中是关于  $a_{n+1}$  的下界, 因此我们猜测  $a_{n+1} \geq a_n$ .
- **解** 由均值不等式  $a_n(1 - a_n) \leq \frac{1}{4}$ , 因此  $a_n(1 - a_n) < a_{n+1}(1 - a_n)$ ,  $a_n < a_{n+1}$ . 从而  $\{a_n\}$  是单调有界数列, 存在极限.
- 设极限为  $A$ , 则由  $a_{n+1}(1 - a_n) > \frac{1}{4}$  两边取极限可得  $A(1 - A) \geq \frac{1}{4}$ ,  $(A - \frac{1}{2})^2 \leq 0$ ,  $A = \frac{1}{2}$ . 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$ .



- **例** 方程  $xe^x - \cos x = 0$  在  $(0, +\infty)$  内有几个实根?
- 我们想要用零点定理, 需要将函数限定在有限闭区间上.
- **解** 当  $x > 1$  时,  $xe^x > e$ , 因此方程  $xe^x - \cos x = 0$  在  $(1, +\infty)$  内没有零点.
- 设  $f(x) = xe^x - \cos x$ . 由于  $f(0) = -1 < 0$ ,  $f(1) = e - \cos 1 > 0$ , 因此由零点定理,  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有零点.
- 由于  $x, e^x$  在  $[0, +\infty)$  上非负且单调递增, 因此  $xe^x$  单调递增.
- 由于  $\cos x$  在  $[0, \pi]$  上单调递减, 因此  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上单调递增. 从而  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上只有一个零点.
- 综上所述, 方程  $xe^x - \cos x = 0$  在  $(0, +\infty)$  内有 1 个实根.



- **例** 求所有满足  $f(x+y) = f(x) + f(y)$  的连续函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .
- **解** 令  $x = 0$ , 则可知  $f(0) = 0$ .
- 令  $y = kx$ , 则  $f[(k+1)x] = f(x) + f(kx)$ ,  $f[(k+1)x] - f(kx) = f(x)$ .
- 对于正整数  $n$ ,  $f(nx) = f(nx) - f(0) = \sum_{k=1}^n [f(kx) - f((k-1)x)] = nf(x)$ .
- 令  $y = -x$ , 则  $f(0) = f(x) + f(-x)$ ,  $f(-x) = -f(x)$ . 从而对任意整数  $n$ ,  $f(nx) = nf(x)$ .
- 令  $x = \frac{m}{n}$ , 则  $f(m) = f\left(n \cdot \frac{m}{n}\right) = nf\left(\frac{m}{n}\right)$ ,  $f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{f(m)}{n} = \frac{mf(1)}{n}$ , 即对任意有理数  $x$ ,  $f(x) = xf(1)$ .
- 对于任意实数  $x$ , 存在有理数数列  $x_n \rightarrow x$ , 于是  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(1) = f(1)x$ . 因此  $f(x) = kx$ ,  $k$  为任一实数.



- **例** 求所有满足  $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$  的连续函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .
- **解** 令  $x = y$ , 则  $f(2x) = f(x)^2, f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \geq 0$ .
- 若存在  $x$  使得  $f(x) = 0$ , 则  $f(y) = f(x) \cdot f(y - x) = 0, f = 0$ .
- 若  $f \neq 0$ , 则对任意  $x, f(x) > 0$ . 令  $g(x) = \ln f(x)$ , 则  $g(x + y) = g(x) + g(y)$  且  $g$  连续.
- 因此  $g(x) = kx, f(x) = (e^k)^x$ . 令  $a = e^k$ , 则  $f(x) = a^x$ .
- 因此  $f(x) = 0$  或  $a^x, a > 0$ .



- **例** 求所有满足  $f(2x) = f(x)$  的连续函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .
- **解** 显然  $f(2^n x) = f(x)$ ,  $n$  为任意正整数.
- 对于任意  $a$ ,  $f\left(\frac{a}{2^n}\right) = f(a)$ .
- 由于  $\frac{a}{2^n} \rightarrow 0$ , 于是  $f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{a}{2^n}\right) = f(a)$ , 从而  $f = C$  是常值函数.
- 若只要求  $f$  在  $0$  以外有定义, 则存在非常值的  $f$ .
- 设  $g(x) = f(2^x)$ ,  $x > 0$ , 则  $g(x+1) = g(x)$ . 我们可以取  $g(x) = \sin(2\pi x)$ ,  $f(x) = \sin(2\pi \log_2 x)$ .



合肥工业大学

HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

数学 (下)

# 习题课





### • 习题2-1

- (A) 1.  $x_n$  递减趋向于 0, 极限是 0.
- 2.  $x_n$  奇数项恒为 0, 偶数项  $x_{2n} = \frac{2}{2n} = \frac{1}{n}$  递减趋向于 0, 极限是 0.
- 3.  $x_n$  奇数项递减趋向于  $-1$ , 偶数项递减趋向于 1, 极限不存在.
- 4.  $x_n$  在  $(-1, 1)$  之间震荡, 极限不存在.
- 5.  $\frac{\pi}{n}$  递减趋向于 0,  $x_n$  递增趋向于 1, 极限是 1.
- 6.  $\frac{1}{n}$  递减趋向于 0,  $x_n$  递增趋向于  $-\infty$ , 极限不存在.



- (B) 1.(1)  $\left| \frac{2n-1}{3n+2} - \frac{2}{3} \right| = \frac{7}{3(3n+2)} \leq \frac{1}{n}.$
- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $N = \frac{1}{\varepsilon}$ . 当  $n > N$  时, 有  $\left| \frac{2n-1}{3n+2} - \frac{2}{3} \right| \leq \frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \varepsilon$ . 所以
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{3n+2} = \frac{2}{3}.$$
- 也可以取  $N = \frac{7}{9\varepsilon} - \frac{2}{3}.$
- (2)  $\left| \sin \frac{\pi}{n} \right| \leq \left| \frac{\pi}{n} \right| = \frac{\pi}{n}.$
- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $N = \frac{\pi}{\varepsilon}$ . 当  $n > N$  时, 有  $\left| \sin \frac{\pi}{n} - 0 \right| \leq \frac{\pi}{n} < \frac{\pi}{N} = \varepsilon$ . 所以
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0.$$



- 2. 对于  $\varepsilon = a - b > 0$ ,  $\exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $|x_n - a| < \varepsilon$ , 于是  $x_n > a - \varepsilon = b$ .
- 如果利用2.3节极限的性质, 则更简单.
- 我们有  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - a) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n - a = b - a > 0$ . 由极限的保号性可知  $\exists N$  使得当  $n > N$  时, 有  $x_n - a > 0$ , 即  $x_n > a$ .



- 3. 由于

$$|x_n| - |a| \leq |x_n - a|, \quad |a| - |x_n| \leq |x_n - a|,$$

- 因此  $||x_n| - |a|| \leq |x_n - a|$ .
- $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$  使得当  $n > N$  时, 有  $|x_n - a| < \varepsilon$ , 于是  $||x_n| - |a|| \leq |x_n - a| < \varepsilon$ . 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$ .
- 反之未必成立, 例如  $x_n = (-1)^n, |x_n| = 1$ .
- 这本质上是因为函数  $y = |x|$  连续.



### • 习题2.2

• (A) 1. (1) 见右图.


• (2)  $f(2^-) = 4$ ,  $f(2^+) = 4$ .

• (3)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  存在, 为 4.

• 2. 当  $x < 0$  时,  $f(x) = -1$ . 因此  $f(0^-) = -1$ .

• 当  $x > 0$  时,  $f(x) = 1$ . 因此  $f(0^+) = 1$ .

• 故  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在.





- (B) 1. (1)  $\left| \frac{x^2-4}{x+2} - (-4) \right| = \left| \frac{x^2+4x+4}{x+2} \right| = |x+2|.$
- $\forall \epsilon > 0$ , 令  $\delta = \epsilon$ . 当  $0 < |x+2| < \delta$  时, 有  $\left| \frac{x^2-4}{x+2} - (-4) \right| = |x+2| < \delta = \epsilon$ . 所以  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2-4}{x+2} = -4$ .
- (2)  $\left| x \sin \frac{1}{x} - 0 \right| \leq |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|.$
- $\forall \epsilon > 0$ , 令  $\delta = \epsilon$ . 当  $0 < |x| < \delta$  时, 有  $\left| x \sin \frac{1}{x} - 0 \right| \leq |x| < \delta = \epsilon$ . 所以  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ .
- 注意它和第一个重要极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$  的差异.



- (3) 由  $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \varepsilon$  解得  $x > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$  或  $x < 0$ .
- 由  $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > -\varepsilon$  解得  $x < \frac{1}{e^{-\varepsilon} - 1}$  或  $x > 0$ .
- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $X = \max\left\{\frac{1}{e^\varepsilon - 1}, -\frac{1}{e^{-\varepsilon} - 1}\right\} > 0$ .
- 当  $x > X$  时, 有  $0 < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \varepsilon$ . 当  $x < -X$  时, 有  $-\varepsilon < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < 0$ .
- 因此当  $|x| > X$  时, 有  $\left|\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right| < \varepsilon$ . 所以  $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 0$ .



- (4) 使用定义证明极限的时候, 可以适当缩小自变量的范围.
- 对于数列情形, 可以不妨设  $n > N_0$ , 然后在取  $N$  的时候额外要求  $N \geq N_0$  即可.
- 对于  $x \rightarrow x_0$  情形, 可以不妨设  $-\delta_0 < x - x_0 < \delta_0$ , 然后在取  $\delta$  的时候额外要求  $\delta \geq \delta_0$  即可.
- 当  $1 < x < 3$  时,  $|x^2 - 4| = (x + 2)|x - 2| \leq 5|x - 2|$ .
- $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $\delta = \min \left\{ \frac{\varepsilon}{5}, 1 \right\}$ . 当  $0 < |x - 2| < \delta$  时, 有  $1 < x < 3$ ,  $|x^2 - 4| \leq 5|x - 2| < 5\delta \leq \varepsilon$ . 所以  $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ .





- 2. 对于  $\varepsilon = 1 > 0$ ,  $\exists \delta > 0$  使得当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .
- 因此  $|f(x)| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$ , 从而有界.



- 习题2.3

- (A) 1. (1) 正确, 如果  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$  存在, 则

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] - \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在.

- (2) 错误, 例如  $x_0 = 0, f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = -\frac{1}{x}$ .
- (3) 错误, 例如  $x_0 = 0, f(x) = 0, g(x) = \frac{1}{x}$ .



- 2. (1)  $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^4 - x^3 + 5x + 6) = (2x^4 - x^3 + 5x + 6)|_{x=1} = 12.$
- (2) 这是  $\frac{0}{0}$  型不定式.
- $$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^3 + 8} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)(x^2 - 2x + 4)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-2}{x^2 - 2x + 4}$$
- $$= \frac{-2-2}{(-2)^2 - 2 \times (-2) + 4} = -\frac{1}{3}.$$



- (3) 虽然这是  $\infty - \infty$  型不定式, 但是我们可以将其通分化为其它形式.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{x} - \frac{3x+2}{x(x^3+2)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3-3x}{x(x^3+2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-3}{x^3+2} = \frac{x^2-3}{x^3+2} \Big|_{x=0} = -\frac{3}{2}.$
- (4)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{1}{x} \right) \left( 1 + \frac{3}{x^2} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} (2-t)(1+3t^2) = 2.$
- 也可以  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{1}{x} \right) \left( 1 + \frac{3}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{1}{x} \right) \times \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{3}{x^2} \right) = 2 \times 1 = 2.$
- (B) 否. 例如  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ , 则  $f(x) > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$
- 例如  $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$



- 习题2.4

- (A) 1.(1) 错误. 例如  $f(x) = -\frac{1}{(x-x_0)^2}$ .
- (2) 错误. 例如  $f(x) = 1 + |x - x_0|$ .
- (3) 错误. 例如  $f(x) = x, g(x) = -x, x \rightarrow +\infty$ .
- (4) 错误. 例如  $f(x) = 0, \forall g, fg = 0$ .
- (5) 错误. 这二者极限为 1, 都不是无穷小.



- 2. (1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5}{x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{5}{x^2}}{1 + \frac{3}{x^2}} = 2.$
- 以后遇到这种有理函数在  $x \rightarrow \infty$  时的极限可以直接写结果.
- (2)  $x \rightarrow 2$  时,  $x - 2 \rightarrow 0$ ,  $x^2 + 4x + 1 \rightarrow 13$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 4x + 1}{x - 2} = \infty$  不存在.
- (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{2}{3} + \frac{2^2}{3^2} + \cdots + \frac{2^n}{3^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 3.$



- (4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \cdots + \frac{n^2}{n^3} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}.$
- 3.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-4)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-4}{x+1} = -\frac{3}{2} \neq 1$ , 因此它们不是等价无穷小, 但是是同阶无穷小.
- 4.(1)  $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + x^2}{3x - x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a+x}{3-x^2} = \frac{a}{3}, a = 3.$
- (2)  $0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + x^2}{3x - x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a+x}{3-x^2} = \frac{a}{3}, a = 0.$
- (B) 1.  $|f(x)| = |x^3 + 1| \geq |x|^3 - 1$ . 对于  $\forall M > 0$ , 若  $|x| > X = \sqrt[3]{M+1}$ , 则  $|f(x)| \geq |x|^3 - 1 > X^3 - 1 = M$ . 因此  $f(x)$  当  $x \rightarrow \infty$  时是无穷大.
- $|x| > 11$  时,  $|f(x)| \geq 11^3 - 1 = 1330 > 1000.$



- 2. 分析: 设  $x = \frac{1}{\left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi}$ , 则  $f(x) = \frac{1}{x} = \left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi > M, k > \frac{M}{2\pi} - \frac{1}{4}$ .

- 解: 对于  $\forall M > 0$ , 令  $k = \left[\frac{M}{2\pi}\right] + 1 > \frac{M}{2\pi}$ ,  $x_M = \frac{1}{\left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi}$ , 则

$$f(x_M) = \frac{1}{x_M} = \left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi > 2k\pi > M.$$

- 因此  $f(x)$  在  $(0,1]$  上无界.

- 令  $x_k = \frac{1}{k\pi}$ ,  $k$  为正整数, 则  $f(x_k) = 0$  且  $x_k \rightarrow 0$ . 因此  $f(x)$  不是  $x \rightarrow 0^+$  时的无穷大.





- 3. 由于  $x \rightarrow x_0$  时,  $\alpha, \beta$  是无穷小, 从而  $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = \lim_{x \rightarrow x_0} \beta = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha - \beta) = 0$ , 因此  $\alpha - \beta$  是无穷小.
- 如果  $\alpha \sim \beta$ , 则  $x \rightarrow x_0$  时,  $\frac{\alpha}{\beta} \rightarrow 1$ ,  $\frac{\alpha - \beta}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta} - 1 \rightarrow 0$ , 即  $\alpha - \beta = o(\beta)$ .
- 如果  $\alpha - \beta = o(\beta)$ , 则  $x \rightarrow x_0$  时,  $\frac{\alpha - \beta}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta} - 1 \rightarrow 0$ ,  $\frac{\alpha}{\beta} \rightarrow 1$ , 即  $\alpha \sim \beta$ .



### • 习题2.5

- (A) 1. (1)-(5) 是  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$  或  $0 \cdot \infty$  型不定式. 因此我们总可以用等价无穷小(或等价无穷大)替换.

- (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}.$

- (2) 由于  $\sin x \sim x$ , 因此  $\sin \sin x \sim \sin x \sim x$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sin x}{\tan x} =$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

- (3)  $\lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{\sin x}{x + \pi} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(y - \pi)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-\sin y}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1.$



- (4)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan \frac{5}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} \cdot \tan 5y = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y}{y} = 5.$
- (5)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (\cos x - 1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2\right)}{x^3} = -\frac{1}{2}.$
- (6)-(8) 都是  $1^\infty$  型不定式, 由于在本节还没有学习连续性, 因此我们直接用第二个重要极限.
- (6)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-x/2}\right)^{(-x/2) \cdot (-2)} = e^{-2}.$
- (7)  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[x]{1+3x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{1}{3x} \cdot 3} = e^3.$
- (8)  $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = \lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{-\frac{1}{y}} = e^{-1}.$



- 2.(1) 由于  $0 < x_n < n \times \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$ , 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ , 因此由夹逼准则,  
 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .
- (2) 2.
- (B) 1. 设  $x_n = n \left( \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} \right)$ , 则
$$x_n > n \times n \times \frac{1}{n^2+n} = \frac{n^2}{n^2+n}, \quad x_n < n \times n \times \frac{1}{n^2+1} = \frac{n^2}{n^2+1}.$$
- 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1} = 1$ , 因此由夹逼准则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ .



- 2. 由  $\sin 2y = 2\sin y \cos y$  可知  $\cos y = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2y}{\sin y}$ . 因此

$$\cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \prod_{k=1}^n \cos \left( \frac{x}{2^k} \right) = \prod_{k=1}^n \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \left( \frac{x}{2^{k-1}} \right)}{\sin \left( \frac{x}{2^k} \right)} \right) = \frac{\sin x}{2^n \sin \left( \frac{x}{2^n} \right)}.$$

- 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{2^n \sin \left( \frac{x}{2^n} \right)} = \frac{\sin x}{x}.$$

- 从而原式  $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ .
- 题目中的  $x \neq 0$  不需要.



- 习题2.6
- (A) 1.(1) 正确. 因为连续函数的差是连续函数.
- (2) 错误. 例如  $f$  不连续,  $g = -f$  不连续但  $f + g = 0$ .
- (3) 错误. 例如  $f = 0$ .
- (4) 错误. 例如  $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$  在 0 处不连续但是  $|f| = 1$ .
- (5) 错误. 同上例.
- (6) 错误. 例如  $\frac{\sin x}{x}$ .



- 2. 由于  $\cos \frac{1}{x}$  当  $x \neq 0$  时有界, 因此  $f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + x \cos \frac{1}{x}\right) = 1$ .
- 由于  $x \rightarrow 0^-$  时,  $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ ,  $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$ , 因此  $f(0^-) = 1$ .
- 由于  $f(0^+) = f(0^-) = f(0) = 1$ , 因此  $f$  在 0 处连续.
- 3.(1)  $x^2 + 2x - 3 = 0$ ,  $x = 1$  或  $-3$ . 间断点为 1,  $-3$ .
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x+3} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ , 因此  $x = 1$  是可去间断点, 补充定义  $f(1) = \frac{1}{2}$  可使之连续.
- $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+1}{x+3} = \infty$ , 因此  $x = -3$  是无穷间断点.



- (2)  $x^2 - 1 = 0, x = 1$  或  $-1$ . 间断点为  $\pm 1$ .
- $x \rightarrow 1^+$  时,  $x^2 - 1 \rightarrow 0^+, \frac{1}{x^2 - 1} \rightarrow +\infty, \arctan \frac{1}{x^2 - 1} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ .
- $x \rightarrow 1^-$  时,  $x^2 - 1 \rightarrow 0^-, \frac{1}{x^2 - 1} \rightarrow -\infty, \arctan \frac{1}{x^2 - 1} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ .
- 因此  $x = 1$  是跳跃间断点.
- $x \rightarrow (-1)^+$  时,  $x^2 - 1 \rightarrow 0^-, \frac{1}{x^2 - 1} \rightarrow -\infty, \arctan \frac{1}{x^2 - 1} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ .
- $x \rightarrow (-1)^-$  时,  $x^2 - 1 \rightarrow 0^+, \frac{1}{x^2 - 1} \rightarrow +\infty, \arctan \frac{1}{x^2 - 1} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ .
- 因此  $x = -1$  是跳跃间断点.
- 需要区分正负的最常见的就是  $e^x$  ( $x \rightarrow \infty$ ) 和  $\arctan x$  ( $x \rightarrow \infty$ ).





- (3) 间断点为  $0, 1$ .
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x|}{x} = 1$ .  $x \rightarrow 1^+$  时,  $\frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty$ ,  $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty$ ,  $f(x) \rightarrow +\infty$ .
- $x \rightarrow 1^-$  时,  $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$ ,  $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 0$ ,  $f(x) \rightarrow 1$ .
- 因此  $x = 1$  是无穷间断点.
- $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x-1}} = e^{-1}$ .  $x \rightarrow 0^+$  时,  $\frac{|x|}{x} \rightarrow 1$ ,  $f(x) \rightarrow 1 + e^{-1}$ .
- $x \rightarrow 0^-$  时,  $\frac{|x|}{x} \rightarrow -1$ ,  $f(x) \rightarrow -1 + e^{-1}$ .
- 因此  $x = 0$  是跳跃间断点.



- (4)  $\tan x$  在  $x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$  处无定义; 在  $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$  处为 0. 因此间断点为  $\frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ .
- $x \rightarrow k\pi + \frac{\pi}{2}$  时  $\tan x \rightarrow \infty, f(x) \rightarrow 0$ , 因此  $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$  是可去间断点, 补充定义  $f\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0$  可使之连续.
- $x \rightarrow k\pi \neq 0$  时  $\tan x \rightarrow 0, f(x) \rightarrow \infty$ , 因此  $x = k\pi, k \neq 0$  是无穷间断点.
- $x \rightarrow 0$  时  $f(x) \rightarrow 1$ , 因此  $x = 0$  是可去间断点, 补充定义  $f(0) = 1$  可使之连续.



- 4.(1)  $1 + 2\sin 2x$  在  $\frac{\pi}{3}$  处连续, 取值为  $1 + 2\sin \frac{2\pi}{3} = 1 + \sqrt{3}$ .
- 由于  $\ln x$  在其定义域连续, 因此该极限为  $\ln(1 + \sqrt{3})$ .

- (2) 令  $y = \frac{1}{x}$ , 则原极限 =  $\lim_{y \rightarrow 0^+} \left( \sqrt{\frac{1}{y}} - \sqrt{\frac{1}{y}} - \sqrt{\frac{1}{y}} \right) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - \sqrt{y}} - 1}{\sqrt{y}}$

- =  $\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{(1 - \sqrt{y}) - 1}{\sqrt{y}(\sqrt{1 - \sqrt{y}} + 1)} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{-1}{\sqrt{1 - \sqrt{y}} + 1} = -\frac{1}{2}$ .

- (3) 原极限 =  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\cos x} + 1} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{4}$ .



- (4) 原极限  $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3+x}{2+x} \right)^{2x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3+x}{2+x} - 1 \right) 2x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2+x}} = e^2$ .
- 5. 由于函数  $f(x) = e^x - 3x$  在  $[0,1]$  上连续, 且  $f(0) = 1 > 0, f(1) = e - 3 < 0$ , 因此由零点定理,  $f$  在  $(0,1)$  内存在实根.
- 6. 设  $F(x) = f(x) - x$ , 则  $F(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 且  $F(0) = f(0) < 0, F(1) = f(1) - 1 > 0$ , 因此由零点定理,  $\exists \xi \in (0,1)$  使得  $F(\xi) = 0$ , 即  $f(\xi) = \xi$ .



- (B) 1. 显然  $f$  在  $x \neq 0$  处均连续. 由于  $f(0^+) = f(0) = a$ ,
- $f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - e^{\sin x}}{\arctan \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x}{\frac{x}{2}} = -2$ , 因此  $a = -2$ .
- 2. (1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 1} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 1} - 1 \right) x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3x + 1)x}{x^2 + 1}} = e^3$ .
- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+x}{n+1} \right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+x}{n+1} - 1 \right) n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x-1)n}{n+1}} = e^{x-1}$ .
- 3.  $9 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+a}{x-a} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+a}{x-a} - 1 \right) x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2ax}{x-a}} = e^{2a}$ ,  $a = \ln 3$ .



- 4. 补充定义  $f(a) = f(a^+)$ ,  $f(b) = f(b^-)$ , 则  $f$  在  $[a, b]$  内连续, 从而在  $[a, b]$  上有界, 证毕.
- 5. 设  $f(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$ , 则  $f$  在  $[\frac{1}{2}, 1]$  上连续且  $f(1) = n - 1 > 0$ ,  $f(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2})^n + (\frac{1}{2})^{n-1} + \cdots + \frac{1}{2} - 1 = -(\frac{1}{2})^n < 0$ .
- 由零点定理,  $f$  在  $(\frac{1}{2}, 1)$  内有实根.
- 6. 不妨设  $f(x_k) = \max \{f(x_1), \dots, f(x_n)\}$ ,  $f(x_m) = \min \{f(x_1), \dots, f(x_n)\}$ .
- 如果所有  $f(x_i)$  均相等, 则取  $\xi = x_1$  即可.
- 如果  $f(x_i)$  不全相等, 则  $k \neq m$ ,  $f(x_k) > \frac{1}{n}[f(x_1) + \cdots + f(x_n)] > f(x_m)$ .
- 由介值定理, 存在  $\xi$  介于  $x_k, x_m$  之间, 满足  $f(\xi) = \frac{1}{n}[f(x_1) + \cdots + f(x_n)]$ .



### • 总复习题二

- 1.(1) ① 必要, 充分. ② 必要, 充分. ③ 充分必要 (充要)
- (2) 1. 它的奇子数列  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} \rightarrow 1$ , 偶子数列  $\left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow 1$ .
- (3) 由于  $1 - \cos xf(x) \sim \frac{1}{2}(xf(x))^2$ ,  $(e^{x^2} - 1)f(x) \sim x^2 f(x)$ , 因此
- $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2} = \frac{f(0)}{2}$ ,  $f(0) = 2$ .
- 2.(1) 有限项不影响极限, 因此 AB 错误.
- $a_n c_n$  是  $0 \cdot \infty$  型不定式, 极限可能存在, 例如  $a_n = \frac{1}{n}$ ,  $c_n = n$ .
- 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$  存在, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$  存在, 矛盾. 因此选 D.



- (2)  $f(x) = (e^{x \ln 2} - 1) + (e^{x \ln 3} - 1) \sim x \ln 2 + x \ln 3 = x \ln 6$  和  $x$  同阶不等价, 因此选 **D**.
- (3)  $\ln^\alpha (1 + 2x) \sim (2x)^\alpha = o(x), \alpha > 1$ .
- $(1 - \cos x)^{\frac{1}{\alpha}} \sim \left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{1}{\alpha}} = 2^{-\frac{1}{\alpha}} x^{\frac{2}{\alpha}} = o(x), \frac{2}{\alpha} > 1, \alpha < 2$ . 因此选 **B**.
- (4)  $1 - \cos \sqrt{x} \sim \frac{1}{2}x$ , 因此  $f(0^+) = \frac{1}{2a} = f(0^-) = b, ab = \frac{1}{2}$ , 选 **A**.
- 3. 设  $\forall n, |x_n| < M$ . 对于  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$  使得  $\forall n > N, |y_n| < \frac{\varepsilon}{M}$ . 因此  $|x_n y_n| < \varepsilon$ , 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$ .
- 4. 对于  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$  使得  $\forall n > N, |y_n - x_n| < \varepsilon$ .
- 由于  $x_n \leq a \leq y_n$ , 因此  $0 \leq a - x_n \leq y_n - x_n < \varepsilon, 0 \leq y_n - a \leq y_n - x_n < \varepsilon$ , 从而  $|x_n - a| < \varepsilon, |y_n - a| < \varepsilon$ . 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$ .





$$\bullet \quad 5.(1) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{e^x - 1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - 1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x}} = e.$$

$$\bullet \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{\ln(1 + 2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x}} \cdot \frac{1}{2x^3}$$

$$\bullet \quad = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \cdot (\cos x - 1)}{x^3} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{x^3} = \frac{1}{8}.$$

$$\bullet \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - x^2 \cos \frac{1}{x}}{(e^{-x} - 1)(1 + \cos x)} = \left[ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x}{(e^{-x} - 1)(1 + \cos x)} \right] - \left[ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{(e^{-x} - 1)(1 + \cos x)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{(-x) \cdot 2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{(-x) \cdot 2} = -\frac{3}{2}.$$



- (4) 由于  $\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} - 1 = \frac{x^2}{x^2 + (b-a)x - ab} - 1 = \frac{(a-b)x + ab}{x^2 + (b-a)x - ab},$

- 因此  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[ \frac{x^2}{(x-a)(x+b)} - 1 \right]}$

- $= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x[(a-b)x + ab]}{x^2 + (b-a)x - ab}} = e^{a-b}.$

- 6.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$  首先显然要区分  $x \rightarrow 0^\pm.$



- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{2e^{-\frac{1}{x}}+1}{e^{-\frac{1}{x}}+1} \right) e^{-\frac{1}{x}} = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = 1,$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1.$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{-x} = -1,$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left( \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1.$  因此  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1.$



- 7. 由于该极限是  $1^\infty$  型不定式, 因此  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$  等价于
- $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} - 1 \right) \frac{1}{\sin kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \tan x}{(1 + \tan x) \sin kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{kx} = -\frac{2}{k}.$
- 因此  $k = -2.$
- 8.  $0 = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - ax - b) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{y^2 + y + 1} - a - by}{y}.$  于是
- $\lim_{y \rightarrow 0} (\sqrt{y^2 + y + 1} - a - by) = \left( \lim_{y \rightarrow 0} y \right) \left( \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{y^2 + y + 1} - a - by}{y} \right) = 0,$
- $a = 1.$



- $0 = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{y^2 + y + 1} - 1 - by}{y}$
- $= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 + y + 1 - (1 + by)^2}{y} \cdot \frac{1}{\sqrt{y^2 + y + 1} + 1 + by}$
- $= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(1 - b^2)y^2 + (1 - 2b)y}{y} \cdot \frac{1}{\sqrt{y^2 + y + 1} + 1 + by} = \frac{1 - 2b}{2}.$
- 因此  $b = \frac{1}{2}.$
- 一般地,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{x^2 + ux + v} - x - \frac{u}{2} \right) = 0.$



- 9. 这种一般都是用夹逼准则.
- (1) 由  $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2}} = \frac{1}{n}$  可知
- $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq n \cdot \frac{1}{n} = 1.$
- 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$  以及夹逼准则可知
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = 1.$



- (2) 由  $\frac{k}{n^2+n+n} \leq \frac{k}{n^2+n+k} \leq \frac{k}{n^2+n}$  可知
- $\frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2+2n} = \frac{n+1}{2n+4} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n+k} \leq \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2+n} = \frac{1}{2}.$
- 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+4} = \frac{1}{2}$  以及夹逼准则可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n+k} = \frac{1}{2}.$
- 为什么我们这么估计? 因为分母中  $n^2$  是主要项,  $k$  相比它都很小, 所以把  $k$  放缩掉. 但是分子中的  $k$  本身就是主要项, 不可放缩掉.



- 10. 容易看出当  $x_n > 0$  时  $x_{n+1} > 0$ . 由于  $x_1 = a > 0$ , 因此所有的  $x_n > 0$ , 从而  $x_{n+1} \geq \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{a} = \sqrt{a}$ .
- 于是  $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left( \frac{a}{x_n} - x_n \right) = \frac{a - x_n^2}{2x_n} \leq 0, \forall n \geq 2$ .
- 因此  $x_2, x_3, \dots$  是有界单减数列, 从而极限存在.
- 设极限为  $A$ . 在递推公式两边同时取极限可得  $A = \frac{1}{2} \left( A + \frac{a}{A} \right), A^2 = a$ .
- 由于  $x_{n+1} \geq \sqrt{a}, \forall n \geq 1$ , 因此  $A \geq \sqrt{a}$ , 从而  $A = \sqrt{a}$ .





- 11.  $e^{\sin x} - e^{\tan x} = (e^{\sin x - \tan x} - 1)e^{\tan x} \sim e^{\sin x - \tan x} - 1.$

- 由于  $e^x - 1 \sim x$ , 故

$$e^{\sin x - \tan x} - 1 \sim \sin x - \tan x = (\cos x - 1)\tan x \sim -\frac{1}{2}x^2 \cdot x = -\frac{1}{2}x^3.$$

- 因此  $n = 3$ .



- 12. 求极限得

- $$f(x) = \begin{cases} -1, & |x| < 1; \\ 0, & x = 1; \\ -1, & x = -1; \\ x, & |x| > 1. \end{cases} = \begin{cases} -1, & x \in [-1, 1); \\ 0, & x = 1; \\ x, & |x| > 1. \end{cases}$$

- 当  $x = -1$  时, 由于  $f((-1)^-) = f((-1)^+) = f(-1) = -1$ , 因此  $f(x)$  在  $x = -1$  处连续.
- 当  $x = 1$  时, 由于  $f(1^-) = -1$ ,  $f(1^+) = 1$ , 因此  $1$  是跳跃间断点.
- 事实上  $f(x) = x - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$ , 所以课上已经讲过.



- 13.  $f(x) = (1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\frac{\pi}{4})}}$ .
- 当  $x = \frac{\pi}{4}$  时,  $f$  无定义. 由于  $x \rightarrow (\frac{\pi}{4})^+$  时,  $\tan(x - \frac{\pi}{4}) \rightarrow 0^+$ ,  $\frac{x}{\tan(x - \frac{\pi}{4})} \rightarrow +\infty$ ,  
 $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{4})^+} f(x)$  不存在, 因此  $\frac{\pi}{4}$  是无穷间断点.
- 当  $x = \frac{3\pi}{4}$  时,  $f$  无定义.
- $x \rightarrow (\frac{3\pi}{4})^+$  时,  $\tan(x - \frac{\pi}{4}) \rightarrow -\infty$ ,  $\frac{x}{\tan(x - \frac{\pi}{4})} \rightarrow 0$ ,  $f(x) \rightarrow 1$ .
- $x \rightarrow (\frac{3\pi}{4})^-$  时,  $\tan(x - \frac{\pi}{4}) \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{x}{\tan(x - \frac{\pi}{4})} \rightarrow 0$ ,  $f(x) \rightarrow 1$ .
- 因此  $\frac{3\pi}{4}$  是可去间断点, 补充定义  $f(\frac{3\pi}{4}) = 1$  可使之在该处连续.



- 14. 设  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ .
- 当  $x > 1$  时,  $f(x) - x^3 = ax^2 + bx + c \geq -|ax^2 + bx + c| \geq -|ax^2| - |bx^2| - |cx^2| = -(|a| + |b| + |c|)x^2$ ,  $f(x) \geq x^2[x - (|a| + |b| + |c|)]$ .
- 因此对任意  $\alpha > \max\{1, |a| + |b| + |c|\}$ , 有  $f(\alpha) > 0$ .
- 当  $x < -1$  时,  $f(x) - x^3 = ax^2 + bx + c \leq |ax^2 + bx + c| \leq |ax^2| + |bx^2| + |cx^2| = (|a| + |b| + |c|)x^2$ ,  $f(x) \leq x^2[x + (|a| + |b| + |c|)]$ .
- 因此对任意  $\beta < \min\{-1, -|a| - |b| - |c|\}$ , 有  $f(\beta) < 0$ .
- 由于  $f$  是连续函数, 由介值定理, 存在  $x \in (\beta, \alpha)$  使得  $f(x) = 0$ .
- **另证.** 由  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$  可知存在  $X > 0$  使得当  $|x| \geq X$  时,  $\left| \frac{f(x)}{x^3} - 1 \right| < \frac{1}{2}$ ,  $\frac{f(x)}{x^3} > \frac{1}{2} > 0$ . 故  $f(X) > 0$ ,  $f(-X) < 0$ .



- 15. 令  $F(x) = (p + q)f(x) - pf(a) - qf(b)$ .
- 则  $F(a) = q[f(a) - f(b)], F(b) = -p[f(a) - f(b)]$ .
- 如果  $f(a) = f(b)$ , 则取  $\xi = a$  即可.
- 如果  $f(a) \neq f(b)$ ,  $F(a)F(b) = -pq[f(a) - f(b)]^2 < 0$ , 从而由零点定理知存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $F(\xi) = 0, pf(a) + qf(b) = (p + q)f(\xi)$ .
- **另证.** 如果  $f(a) = f(b)$ , 则取  $\xi = a$  即可.
- 如果  $f(a) \neq f(b)$ , 不妨设  $f(a) < f(b)$ , 则  $f(a) < \frac{pf(a) + qf(b)}{p + q} < f(b)$ .
- 从而由介值定理知存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $f(\xi) = \frac{pf(a) + qf(b)}{p + q}$ .