



合肥工业大学

HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

线性代数

张神星 (合肥工业大学)

办公室: 翡翠科教楼 B1810 东

Email: zhangshenxing@hfut.edu.cn

课件地址: <https://zhangshenxing.github.io>

第三章 向量组

① 向量组的线性表示

第一节 向量组的线性表示

■ n 维向量的定义及运算

当矩阵的行数或列数为 1 时, 对应的矩阵被称为行向量和列向量:

$$\alpha^T = (a_1, \dots, a_n), \quad \alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

其中 a_i 称为 n 维行向量 α^T 或 n 维列向量 α 的第 i 个分量. 向量也是我们中学学习的平面和立体向量的高维推广.

注意行向量和列向量是不同的东西. 当没有明确说明是行向量还是列向量时, 默认是列向量.

分量全为零的向量称为**零向量** $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)^T$. 上一章中我们已经知道了向量的加法和数乘运算, 它们满足:

- (1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- (2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- (3) $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$;
- (4) $1 \cdot \alpha = \alpha$;
- (5) $k(\ell\alpha) = (k\ell)\alpha$;
- (6) $(k + \ell)\alpha = k\alpha + \ell\alpha$;
- (7) $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$.