

Acemiz Plus टैबलेट

1. दवा का नाम और शक्ति

- **जेनेरिक नाम:** Acemiz Plus
- **ब्रांड नाम:** (निर्माता के अनुसार भिन्न हो सकता है)
- **डोज फॉर्म:** टैबलेट
- **शक्तियाँ:** 100 mg

2. उपयोग

- Acemiz Plus निम्नलिखित स्थितियों के लिए उपयोग की जाती है:
 - दर्द निवारण (हल्का से मध्यम दर्द)
 - सूजन संबंधी स्थितियां (जैसे, गठिया)
 - बुखार को कम करना

3. क्रिया प्रणाली

- **Acetaminophen:** नॉन-स्टेरोइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) जो दर्द और सूजन को कम करने के लिए COX एंजाइमों को रोकता है।
- **Paracetamol (Acetaminophen):** एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक जो मस्तिष्क में काम करके दर्द और बुखार को कम करता है।

4. डोज और प्रशासन

- **व्यस्क:**
 - सामान्य डोज: आवश्यकता अनुसार 1 टैबलेट हर 8-12 घंटे, लेकिन निर्धारित दैनिक सीमा से अधिक नहीं।
- **बच्चे:** डोज उम्र और वजन के आधार पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

5. प्रतिबंध

- Acemiz Plus के किसी भी घटक के प्रति ज्ञात संवेदनशीलता।
- गंभीर यकृत या गुर्दे की समस्याएं।
- सक्रिय आंतरिक रक्तस्राव या अल्सर।

6. चेतावनी और सावधानियां

- पेट संबंधी विकारों के इतिहास वाले रोगियों में सावधानी से उपयोग करें।
- लंबे समय तक उपयोग के दौरान यकृत और गुर्दे के कार्य की निगरानी करें।
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना चाहिए।

7. साइड इफेक्ट्स

- **सामान्य:**
 - मिचली, उल्टी
 - पेट में दर्द
 - सिरदर्द
 - चक्कर आना
- **गंभीर (दुर्लभ):**
 - एलर्जिक प्रतिक्रियाएं (एनाफिलेक्सिस)

- यकृत का नुकसान
- गुर्दे की समस्याएं
- गंभीर पेट के मुद्दे

8. दवा के इंटरैक्शन

- अन्य NSAIDs: दुष्प्रभावों का जोखिम बढ़ता है।
- एंटीकोआगुलंट्स (जैसे, वारफरिन) : रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है।
- शराब: यकृत विषाक्तता का जोखिम बढ़ता है।
- कुछ उच्च रक्तचाप की दवाएं: प्रभावशीलता कम हो सकती है।

9. भंडारण की शर्तें

- कमरे के तापमान पर रखें, प्रकाश और नमी से दूर।
- बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

10. रोगी परामर्श जानकारी

- दवा को निर्देशित अनुसार लें, निर्धारित डोज से अधिक न लें।
- यदि आप अन्य दवाएं ले रहे हैं, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को बताएं।
- किसी भी एलर्जिक प्रतिक्रिया या गंभीर पेट की समस्याओं की सूचना दें।
- हाइड्रेटेड रहें और इस दवा के दौरान शराब से बचें।

11. ओवरडोज

- लक्षणों में मिचली, उल्टी और पेट में दर्द शामिल हो सकते हैं। प्रबंधन में सहायक देखभाल शामिल है, और गंभीर मामलों में गैस्ट्रिक लवेज किया जा सकता है।