

ANÁLISIS NUMÉRICO I/ANÁLISIS NUMÉRICO – 2020

Trabajo de Laboratorio N^o 5

1. Programar una función en **python** que integre numéricamente usando las reglas compuestas del trapecio, punto medio y Simpson, nombrarla **intenumcomp**. La función deberá ejecutarse:

```
python> S = intenumcomp(fun,a,b,N,regla)
```

donde **fun** es la función de \mathbb{R} en \mathbb{R} a ser integrada, $a, b \in \mathbb{R}$ son los extremos de integración, N es la cantidad de subintervalos a usar y **regla** es un string, que deberá ser **trapecio**, **pm** o **simpson**. La salida S debe ser un número real.

2. Ejecutar los comandos necesarios para mostrar en pantalla los errores absolutos de integrar numéricamente

$$\int_0^1 e^{-x} dx,$$

usando 4, 10 y 20 subintervalos con las 3 reglas compuestas del ejercicio 1.

3. Escribir una función en **python** llamada **senint** que para cada $x \in \mathbb{R}^n$ retorne $y \in \mathbb{R}^n$ tal que y_i es la aproximación numérica de

$$\int_0^{x_i} \cos(t) dt,$$

usando la regla compuesta del trapecio con N_i subintervalos. La cantidad N_i de subintervalos debe ser escogida de forma que la longitud de los subintervalos sea menor o igual a 0.1 (ver comandos **floor**, **ceil**, **round**). Para $x = 0, \dots, 2\pi$, con pasos de 0.5, grafique simultáneamente **sin(x)** y **senint(x)**.

4. Calcular mediante la regla del trapecio compuesta y la regla de Simpson compuesta, las siguientes integrales, con una tolerancia de error de 10^{-5} :

a) $I = \int_0^1 x e^{-x} dx,$

b) $I = \int_0^1 x \sin(x) dx,$

c) $I = \int_0^1 (1 + x^2)^{3/2} dx,$

d) $I = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(t)/2}} dt.$

5. Calcular las siguientes integrales utilizando la regla de trapecio y Simpson haciendo uso de la librería **scipy** (explorar el módulo **integrate**)

a) $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx,$

$$b) \ I = \int_0^2 x^2 \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) \, dx.$$

6. El período de un péndulo de longitud l con amplitud α puede aproximarse con la fórmula:

$$T = 4\sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{(1 - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}}},$$

donde $g = 9.8m/s^2$

Programar una función, **pendulo**, que reciba una longitud l en metros y α en forma de un número entero entre 0 y 90, transforme el valor a radianes y devuelva el período del péndulo de longitud l . ¿Qué ocurre en el caso de $\alpha = 0$?