

# ОТЧЕТ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ

На кафедре эндокринологии II ТашГосМИ было проведено исследование по определению эффективности лечения диабетической нейропатии инфракрасными керамическими излучателями серии

Лечение проводилось излучателями общего и локального назначения I раз в день в течении 15-20 дней, на фоне базисной сахароснижающей терапии. Эффективность излучателей было проверено у 50 больных сахарным диабетом. Из них I типом - 12 чел., II типом - 38 чел. Кроме основного заболевания больные страдали хроническими воспалительными заболеваниями: пиелонефрит, холецистит.

Для выявления диабетической нейропатии проводилась количественная оценка выраженности симптомов по нейропатическому симптоматическому счету /НСС/, разработанная 1993г. согласно которой общее количество баллов выше 5 является диагностическим критерием диабетической периферической нейропатии. Для оценки степени тяжести периферической полинейропатии проводился количественный расчет имеющихся расстройств тактильной, вибрационной, температурной и болевой чувствительности по модифицированной шкале НДС /нейропатический дисфункциональный счет/. НДС от 0 до 1 балла свидетельствовало об отсутствии либо наличии у пациента начальных признаков периферической сенсомоторной нейропатии, НДС от 2 до 46 умеренно выраженной нейропатии, НДС выше 5 баллов соответствовало выраженной периферической нейропатии. Подсчет НСС и НДС проводился до лечения и в конце цикла лечения.

У больных с сопутствующими воспалительными заболеваниями применение керамических излучателей давало положительные результаты в быстрые сроки, чем при обычной традиционной терапии.

При применении инфракрасных излучателей при полинейропатии, давало временный положительный эффект и субъективные ощущения улучшались, но объективные показатели по НДС не снижаются ниже 5 баллов, что говорит о сохраненности нейропатии

## Показатели НСС и НДС до лечения и после лечения

| Тип СД | НСС     |            | НДС     |            |
|--------|---------|------------|---------|------------|
|        | до леч. | после леч. | до леч. | после леч. |
| I тип  | 7,0     | 3,2        | 7,3     | 5,2        |
| II тип | 7,3     | 2,6        | 7,1     | 5,1        |

Таким образом, применение излучателей Инфра - Р вносит определенный вклад в изменение указанных видов чувствительности, что очевидно можно связать с кратковременным сосудорасширяющим эффектом, однако, данный эффект весьма кратковременный и не подтверждается статистически достоверными результатами.

Зав. каф. эндокринология

*Салахова*

проф. Салахова Н. С.