

# Содержание

<b>1</b>	<b>Вероятностное пространство</b>	<b>1</b>
1.1	Некоторые следствия аксиоматики . . . . .	2
1.1.1	Индикатор . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Условные вероятности и независимость</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Случайные величины</b>	<b>3</b>
3.1	Многомерные законы распределения . . . . .	4
3.2	Независимость случайных величин . . . . .	4
3.3	Случайные величины (общий случай) . . . . .	5

## 1 Вероятностное пространство

**Определение (Алгебра).** Семейство  $\mathcal{A}$  подмножеств множества  $\Omega$  называется алгеброй, если выполнены след. аксиомы:

1.  $\emptyset \in \mathcal{A}$
2.  $A \in \mathcal{A} \implies \bar{A} \in \mathcal{A}$
3. (аддитивность)  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \implies A_1 \cup \dots \cup A_n \in \mathcal{A}$

**Определение ( $\sigma$ -алгебра).** Алгебра называется  $\sigma$ -алгеброй, если

$$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}$$

**Определение (мера).**  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0; \infty)$  - мера, если

$$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}, A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j : \quad \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \quad \text{счетная аддитивность}$$

Мера конечная, если  $\mu(\Omega) < \infty$

Мера вероятностная, если  $\mu(\Omega) = 1$

**Определение (Вероятностное пространство).** Тройка  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ , где

1.  $\Omega$  - пространство элементарных событий;
2.  $\mathcal{A}$  -  $\sigma$ -алгебра подмножеств  $\Omega$  (события);
3.  $P$  - вероятностная счетно-аддитивная мера на  $\mathcal{A}$  (вероятность); называется вероятностным пространством.

Все элементарные исходы равновозможны

**Определение (Классическая вероятность).** Модель вероятностного пространства ( $A$  - событие)

1.  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$  - конечное пространство
2.  $\mathcal{A}$  все подмножества  $\Omega$
3.  $P(A) = \sum_{\omega \in A} p_{\omega} = \frac{|A|}{|\Omega|}$

**Определение (Геометрическая вероятность).**  $V \in \mathbb{R}^n$

1.  $\Omega = V$
2.  $\mathcal{A}$  - борелевская  $\sigma$ -алгебра (минимальная  $\sigma$ -алгебра, содержащая все компакты) подмножеств  $V$
3.  $P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(V)}$

## 1.1 Некоторые следствия аксиоматики

1.

**Аксиома** (Аксиома непрерывности). Если  $A_1 \supset A_2, \dots, \supset A_n \supset A, \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset$ , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$$

*Доказательство.* Пусть  $B_n \downarrow \emptyset$ . Тогда обозначим  $A_n = B_n \setminus B_{n+1}, n = 1, \dots, \dots A_n$  попарно несовместны и

$$B_1 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \quad B_n = \sum_{k=n}^{\infty} A_k,$$

поэтому из счетной аддитивности меры следует сходимость ряда

$$P(B_1) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n),$$

и сумма остатка ряда

$$P(B_n) = \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) = 0.$$

►

2. (Формула включений и исключений)

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{i < j}^n P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

*Доказательство.* Выводится через обычную формулу включений и исключений для множеств по индукции

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

+

$$\begin{cases} A \cup B = A + (B \setminus AB) \\ \text{Счетная аддитивность} \\ P(B \setminus AB) = P(B) - P(AB) \text{ (также по счетной аддитивности)} \end{cases}$$

►

### 1.1.1 Индикатор

**Определение.** Индикатор события  $A$  - это функция  $I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$

#### Свойства индикатора

1.  $I_{\bar{A}} = 1 - I_A$
2.  $I_{A_1 \cap A_2} = I_{A_1} I_{A_2}$
3.  $I_{A_1 \cup \dots \cup A_n} = 1 - I_{\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_n} = 1 - I_{\bar{A}_1} \dots I_{\bar{A}_n} = 1 - (1 - I_{A_1}) \dots (1 - I_{A_n})$

## 2 Условные вероятности и независимость

**Определение** (Условная вероятность). Пусть  $P(B) > 0$ . Условной вероятностью  $P(A|B)$  события  $A$  при условии, что произошло событие  $B$  (или просто: при условии  $B$ ), назовем отношение

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Применяется также обозначение  $P_B(A)$

**Теорема 2.1** (Теорема умножения). Пусть события  $A_1, \dots, A_n$  таковы, что  $P(A_1, \dots, A_{n-1}) > 0$ . Тогда

$$P(A_1, \dots, A_n) = P(A_1)P_{A_1}(A_2) \dots P_{A_1, \dots, A_{n-1}}(A_n)$$

*Доказательство.* Из условия теоремы вытекает, что существуют все условные вероятности из формулы.

База индукции  $P(AB) = P(B)P_B(A)$ .

Переход:  $B = A_1, \dots, A_{n-1}, A = A_n$ , применим формулу выше ►

**Определение** (Разбиение). Систему событий  $A_1, \dots, A_n$  будем называть конечным разбиением (в дальнейшем - просто разбиением), если они попарно несовместны и

$$A_1 + \dots + A_n = \Omega$$

**Теорема 2.2** (Формула полной вероятности). Если  $A_1, \dots, A_n$  - разбиение и все  $P(A_k) > 0$ , то для любого события  $B$  имеет место формула

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)$$

## 3 Случайные величины

**Определение** (Случайная величина). Случайной величиной (СВ)  $X(\omega)$  называется функция элементарного события  $\omega$  с областью определения  $\Omega$  и областью значений  $\mathbb{R}$  такая, что событие  $\{\omega : X(\omega) \leq x\}$  принадлежит  $\sigma$ -алгебре  $\mathcal{F}$  при любом действительном  $x \in \mathbb{R}$ . Значения  $x$  функции  $X(\omega)$  называются реализациями СВ  $X(\omega)$ .

**Определение** (Закон распределения). Любое правило (таблица, функция), позволяющее находить вероятности всех возможных событий, связанных со случайной величиной.

### Примеры законов распределения

1. Биномиальный закон
2. Гипергеометрическое распределение
3. Равномерное распределение

**Определение** (Математическое ожидание). Математическое ожидание случайной величины  $\xi = xi(\omega)$  обозначается  $M\xi$  и определяется как сумма

$$M\xi = \sum_{\omega \in \Omega} \xi(\omega)p(\omega)$$

### Свойства мат. ожидания

1.  $MI_A = P(A)$

*Доказательство.*

$$MI_A = \sum_{\omega \in \Omega} I_A(\omega)p(\omega) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) = P(A)$$
►

2. Аддитивность:  $M(\xi + \eta) = M\xi + M\eta$

*Доказательство.* ►

Из этого также следует конечная аддитивность.

3. Для любой константы  $C$

$$M(C\xi) = cM\xi, \quad MC = C$$

4. Математическое ожидание  $\xi$  выражается через закон распределения случайной величины  $\xi$  формулой

$$M\xi = \sum_{i=1}^k x_i P\{\xi = x_i\}$$

Подставляя в числовую функцию случайную величину, мы также получаем случайную величину. Например, если  $\eta = g(\xi)$ , то

$$M\eta = Mg(\xi) = \sum_{i=1}^k g(x_i) P\{\xi = x_i\}$$

При этом

$$g(x_i) = \sum_{i=1}^k g(x_i) I_{\xi=x_i}$$

**Определение** ( $n$ -ый момент случайной величины). Математическое ожидание  $M\xi^n$  называется  $n$ -ым моментом (или моментом  $n$ -ого порядка) случайной величины  $\xi$  (или ее закона распределения).

**Определение** (Абсолютный  $n$ -ый момент). Математическое ожидание  $M|\xi|^n$ .

**Определение** (Центральный момент  $n$ -ого порядка).  $M(\xi - M\xi)^n$

**Определение** (Абсолютный центральный момент  $n$ -ого порядка).  $M|\xi - M\xi|^n$

**Определение** (Дисперсия).  $D\xi = M(\xi - M\xi)^2$

**Определение** (Среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение)).  $\sqrt{D\xi}$

**Свойства дисперсии**

1.  $D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2$
2.  $D\xi \leq 0$  и  $D\xi = 0$  тогда и только тогда, когда существует такая константа  $c$ , что  $P\{\xi = c\} = 1$
3. Для любой константы  $c$   $D(c\xi) = c^2 D\xi$ ,  $D(\xi + c) = D\xi$

**Теорема 3.1** (Неравенство Иенсена). Если числовая функция  $g(x)$ , то для любой случайной величины  $\xi$

$$Mg(\xi) \leq g(M\xi)$$

**Теорема 3.2** (Неравенство Ляпунова). Для любых положительных  $\alpha \leq \beta$

$$(M|\xi|^\alpha)^{1/\alpha} \leq (M|\xi|^\beta)^{1/\beta}$$

**Теорема 3.3** (Неравенство Коши-Буняковского).

### 3.1 Многомерные законы распределения

### 3.2 Независимость случайных величин

**Определение** (Независимость случайных величин).  $\xi_1, \dots, \xi_n$  называются независимыми, если порожденные ими алгебры

$$\mathcal{A}_{\xi_1}, \dots, \mathcal{A}_{\xi_n}$$

независимы.

**Теорема 3.4** (Неравенство Чебышева). Для любого  $x > 0$  имеют место неравенства:

$$P\{|\xi| \geq x\} \leq \frac{M|\xi|}{x}$$

$$P\{|\xi - M\xi| \geq x\} \leq \frac{D\xi}{x^2}$$

### 3.3 Случайные величины (общий случай)

**Определение.** Числовая функция  $\xi = \xi(\omega)$  от элементарного события  $\omega \in \Omega$  называется случайной величиной, если для любого числа  $x$

**Определение** (Функция распределения случайной величины  $\xi$ ).

**Теорема 3.5** (Свойства функции распределения). *Функция распределения  $F(x)$*

**Определение** (Борелевская  $\sigma$ -алгебра).  $\sigma$ -алгебра  $\mathcal{A}$  числовых множеств, порожденная всевозможными интервалами вида  $x_1 < x \leq x_2$ , называется борелевской; множества  $A$ , входящие в  $\mathcal{A}$ , называются борелевскими.

#### Примеры дискретных распределений

1. Биномиальное
2. Пуассоновское
3. Геометрическое

**Теорема 3.6.** Если  $\xi$  - случайная величина, а  $g(x)$  - борелевская функция, то  $\eta = g(\xi)$  есть случайная величина