

# Содержание

<b>1</b>	<b>Теория булевых функций</b>	<b>1</b>
1.1	Определение булевой функции (БФ). Количество БФ от $n$ переменных. Таблица истинности БФ . . .	1
1.2	Булевы функции одной и двух переменных (их таблицы, названия) . . . . .	1
1.3	Формулы логики высказываний. Представление БФ формулами . . . . .	1
1.4	Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности теории булевых функций . . . . .	2
1.5	Тавтологически истинные (ложные) и выполнимые БФ . . . . .	3
1.6	ДНФ и КНФ, алгоритмы приведения . . . . .	3
1.7	СДНФ и СКНФ, теоремы существования и единственности, алгоритмы приведения . . . . .	4
1.8	Минимизация нормальных форм (карты Карно) . . . . .	5
1.9	Полином Жегалкина, его существование и единственность. Алгоритм построения . . . . .	5
1.10	Суперпозиция булевых функций. Замкнутые классы булевых функций . . . . .	5
1.11	Полные системы булевых функций, базисы . . . . .	5
1.12	Классы $T_0, T_1$ (функции, сохраняющие 0 и 1) . . . . .	5
1.13	Класс $S$ самодвойственных функций, определение двойственной БФ . . . . .	5
1.14	Класс монотонных функций . . . . .	6
1.15	Класс линейных функций . . . . .	6
1.16	Леммы о несамодвойственной, немонотонной, нелинейной функциях . . . . .	6
1.17	Теорема Поста о полноте системы булевых функций . . . . .	7
1.18	Релейно-контактные схемы: определение, примеры, функция проводимости. Анализ и синтез РКС (умение решать задачи) . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Логика высказываний</b>	<b>7</b>
2.1	Парадоксы в математике. Парадоксы Г. Кантора и Б. Рассела . . . . .	7
2.2	Логическое следование в логике высказываний. Проверка логического следования с помощью таблиц истинности и эквивалентных преобразований. . . . .	7
2.3	Понятия прямой теоремы, а также противоположной, обратной и обратной к противоположной теорем . . . . .	7
2.4	Понятия необходимых и достаточных условий . . . . .	7
2.5	Формальные системы. Выводы в формальных системах. Свойства выводов . . . . .	7
2.6	Исчисление высказываний (ИВ) Гильберта. Примеры выводов . . . . .	7
2.7	Теорема о дедукции для ИВ . . . . .	7
2.8	Теорема о полноте и непротиворечивости ИВ . . . . .	7
2.9	ИВ Генцена, его полнота . . . . .	7
2.10	Метод резолюций для логики высказываний (без обоснования корректности) . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Логика предикатов</b>	<b>7</b>
3.1	Понятие предиката и операции, их представления, примеры . . . . .	7
3.2	Сигнатура, интерпретация сигнатуры на множестве, алгебраические системы . . . . .	8
3.3	Язык логики предикатов, термы, формулы логики предикатов . . . . .	8
3.4	Свободные и связанные переменные. Замкнутые формулы . . . . .	8
3.5	Истинность формул на алгебраической системе . . . . .	8
3.6	Изоморфизм систем. Теорема о сохранении значений термов и формул в изоморфных системах. Автоморфизм . . . . .	10
3.7	Элементарная теория алгебраической системы. Элементарная эквивалентность систем. Связь понятий изоморфизма и элементарной эквивалентности . . . . .	10
3.8	Выразимость свойств в логике предикатов. Умение записать формулой различные свойства систем и элементов систем . . . . .	10
3.9	Эквивалентность формул логики предикатов . . . . .	10
3.10	Тавтологически истинные (ложные) и выполнимые формулы . . . . .	10
3.11	Пренексный вид формулы . . . . .	10
3.12	Основные эквивалентности логики предикатов . . . . .	10
3.13	Классы формул $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n$ . Соотношения между классами . . . . .	10
3.14	Нормальная форма Сколема, ее построение (на примерах) . . . . .	10
3.15	Проверка существования вывода методом резолюций (алгоритм) . . . . .	10
3.16	Логическое следование в логике предикатов . . . . .	10
3.17	Исчисление предикатов (ИП) Гильберта. Свойства выводов . . . . .	10
3.18	Теория. Модель теории . . . . .	10
3.19	Непротиворечивая теория. Полная теория. Свойства непротиворечивых и полных теорий . . . . .	10

3.20	Теорема о существовании модели (без доказательства)	10
3.21	Теорема о связи выводимости и противоречивости	10
3.22	Теоремы о корректности и полноте ИП	10
3.23	Теорема компактности	10
3.24	Аксиоматизируемые и конечно аксиоматизируемые классы. Конечно аксиоматизируемые теории	10
3.25	Обоснование нестандартного анализа (построение алгебраической системы, элементарно эквивалентной полю вещественных чисел, содержащей бесконечно малые элементы)	10
3.26	Метод резолюций для логики предикатов (без доказательства корректности)	10

## 1 Теория булевых функций

### 1.1 Определение булевой функции (БФ). Количество БФ от n переменных. Таблица истинности БФ

**Определение.** Булева функция от n переменных - это отображение  $\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$

*Замечание.* Количество БФ от n переменных -  $2^{2^n}$

*Доказательство.* Каждая булева функция определяется своим столбцом значений. Столбец является булевым вектором длины  $m = 2^n$ , где n - число аргументов функции. Число различных векторов длины m (а значит и число булевых функций, зависящих от n переменных) равно  $2^m = 2^{2^n}$  ►

### 1.2 Булевы функции одной и двух переменных (их таблицы, названия)

	x	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$f_4$	
Булевы функции одной переменной:	0	0	0	1	1	$f_1$ - тождественный 0, $f_2$ - тождественная функция, $f_3$
	1	0	1	0	1	

- отрицание ( $\neg$ ),  $f_4$  - тождественная 1

	x	y	0	$\wedge$	$\rightarrow'$	$x$	$\leftarrow'$	y	+	$\vee$	$\downarrow$	$\leftrightarrow$	$y'$	$\leftarrow$	$x'$	$\rightarrow$		1
Булевы функции двух переменных	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

1.  $\wedge$  - конъюнкция
2.  $\leftarrow$  - антиимпликация
3.  $\rightarrow$  - импликация
4.  $\vee$  - дизъюнкция
5.  $|$  - штрих Шеффера
6.  $\downarrow$  - стрелка Пирса
7.  $+$  - взаимоисключающее или, сложение по модулю 2 (XOR)

### 1.3 Формулы логики высказываний. Представление БФ формулами

**Определение.** Формула логики высказываний - слово алфавита логики высказываний, построенное по следующим правилам:

1. символ переменной - формула
2. символы 0 и 1 - формулы
3. если  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  - формулы, то слова  $(\Phi_1 \& \Phi_2)$ ,  $(\Phi_1 \leftrightarrow \Phi_2)$ ,  $(\Phi_1 \rightarrow \Phi_2)$ ,  $(\Phi_1 | \Phi_2)$ ,  $\dots$ ,  $\Phi_1'$  тоже формулы

Очевидно, что каждой формуле логики высказываний можно поставить в соответствие булеву функцию, причем если формуле  $F_1$  соответствует функция  $f_2$ , а формуле  $F_2$  функция  $f_2$  и  $F_1 \equiv F_2$ , то  $f_1 \equiv f_2$ .

Каждая формула  $\Phi(x_1, \dots, x_n)$  логики высказываний однозначно определяет некоторую булеву функцию  $f(x_1, \dots, x_n)$   
 Это булева функция, определенная таблицей истинности формулы  $\Phi$ .

## 1.4 Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности теории булевых функций

**Определение.** Формулы логики высказываний  $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$  и  $\Psi(x_1, x_2, \dots, x_n)$  эквивалентны, если для всех наборов значений  $a_1, \dots, a_n \in \{0, 1\}$   $\Phi(a_1, \dots, a_n) = 1 \Leftrightarrow \Psi(a_1, \dots, a_n) = 1$

**Теорема 1.1** (Об эквивалентных формулах). 1. Если  $\Phi(x_1, \dots, x_n) \equiv \Psi(x_1, \dots, x_n)$  и  $\theta_i(x_1, \dots, x_k)$ ,  $i = 1, \dots, n$ , - формулы логики высказываний, то  $\Phi(\theta_1, \dots, \theta_n) \equiv \Psi(\theta_1, \dots, \theta_n)$

2. Если в формуле  $\Phi$  заменить подформулу  $\Psi$  на эквивалентную формулу  $\Theta$ , то результат замены эквивалентен  $\Phi$ .

*Доказательство.* 1. После подстановки в  $\Phi(x_1, \dots, x_n)$  формул  $\theta_i(x_1, \dots, x_k)$  получим формулу от  $k$  переменных:

$$\Phi(\theta_1, \dots, \theta_n)(x_1, \dots, x_k) = \Phi(\theta_1(x_1, \dots, x_k), \dots, \theta_n(x_1, \dots, x_k))$$

и аналогично для  $\Psi$ . Выберем произвольный набор элементов  $a_1, \dots, a_k \in \{0, 1\}$  и подставим:

$$\Phi(\theta_1(a_1, \dots, a_k), \dots, \theta_n(a_1, \dots, a_k)) = \Phi(b_1, \dots, b_n), b_i = \theta_i(a_1, \dots, a_k),$$

$$\Psi(\theta_1(a_1, \dots, a_k), \dots, \theta_n(a_1, \dots, a_k)) = \Psi(b_1, \dots, b_n).$$

Т.к.  $\Phi \equiv \Psi$ ,  $\Phi(b_1, \dots, b_n) = 1 \Leftrightarrow \Psi(b_1, \dots, b_n) = 1$ , значит и  $\Phi(\theta_1, \dots, \theta_n)(a_1, \dots, a_k) = 1 \Leftrightarrow \Psi(\theta_1, \dots, \theta_n)(a_1, \dots, a_k)$ , т.е.  $\Phi(\theta_1, \dots, \theta_n) \equiv \Psi(\theta_1, \dots, \theta_n)$ .

2. По условию  $\Psi \equiv \Theta$ . Обозначим результат замены в формуле  $\Phi$  подформулы  $\Psi$  на  $\Theta$  через  $\Phi[\Psi/\Theta]$ .

Индукцию по числу логических связок в формуле  $\Phi$ . Пусть  $k$  - число связок в подформуле  $\Psi$ .

Заметим, что, если формула  $\Phi$  содержит менее  $k$  связок, то в ней нет подформулы  $\Psi$ . А если формула  $\Phi$  имеет ровно  $k$  связок, то единственный случай, когда она содержит подформулу  $\Psi$  - это  $\Phi = \Psi$

База индукции.

- (а) Формула  $\Phi$  содержит не более  $k$  связок и при этом  $\Phi \neq \Psi$ . Тогда  $\Phi$  не содержит подформулы  $\Psi$ , поэтому при данной операции не меняется:  $\Phi[\Psi/\Theta] = \Phi$ , отсюда  $\Phi[\Psi/\Theta] \equiv \Phi$
- (б) Формула  $\Phi$  содержит  $k$  связок и  $\Phi = \Psi$ . Тогда  $\Phi[\Psi/\Theta] = \Theta$  результат замены эквивалентен исходной формуле  $\Phi = \Psi$

Шаг индукции.

Рассмотрим формулу  $\Phi(x_1, \dots, x_n)$  содержащую  $m + 1$  связки, считая, что для формул из не более, чем  $m$  связок, утверждение доказано. Тогда  $\Phi$  имеет вид  $\Phi_1 \wedge \Phi_2, \Phi_1 \vee \Phi_2$  и т.д.

Рассмотрим случай конъюнкции(остальные аналогично). Выберем набор элементов  $a_1, \dots, a_n \in \{0, 1\}$  и подставим в формулы:

$$\Phi(a_1, \dots, a_n) = \Phi_1(a_1, \dots, a_n) \wedge \Phi_2(a_1, \dots, a_n),$$

$$\Phi[\Psi/\Theta](a_1, \dots, a_n) = \Phi_1[\Psi/\Theta](a_1, \dots, a_n) \wedge \Phi_2[\Psi/\Theta](a_1, \dots, a_n).$$

По индукционному допущению формулы  $\Phi_1 \equiv \Phi_1[\Psi/\Theta]$  аналогично для  $\Phi_2$  Поэтому

$$\Phi(a_1, \dots, a_n) = \Phi_1(a_1, \dots, a_n) \wedge \Phi_2(a_1, \dots, a_n),$$

$$\Phi[\Psi/\Theta](a_1, \dots, a_n) = \Phi_1[\Psi/\Theta](a_1, \dots, a_n) \wedge \Phi_2[\Psi/\Theta](a_1, \dots, a_n),$$

т.е.  $\Phi \equiv \Phi[\Psi/\Theta]$



**Теорема 1.2.** Справедливы следующие эквивалентности

- 1.  $a \vee b \equiv b \vee a$  **симметричность**
- 2.  $a \wedge b \equiv b \wedge a$
- 3.  $a \vee (b \vee c) \equiv (a \vee b) \vee c$  **ассоциативность**
- 4.  $a \wedge (b \wedge c) \equiv (a \wedge b) \wedge c$
- 5.  $a \wedge (b \vee c) \equiv a \wedge b \vee a \wedge c$  **транзитивность**
- 6.  $a \vee b \wedge c \equiv (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

7.  $a \vee a \equiv a$  *идемпотентность*
8.  $a \wedge a \equiv a$
9.  $\overline{(a \vee b)} \equiv \bar{a} \wedge \bar{b}$  *законы де Моргана*
10.  $\overline{(a \wedge b)} \equiv \bar{a} \vee \bar{b}$
11.  $\bar{\bar{a}} \equiv a$  *двойное отрицание*
12.  $a \vee a \wedge b \equiv a$  *поглощение*
13.  $a \wedge (a \vee b) \equiv a$
14.  $a \vee \bar{a} \wedge b \equiv a \vee b$  *слабое поглощение*
15.  $a \wedge (\bar{a} \vee b) \equiv ab$
16.  $a \vee 0 \equiv a$
17.  $a \wedge 0 \equiv 0$
18.  $a \vee 1 \equiv 1$
19.  $a \wedge 1 \equiv a$
20.  $a \vee \bar{a} \equiv 1$
21.  $a\bar{a} \equiv 0$
22.  $a \rightarrow b \equiv \bar{a} \vee b$
23.  $a \leftrightarrow b \equiv \bar{a} \wedge \bar{b} \vee a \wedge b \equiv (a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a)$
24.  $a + b \equiv \overline{a \leftrightarrow b} \equiv \bar{a} \wedge b \vee a \wedge \bar{b}$
25.  $a|b \equiv a \wedge \bar{b}$
26.  $a \downarrow b \equiv \overline{a \vee b}$

*Доказательство.* Доказательство сводится к построению таблиц истинности для левой и правой частей каждой эквивалентности ►

## 1.5 Тавтологично истинные (ложные) и выполнимые БФ

**Определение.** Формула  $\Phi(x_1, \dots, x_n)$  называется тавтологично истинной (ложной), если для любого набора значений  $\Phi(x_1, \dots, x_n) = 1(0)$

**Определение.** Формула  $\Phi(x_1, \dots, x_n)$  называется выполнимой, если существует набор значений, для которого  $\Phi(x_1, \dots, x_n) = 1$

## 1.6 ДНФ и КНФ, алгоритмы приведения

**Определение.** Литера - это переменная или отрицание переменной

**Определение.** Конъюнкт(элементарная конъюнкция) - это либо литера, либо конъюнкция литер

**Определение.** Дизъюнктивная нормальная форма(ДНФ) - это либо конъюнкт, либо дизъюнкция конъюнктов

**Определение.** Дизъюнкт(элементарная дизъюнкция) - это либо литера, либо дизъюнкция литер

**Определение.** Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) - это либо дизъюнкт, либо конъюнкция дизъюнктов

*Замечание.* Алгоритм построения ДНФ(КНФ) по заданной ТИ

1. Выбрать в таблице все строки со значением функции  $f = 1$  ( $f = 0$ )
2. Для каждой такой строки  $(x, y, z) = (a_1, a_2, a_3)$  выписать конъюнкт(дизъюнкт) по принципу: пишем переменную с отрицанием, если ее значение 0(1), иначе пишем переменную без отрицания.

3. берем дизъюнкцию(конъюнкцию) построенных конъюнктов(дизъюнктов)

*Замечание.* Алгоритм приведения формулы к ДНФ/КНФ методом эквивалентностей

1. Выразить все связи в формуле через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание.
2. Внести все отрицания внутрь скобок
3. Устранить двойные отрицания
4. Применять свойство дистрибутивности, пока это возможно

## 1.7 СДНФ и СКНФ, теоремы существования и единственности, алгоритмы приведения

**Определение.** Совершенный конъюнкт от переменных  $x_1, \dots, x_n$  - это конъюнкт вида  $x_1^{a_1} \wedge \dots \wedge x_n^{a_n}$ , где  $(a_1, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n$ .

**Определение.** Совершенный дизъюнкт от переменных  $x_1, \dots, x_n$  - это конъюнкт вида  $x_1^{a_1} \vee \dots \vee x_n^{a_n}$ , где  $(a_1, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n$ .

*Замечание.*

$$x^a = \begin{cases} \bar{x} & \text{если } a = 0, \\ x & \text{если } a = 1. \end{cases}$$

**Определение.** Совершенная дизъюнктивная нормальная форма(СДНФ) от переменных  $x_1, \dots, x_n$  - это дизъюнкция совершенных конъюнктов от  $x_1, \dots, x_n$ , в которой нет попарно эквивалентных слагаемых

**Определение.** Совершенная конъюнктивная нормальная форма(СКНФ) от переменных  $x_1, \dots, x_n$  - это конъюнкция совершенных дизъюнктов от  $x_1, \dots, x_n$ , в которой нет попарно эквивалентных слагаемых.

**Теорема 1.3** (о существовании и единственности СДНФ). *Любая булева функция  $f(x_1, \dots, x_n) \neq 0$  определяется формулой, находящейся в СЛНФ, причем эта СДНФ единственная с точностью до перестановок слагаемых и множителей в слагаемых*

*Доказательство.* 1. Существование. По следствию к теореме о разложении получаем для  $f(x_1, \dots, x_n) \neq 0$

$$f = \bigvee_{\substack{(a_1, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n \\ f(a_1, \dots, a_n) = 1}} x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$$

2. Единственность. Пусть, у функции  $f(x_1, \dots, x_n) \neq 0$  две СДНФ, обозначим их  $\Phi$  и  $\Psi$ . Так как они определяют одну и ту же функцию, то  $\Phi \equiv \Psi$

Выберем в  $\Phi$  произвольное слагаемое  $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$ . По лемме о совершенных конъюнктах это слагаемое истинно при  $(x_1, \dots, x_n) = (a_1, \dots, a_n)$ . Тогда и вся дизъюнкция  $\Phi(a_1, \dots, a_n) = 1$ , а в силу эквивалентности формул и  $\Psi(a_1, \dots, a_n) = 1$

Но тогда в  $\Psi$  есть слагаемое  $x_1^{b_1} \dots x_n^{b_n}$ , истинное на наборе  $(a_1, \dots, a_n)$ . Снова по лемме это возможно только при  $(a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n)$ .

Получаем, что все слагаемые СДНФ  $\Phi$  есть в  $\Psi$ . Рассуждая симметрично, получаем, что и  $\Psi$  содержится в  $\Phi$ , т.е. они равны

►

*Замечание.* Лемма о совершенных конъюнктах

- 1) Пусть  $\Phi(x_1, \dots, x_n) = x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$  - совершенный конъюнкт. Тогда для любого набора значений  $(b_1, \dots, b_n) \in \{0, 1\}^n$

$$\Phi(b_1, \dots, b_n) = 1 \leftrightarrow (b_1, \dots, b_n) = (a_1, \dots, a_n).$$

- 2) Два совершенных конъюнкта от переменных  $x_1, \dots, x_n$  эквивалентны тогда и только тогда, когда они равны с точностью до перестановки литер.

*Замечание.* Рассуждая двойственным образом можно получить теорему о СКНФ

*Замечание.* Алгоритм приведения формулы к СДНФ(СКНФ)

1. Строим ДНФ(КНФ) формулы.

2. Вычеркиваем тождественно ложные(истинные) слагаемые(множители).

3. В каждое слагаемое(множитель) добавляем переменные по правилам:

$$\text{СДНФ: } \Phi(x_1, \dots, x_n) \equiv \Phi(y \vee \bar{y}) \equiv \Phi \wedge y \vee \Phi \wedge \bar{y}$$

$$\text{СКНФ: } \Phi(x_1, \dots, x_n) \equiv \Phi \vee y \wedge \bar{y} \equiv (\Phi \vee y) \wedge (\Phi \vee \bar{y})$$

4. Вычеркиваем повторяющиеся слагаемые(множители).

## 1.8 Минимизация нормальных форм (карты Карно)

## 1.9 Полином Жегалкина, его существование и единственность. Алгоритм построения

## 1.10 Суперпозиция булевых функций. Замкнутые классы булевых функций

## 1.11 Полные системы булевых функций, базисы

## 1.12 Классы $T_0, T_1$ (функции, сохраняющие 0 и 1)

**Определение.** Класс  $T_0 = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(0, \dots, 0) = 0\}$

**Определение.** Класс  $T_1 = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(1, \dots, 1) = 1\}$

	$T_0$	$T_1$	S	M	L
0	+	-	-	+	+
1	-	+	-	+	+
x	+	+	-	+	+
$\neg x$	-	-	+	-	+
$xy$	+	+	-	+	-
$x \vee y$	+	+	-	+	-
$x \oplus y$	+	-	-	-	+
$x \leftrightarrow y$	-	+	-	-	+
$x \rightarrow y$	-	+	-	-	-
$x y$	-	-	-	-	-
$x \downarrow y$	-	-	-	-	-

*Замечание.* Классы  $T_0, T_1$  являются замкнутыми.

*Доказательство.* Докажем для  $T_0$ . Достаточно взять булевы функции  $g, g_1, \dots, g_n \in T_0$  и доказать, что их суперпозиция из класса  $T_0$ .

$$g(g_1(0, \dots, 0), \dots, g_n(0, \dots, 0)) = g(0, \dots, 0) = 0$$

►

## 1.13 Класс S самодвойственных функций, определение двойственной БФ

**Определение.** Булева функция  $g(x_1, \dots, x_n)$  называется двойственной к БФ  $f(x_1, \dots, x_n)$  (обозначается  $g = f^*$ ), если  $g(x_1, \dots, x_n) = f'(x'_1, \dots, x'_n)$ .

Из закона двойного отрицания следует, что  $(f^*)^* = f$

**Определение.** Булева функция  $f$  называется самодвойственной, если  $f = f^*$ .

**Определение.** Класс самодвойственных функций  $= \{f \mid f = f^*\}$

*Замечание.* Класс S является замкнутым.

*Доказательство.* Возьмем БФ  $g, g_1, \dots, g_k \in S$  и докажем, что их суперпозиция будет также из класса S.

Если  $F(x_1, \dots, x_n) = g(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, \dots, x_n))$ ,

то  $F^*(x_1, \dots, x_n) = \neg F(\neg x_1, \dots, \neg x_n) = \neg g(g_1(\neg x_1, \dots, \neg x_n), \dots, g_k(\neg x_1, \dots, \neg x_n))$ .

Так как  $g_i \in S$ , то  $g_i(x_1, \dots, x_n) = \neg g_i(\neg x_1, \dots, \neg x_n)$ , что эквивалентно  $\neg g_i(x_1, \dots, x_n) = g_i(\neg x_1, \dots, \neg x_n)$ . Следовательно,  $F^*(x_1, \dots, x_n) = \neg g(\neg g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \neg g_k(x_1, \dots, x_n))$ .

Так как  $g \in S$ , то  $\neg g(\neg g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \neg g_k(x_1, \dots, x_n)) = g(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, \dots, x_n)) \implies f^*(x_1, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_n)$

►

## 1.14 Класс монотонных функций

**Определение.** Назовем два набора из 0 и 1  $a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n)$  **соседними**, если все их координаты (кроме одной) совпадают.

**Определение.** Пусть  $k$  - номер единственной координаты, по которой отличаются соседние наборы  $a, b$ . Если  $a_k = 0, b_k = 1$ , то мы будем говорить, что набор  $a$  **меньше** набора  $b$  ( $a \prec b$ )

**Определение** (Монотонная функция). БФ  $f(x_1, \dots, x_n)$  называется монотонной, если  $\forall$  соседних наборов  $a, b$  таких, что  $a \prec b \implies f(a) \leq f(b)$

*Замечание.* Класс  $M$  является замкнутым.

*Доказательство.*  $g, g_1, \dots, g_k \in M, F(x_1, \dots, x_n) = g(g_1, \dots, g_k)$  и рассмотрим два произвольных набора  $a \prec b$ . Пусть  $c_1 = g_1(a), d_1 = g_1(b), \dots, c_k = g_k(a), \dots, d_k = g_k(b)$

$$g_i \in M \implies c_i \leq d_i$$

Если наборы  $c = (c_1, \dots, c_k)$  и  $d = (d_1, \dots, d_k)$  - соседние, то и  $F(c) \leq F(d)$

В противном случае легко показать, что  $\exists$  цепочка

$$c \prec e_1 \prec \dots \prec e_l \prec d$$

(то есть наши наборы сравнимы по определению Ашаева)

$$\text{и } g(c) \leq g(d) \implies F(c) \leq F(d) \implies F \in M$$

►

## 1.15 Класс линейных функций

### 1.16 Леммы о несамодвойственной, немонотонной, нелинейной функциях

**Лемма 1.1** (о несамодвойственной функции). Если БФ  $f(x_1, \dots, x_n)$  несамодвойственна, то замыкание класса  $[f, \neg x]$  содержит тождественно ложную БФ 0 и тождественно истинную БФ 1.

*Доказательство.* Так как  $f$  несамодвойственна, то существует набор  $a_1, \dots, a_n$  значений аргументов такой, что  $f(a_1, \dots, a_n) \neq \neg f(\neg a_1, \dots, \neg a_n)$

Так как БФ принимают только значения 0 и 1, то  $f(a_1, \dots, a_n) = f(\neg a_1, \dots, \neg a_n)$

Составим функцию  $g(x) = f(x^{a_1}, \dots, x^{a_n})$ , где

$$x^a = \begin{cases} x & \text{если } a = 1 \\ \neg x & \text{если } a = 0 \end{cases}$$

Очевидно, что  $g \in [f, \neg x]$ , так как является их суперпозицией.

$$g(0) = f(0^{a_1}, \dots, 0^{a_n}) = f(\neg a_1, \dots, \neg a_n), g(1) = f(1^{a_1}, \dots, 1^{a_n}) = f(a_1, \dots, a_n),$$

$g(0) = g(1)$  -  $g$  - константа,  $g$  и  $\neg g$  принимают значения 0 и 1 чтд.

►

**Лемма 1.2** (О немонотонной функции). Если  $f(x_1, \dots, x_n)$  немонотонна, то  $x' \in [f, 0, 1]$

*Доказательство.* Из немонотонности  $f$  следует существование двух соседних наборов  $a = (a_1, \dots, a_n) \prec (b_1, \dots, b_n) = b$  такие, что  $f(a) > f(b)$ . Б.О.О считаем, что они отличаются только в первой координате

$$a_1 = 0$$

$$b_1 = 1$$

$$a_i = b_i$$

$$\angle g(x, a_2, \dots, a_n) \in [f, 0, 1]$$

$$g(0) = f(a) = 1, g(1) = f(b) = 0 \implies g \equiv x'$$

►

**Лемма 1.3** (О нелинейной функции).  $f(x_1, \dots, x_n) \notin L \implies xy \in [f, 0, 1, x']$

*Доказательство.*  $f(x_1, \dots, x_n) \notin L \implies$  полином Жегалкина функции  $f$  содержит конъюнкцию двух переменных  $x_1$  и  $x_2$

$$\implies f(x_1, \dots, x_n) = x_1 x_2 h_{12}(x_3, \dots, x_n) + x_1 h_1(x_3, \dots, x_n) + h_0(x_3, \dots, x_n)$$

$$f \notin L \implies h_{12} \neq 0 \implies \exists (a_3, \dots, a_n) h_{12}(a_3, \dots, a_n) = 1$$

Подставим этот набор в ПЖ  $f$ :

$$g(x_1, x_2) = f(x_1, x_2, a_3, \dots, a_n) = x_1 x_2 h_{12}(a_3, \dots, a_n) + x_1 h_1(a_3, \dots, a_n) + h_0(a_3, \dots, a_n)$$

$$h_i \in \{0, 1\} \implies \exists 8 \text{ вариантов того, как выглядит полином Жегалкина}$$

1. Система функций  $[g, \neg, 0, 1]$  полна и содержит конъюнкцию

2.  $g$  - конъюнкция

3.  $xy = g(x, y') \vee xy = g(x', y) \implies xy \in \text{замыкание}$

Т.к  $g$  выражается через  $f(x_1, \dots, x_n), 0, 1$ , то конъюнкция также лежит в замыкании  $[f, \neg, 0, 1]$



### 1.17 Теорема Поста о полноте системы булевых функций

1.18 Релейно-контактные схемы: определение, примеры, функция проводимости. Анализ и синтез РКС (умение решать задачи)

## 2 Логика высказываний

2.1 Парадоксы в математике. Парадоксы Г. Кантора и Б. Рассела

2.2 Логическое следование в логике высказываний. Проверка логического следования с помощью таблиц истинности и эквивалентных преобразований.

2.3 Понятия прямой теоремы, а также противоположной, обратной и обратной к противоположной теорем

2.4 Понятия необходимых и достаточных условий

2.5 Формальные системы. Выводы в формальных системах. Свойства выводов

2.6 Исчисление высказываний (ИВ) Гильберта. Примеры выводов

2.7 Теорема о дедукции для ИВ

2.8 Теорема о полноте и непротиворечивости ИВ

2.9 ИВ Генцена, его полнота

2.10 Метод резолюций для логики высказываний (без обоснования корректности)

## 3 Логика предикатов

3.1 Понятие предиката и операции, их представления, примеры

**Определение.**  $n$ -местный предикат на множестве  $A$  - это отображение вида  $P : A^n \rightarrow \{0, 1\}$

**Определение.**  $n$ -местная операция на множестве  $A$  - это отображение вида  $f : A^n \rightarrow A$

Предикат можно задать как множество тех аргументов, на которых он является истинным

**Пример.**  $P = \{1, 3\} : P = 1 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = 3$

**Пример.**  $Q = \{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$

Способы задания:

1. описательный

2. множество (отношения)

3. таблица (истинности)

4. графы

для предиката  $P(x, y)$  ребро  $(x, y)$  обозначает  $P(x, y) = 1$

для операции  $f(x)$  дуга  $(x, y)$  обозначает  $y = f(x)$



### 3.2 Сигнатура, интерпретация сигнатуры на множестве, алгебраические системы

**Определение.** Сигнатура - набор предикатных, функциональных и константных символов с указанием местностей

**Пример.**  $\sigma = \{P^{(1)}, Q^{(2)}, f^{(1)}, g^{(2)}, c\}$

**Определение.** Две сигнатуры считаем *равными*, если в них одинаковое кол-во символов каждого сорта и местности соответствующих символов равны

**Определение.** Интерпретация сигнатуры  $\sigma$  на множестве  $A$  - это отображение, которое

1. каждому  $n$ -местному предикатному символу  $P^{(n)} \in \sigma$  сопоставляет  $n$ -местный предикат на  $A$
2. каждому  $n$ -местному функциональному символу  $f^{(n)} \in \sigma$  сопоставляет  $n$ -местную операцию на  $A$
3. каждому константному символу сопоставляет элемент множества  $A$

**Определение.** Алгебраическая система - набор, состоящий из множества  $A$ , сигнатуры  $\sigma$  и интерпретации  $\sigma$  на  $A$ . Множество  $A$  называют основным множеством системы ( $\mathbf{a} = \langle A, \sigma \rangle$ )

### 3.3 Язык логики предикатов, термы, формулы логики предикатов

Зафиксируем сигнатуру  $\sigma$ . Алфавит логики предикатов сигнатуры  $\sigma$  — это множество

$$\sigma_{\text{ЛПП}} = \sigma \cup \{x_1, x_2, \dots, \&, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, \forall, \exists, (, ), =, ,\}$$

**Определение.** Терм - слово алфавита логики предикатов, построенное по правилам:

1. символ переменной - терм
2. константный символ - терм
3. если  $t_1, \dots, t_n$  - термы,  $f^{(n)} \in \sigma$ , то и  $f(t_1, \dots, t_n)$  - терм

**Определение.** Атомарная формула сигнатуры  $\sigma$  - это слово одного из двух видов:

1.  $t_1 = t_2$ , где  $t_1, t_2$  - термы
2. предикат  $P(t_1, \dots, t_n)$ ,  $P^{(n)} \in \sigma$ ,  $t_1, \dots, t_n$  - термы

**Определение.** Формула ЛП сигнатуры  $\sigma$  - слово, построенное по правилам:

1. атомарная формула - формула
2. если  $\phi_1$  и  $\phi_2$  - формулы, то слова  $(\phi_1 \& \phi_2)$ ,  $(\phi_1 \vee \phi_2)$ ,  $(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2)$ ,  $(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ ,  $\neg \phi_1$  тоже формулы
3. если  $\phi$  - формула, то слова  $(\forall x \phi)$  и  $(\exists x \phi)$  тоже формулы

### 3.4 Свободные и связанные переменные. Замкнутые формулы

**Определение.** Вхождение переменной  $x$  в формулу  $\phi$  **связанное**, если  $x$  попадает в область действия квантора  $\exists x / \forall x$ , в противном случае вхождение  $x$  **свободное**

**Определение.** Переменная  $x$  **свободна** в формуле  $\phi$ , если есть хотя бы одно свободное вхождение  $x$  в  $\phi$ , в противном случае она **связанная**

**Определение.** Формула замкнутая, если она не содержит свободных переменных.

### 3.5 Истинность формул на алгебраической системе

Каждый терм  $t(x_1, \dots, x_n)$  определяет в системе  $\mathbf{a}$  функцию  $t_{\mathbf{a}} : A^n \rightarrow A$  следующим образом: в терме все функциональные и константные символы заменяются на их интерпретации в системе  $A$ , после чего вычисляется полученная суперпозиция от входных аргументов.

Пусть также  $\phi(x_1, \dots, x_n)$  — формула со свободными переменными  $x_1, \dots, x_n$ . Определим понятие истинности формулы  $\phi$  на наборе элементов  $a_1, \dots, a_n \in \mathbf{a}$  в алгебраической системе  $\mathbf{a}$  (обозначение:  $\mathbf{a} \models \phi(a_1, \dots, a_n)$ ) следующим образом.

**Определение.** 1. Пусть  $\phi$  имеет вид  $t_1 = t_2$ . Тогда  $A \models \phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow t_{1A}(a_1, \dots, a_n) = t_{2A}(a_1, \dots, a_n)$  (здесь  $t_{iA}$  — функция, определяемая термом  $t_i$  в системе  $A$ ).

2. Пусть  $\phi$  имеет вид  $P(t_1, \dots, t_k)$ . Тогда  $A \models \phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow P_A(t_{1A}(a_1, \dots, a_n), \dots, t_{kA}(a_1, \dots, a_n)) = 1$ , где  $P_A$  — интерпретация предикатного символа  $P$  в системе  $A$ .
3. Пусть  $\phi$  имеет вид  $(\phi_1 \& \phi_2), (\phi_1 \vee \phi_2), (\phi_1 \rightarrow \phi_2), (\phi_1 \leftrightarrow \phi_2), \neg \phi_1$ . Тогда истинность формулы  $\phi$  определяется по значениям  $\phi_1(a_1, \dots, a_n)$  и  $\phi_2(a_1, \dots, a_n)$  по таблицам истинности логических связок.
4. Пусть  $\phi(x_1 \dots, x_n)$  имеет вид  $(\forall x \phi(x, x_1, \dots, x_n))$ . Тогда  $A \models \phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow$  для всех элементов  $b \in A$  выполнено  $A \models \phi(b, a_1, \dots, a_n)$ .
5. Пусть  $\phi(x_1 \dots, x_n)$  имеет вид  $(\exists x \phi(x, x_1, \dots, x_n))$ . Тогда  $A \models \phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow$  для некоторого элемента  $b \in A$  выполнено  $A \models \phi(b, a_1, \dots, a_n)$ .

**Определение.** Формула  $\phi(x_1, \dots, x_n)$  сигнатуры  $\sigma$  тождественно истинная (ложна) в алгебраической системе  $A = \langle A, \sigma \rangle$ , если для всех наборов элементов  $a_1 \dots a_n \in A$  выполнено  $A \models \phi(a_1 \dots a_n)$  ( $A \not\models \phi(a_1 \dots a_n)$ ).

**Определение.** Формула  $\phi(x_1, \dots, x_n)$  выполнима в алгебраической системе  $A = \langle A, \sigma \rangle$ , если для хотя бы одного набора элементов  $a_1 \dots a_n \in A$  выполнено  $A \models \phi(a_1 \dots a_n)$ .

**Определение.** Формула  $\phi$  сигнатуры  $\sigma$  тождественно истинная (ложна), если  $\phi$  тождественно истинна (ложна) во всех алгебраических системах сигнатуры  $\sigma$ .

**Определение.** Формула  $\phi$  сигнатуры  $\sigma$  выполнима, если  $\phi$  выполнима хотя бы в одной алгебраической системе сигнатуры  $\sigma$ .

- 3.6 Изоморфизм систем. Теорема о сохранении значений термов и формул в изоморфных системах. Автоморфизм
- 3.7 Элементарная теория алгебраической системы. Элементарная эквивалентность систем. Связь понятий изоморфизма и элементарной эквивалентности
- 3.8 Выразимость свойств в логике предикатов. Умение записать формулой различные свойства систем и элементов систем
- 3.9 Эквивалентность формул логики предикатов
- 3.10 Тождественно истинные (ложные) и выполнимые формулы
- 3.11 Пренексный вид формулы
- 3.12 Основные эквивалентности логики предикатов
- 3.13 Классы формул  $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n$ . Соотношения между классами
- 3.14 Нормальная форма Сколема, ее построение (на примерах)
- 3.15 Проверка существования вывода методом резолюций (алгоритм)
- 3.16 Логическое следование в логике предикатов
- 3.17 Исчисление предикатов (ИП) Гильберта. Свойства выводов
- 3.18 Теория. Модель теории
- 3.19 Непротиворечивая теория. Полная теория. Свойства непротиворечивых и полных теорий
- 3.20 Теорема о существовании модели (без доказательства)
- 3.21 Теорема о связи выводимости и противоречивости
- 3.22 Теоремы о корректности и полноте ИП
- 3.23 Теорема компактности
- 3.24 Аксиоматизируемые и конечно аксиоматизируемые классы. Конечно аксиоматизируемые теории
- 3.25 Обоснование нестандартного анализа (построение алгебраической системы, элементарно эквивалентной полю вещественных чисел, содержащей бесконечно малые элементы)
- 3.26 Метод резолюций для логики предикатов (без доказательства корректности)