





Họ tên học sinh:Lớp: 11A ...

Câu 1(2đ): Lập các phương trình hoá học sau (cân bằng phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron (nếu có):



Câu 2(2đ): Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và dạng ion thu gọn:



Câu 3(2đ): Cho các lọ mất nhãn sau: $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, NH_4Cl , AgNO_3 , FeCl_3 , NaOH . Không được dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nêu cách phân biệt chất đựng trong mỗi lọ. (Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã được dùng để nhận biết).

Câu 4(2đ): Nhiệt phân hoàn toàn 2,87 gam $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ khan đến hoàn toàn. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.

Câu 5(2đ): Hòa tan hoàn toàn 6,4g hỗn hợp gồm bột Mg và CuO trong 150 ml dung dịch HNO_3 thu được 2,24 lít NO_2 (đktc). Tính nồng độ mol/lit của dung dịch HNO_3 .

(cho : Ca = 40, Cu = 64, O = 16, Mg = 24, N = 14)