


BÀI 27. LƯU HUỖNH

Bài 1: Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng :



Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là

A. 1 : 2.

B. 1 : 3.

C. 3 : 1.

D. 2 : 1.

Bài 2 trang 132: Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. Cl_2 , O_3 , S.

B. S, Cl_2 , Br_2 .

C. Na, F_2 , S.

D. Br_2 , O_2 , Ca.

Bài 3 : Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về khối lượng riêng, về nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà (S β) dài ngày ở nhiệt độ phòng ?

Bài 4 : Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm và 0,224 g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng, người ta thu được chất nào trong ống nghiệm ? Khối lượng là bao nhiêu ?

Bài 5: 1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu, theo :

– Lượng chất.

– Khối lượng chất.