

# Best answer with Matrix: Moore-Penrose Pseudo-inverse 行列で最善の解: ムーアペンローズ疑似逆行列

ryamada

2016年12月27日

- 1 連立方程式の解と最小二乗法による線形回帰
- 2 連立方程式でも線形回帰でもない場合
- 3 Exercise 1
  - 3.1 Exercise 1-1
  - 3.2 Exercise 1-2
  - 3.3 Exercise 1-3
  - 3.4 Exercise 1-4
  - 3.5 Exercise 1-5
  - 3.6 Exercise 1-6
  - 3.7 Exercise 1-7
  - 3.8 Exercise 1-8

## 1 連立方程式の解と最小二乗法による線形回帰

変数の数と等式の数が一致しているとき、うまく逆行列が取れば

$$y = Xa$$

はきっちりと解けて $a$ が一意に求まる。

その際、

$$a = X^{-1}y = (X^T X)^{-1} X^T y$$

であった。

線形回帰の場合は、サンプルの数(ベクトル $y$ の長さ: $n$ とする)に対して、説明変数の数 $X$ の列数( $m$ とする)が小さいので

$$y \sim Xa$$

として、

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

が最小になるような $a$ を推定するわけだが、そのとき

$$a = (X^T X)^{-1} X^T y$$

で求まるのだった。

結局、行列 $X$ の列数によらず、 $a$ について、「これが一番」という答えが

$$a = (X^T X)^{-1} X^T y$$

で求まる。

ここで、「これが一番」というのは、最小二乗が0であったり、「かっちり連立方程式が解ける」ということだったりした。

## 2 連立方程式でも線形回帰でもない場合

行列 $X$ の行数 $n$ ,列数 $m$ について

- $n = m$ の場合: 連立方程式を解く
- $n > m$ の場合: 線形回帰をする

だった。

網羅されていないのは

- $n < m$  の場合である

この場合にも、うまく行く方法があり、これをムーアペンローズ疑似逆行列と読んだり、一般化逆行列と読んだり、疑似逆行列と呼んだりする。

$n < m$  の場合には、 $(X^T X)^{-1}$  がうまく計算されないので、別の式を用いる。

$X$  の行数が列数より小さい場合には、転置して考える。転置 ( $X' = X^T$ ) すると、そのムーアペンローズ疑似逆行列は、 $(X'^T X')^{-1} X'^T$  と計算できるので、それを再度転置すればうまく行く ( $((X'^T X')^{-1} X'^T)^T$ )。

結局、覚えるべきは

- $n \geq m$  のときは  $gen. inv(X) = (X^T X)^{-1} X^T$
- $n < m$  のときは、 $X_{gen.inv} = (gen. inv(X^T))^T$

$n < m$  の場合を  $X^T (X^T X)^{-1}$  と書くこともある。

```
n <- 3
m <- 2 # m < n
X <- matrix(rnorm(n*m), nrow=n)
solve(t(X) %*% X) %*% t(X)
```

```
##           [, 1]      [, 2]      [, 3]
## [1, ]  1.347294 -2.0673768  0.2431391
## [2, ]  1.180096 -0.7110244  0.1672885
```

```
n <- 3
m <- 3 # m = n
X <- matrix(rnorm(n*m), nrow=n)
solve(t(X) %*% X) %*% t(X)
```

```
##           [, 1]      [, 2]      [, 3]
## [1, ]  1.860546  0.5413008 -1.1951049
## [2, ] -2.003575 -0.2372205  0.4930090
## [3, ]  2.890075  1.1240450 -0.8753272
```

```
n <- 2
m <- 3
X <- matrix(rnorm(n*m), nrow=n)
# solve(t(X) %*% X) %*% t(X) # Error
tX <- t(X)
t(solve(t(tX) %*% tX) %*% t(tX))
```

```
##           [, 1]      [, 2]
## [1, ]  0.5906884  0.01287776
## [2, ]  0.4153723  0.01793991
## [3, ] -0.1167761 -0.56387476
```

```
t(X) %*% solve(X %*% t(X))
```

```
##           [, 1]      [, 2]
## [1, ]  0.5906884  0.01287776
## [2, ]  0.4153723  0.01793991
## [3, ] -0.1167761 -0.56387476
```

Rでは、MASS パッケージに `ginv()` 関数があり、 $X$  の行数・列数に関係なく、ムーアペンローズ疑似逆行列を算出できる。

任意の行列を次のように分解することを特異値分解と言うが

$$X = U \Sigma V^T$$

ムーアペンローズ疑似逆行列は

$$gen. inv(X) = V \Sigma^+ U^T$$

で与えられる。ただし $\Sigma$ は対角成分に特異値を持つ行列であり、 $\Sigma^+$ は特異値の逆数を対角成分に持つ。

実際、Rではこれを利用して、MASSパッケージのginv()関数(g:generalized, inv:inverse)がXの行数・列数を場合分けすることなく、ムーアペンローズ疑似逆行列を返す。

```
library(MASS)
n <- 3
m <- 2 # m < n
X <- matrix(rnorm(n*m), nrow=n)
solve(t(X)%*%X)%*%t(X)
```

```
##           [, 1]      [, 2]      [, 3]
## [1, ] -0.65929868  1.432681 -0.3101911
## [2, ] -0.08738356 -0.806935  0.4711483
```

```
ginv(X)
```

```
##           [, 1]      [, 2]      [, 3]
## [1, ] -0.65929868  1.432681 -0.3101911
## [2, ] -0.08738356 -0.806935  0.4711483
```

```
n <- 3
m <- 3
X <- matrix(rnorm(n*m), nrow=n)
solve(t(X)%*%X)%*%t(X)
```

```
##           [, 1]      [, 2]      [, 3]
## [1, ] -25.51992 -7.142307 -12.741628
## [2, ]  15.32677  3.927049  8.075916
## [3, ] -23.13079 -6.570553 -12.417258
```

```
ginv(X)
```

```
##           [, 1]      [, 2]      [, 3]
## [1, ] -25.51992 -7.142307 -12.741628
## [2, ]  15.32677  3.927049  8.075916
## [3, ] -23.13079 -6.570553 -12.417258
```

```
n <- 2
m <- 3
X <- matrix(rnorm(n*m), nrow=n)
tX <- t(X)
t(solve(t(tX)%*%tX)%*%t(tX))
```

```
##           [, 1]      [, 2]
## [1, ] -1.3768647  0.3987604
## [2, ] -1.4370526  1.6462194
## [3, ]  0.5656033  1.2149662
```

```
ginv(X)
```

```
##           [, 1]      [, 2]
## [1, ] -1.3768647  0.3987604
## [2, ] -1.4370526  1.6462194
## [3, ]  0.5656033  1.2149662
```

## 3 Exercise 1

ムーアペンローズ疑似逆行列の解の幾何的な意味を以下の手順で確認せよ。

## 3.1 Exercise 1-1

$$n = m$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}, x_{12} \\ x_{21}, x_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

今、 $a_1, a_2$ の値を求めるというのは、 $(a_1, a_2)$ を次元座標として、2次元平面にある2本の直線の交点座標を求めることである。

$$\begin{aligned} x_{11}a_1 + x_{12}a_2 &= y_1 \\ x_{21}a_1 + x_{22}a_2 &= y_2 \end{aligned}$$

今、 $y_1 = 3, y_2 = 1, x_{11} = 4, x_{12} = 2, x_{21} = -1, x_{22} = 3$ のとき の2直線を描き、その交点を`MASS::ginv()`関数を求め、その点 $(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ が交点にあることを、打点することによって示せ。

## 3.2 Exercise 1-2

$$n > m$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}, x_{12} \\ x_{21}, x_{22} \\ x_{31}, x_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

これは3直線の場合である。

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_{11}, x_{12} \\ x_{21}, x_{22} \\ x_{31}, x_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2, 3 \\ 1, -2 \\ -3, -4 \end{pmatrix} \text{とする。}$$

3直線を描図し、ムーアペンローズ疑似逆行列による解 $(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ を打点せよ。

## 3.3 Exercise 1-3

Exercise 1-3 の例で、第1の直線は $(a_1, a_2)$ 座標について、 $y_1 = x_{11}a_1 + x_{12}a_2$ で表されているのに対し、解 $(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ は、別の直線、 $\hat{y}_1 = x_{11}\hat{a}_1 + x_{12}\hat{a}_2$ を表している。

2本の直線を描け。

同様に、第1、第2、第3の直線と、それに対応する、 $(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ を通る3直線を描け。

## 3.4 Exercise 1-4

第1の直線は、 $(a_1 = \frac{y_1}{x_{11}}, 0)$ と $(0, \frac{y_1}{x_{12}})$ を通る直線である。

それに対応する $(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ を通る直線は $(a_1 = \frac{\hat{y}_1}{x_{11}} = \frac{\hat{a}_1}{x_{11}}, 0)$ と $(0, \frac{\hat{y}_1}{x_{12}} = \frac{\hat{a}_2}{x_{12}})$ を通る直線である。これらは平行である。

点 $(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ を通り、この2直線と垂直な直線を引け。その直線の傾きは、 $(x_{12}, -x_{11})$ である。この垂直な直線が第1の直線と交わる交点 $P_1$ を求めよ。

$(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ と交点 $P_1$ との距離を求めよ。

同様に、行列が定める3つの直線のそれぞれについて、行え。

$\|y_i, \hat{y}_i\|$ とこの距離の関係は何か。

## 3.5 Exercise 1-5

$(a_1, a_2)$ 平面の任意の点に関して、その点から、直線への垂線の足を求める関数を作成せよ。

その関数を用いて、行列が定める3直線への足、3点が求まる。 $\|y_i, \hat{y}_i\|$ がわかるので、 $\sum_{i=1}^3 (y_i - \hat{y}_i)^2$ も求まるはずである。

この値が $(a_1, a_2)$ 平面に、どのような高低を作るかを図示し、 $(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$ の意味を確認せよ。

## 3.6 Exercise 1-6

$$n < m$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}, x_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

この場合、直線は1本引ける。ムーアペンローズ疑似逆行列の解は直線上の1点である。

$\|(a_1, a_2)\|$  が原点から最短距離になっていることを確かめよ。

## 3.7 Exercise 1-7

$n = m, n > m, n < m$  の3つの場合について、ムーアペンローズ疑似逆行列の解の幾何学的な意味を説明せよ。

## 3.8 Exercise 1-8

$n < m$  の場合に、 $y = X\mathbf{a}$  の解は、直線上のいずれの点でもよかったが、ムーアペンローズ疑似逆行列は、原点からの距離が最短になるような点  $\|(\hat{a}_1, \hat{a}_2)\|$  を選んだ。

正規化手法と呼ばれる手法では、

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \|\mathbf{a}\|^p$$

を最小にすることで、残差  $\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$  を小さくことのみを目指すのではなく、 $\|\mathbf{a}\|^p$  という形で、解の取り方に制約を持たせること、その制約の強さをパラメタ  $\lambda$  でコントロールする。

ムーアペンローズによる解の選び方と、正規化手法での解の選び方との類似性についてコメントせよ。