
Baseline scenario: final regret distributions
K-RACER
Mean 72.46 Median 71.37 Q1 67.76 Q3 74.17 IQR 6.41
Mean 99.47 Median 98.41 Q1 93.83 Q3 101.09 IQR 7.26
K-RACER ablation: Analytical Directional Certificate
Mean 209.21 Median 142.42 Q1 128.06 Q3 166.78 IQR 38.73
Mean 237.84 Median 170.75 Q1 156.15 Q3 198.07 IQR 41.92
K-RACER ablation: Minimum Eigenvector Excitation
Mean 100.41 Median 100.32 Q1 97.71 Q3 102.98 IQR 5.27
Mean 128.47 Median 128.13 Q1 126.01 Q3 131.15 IQR 5.14
K-RACER ablation: Without Restart
Mean 83.71 Median 80.88 Q1 65.13 Q3 101.13 IQR 36.00
Mean 109.48 Median 105.67 Q1 91.23 Q3 125.78 IQR 34.55
RAES-reworked
Mean 102.69 Median 104.06 Q1 94.11 Q3 109.49 IQR 15.38
Mean 122.08 Median 123.46 Q1 115.13 Q3 129.40 IQR 14.27
DBGD
Mean 3271.64 Median 1028.13 Q1 494.57 Q3 5527.60 IQR 5033.03
Mean 3277.55 Median 1039.46 Q1 503.05 Q3 5529.14 IQR 5026.09
Doubler
Mean 989.45 Median 1006.43 Q1 934.67 Q3 1078.08 IQR 143.41
Mean 2161.87 Median 2147.11 Q1 2049.49 Q3 2274.42 IQR 224.92
Sparring
Mean 466.76 Median 462.53 Q1 428.54 Q3 509.32 IQR 80.78
Mean 636.40 Median 589.47 Q1 568.46 Q3 621.00 IQR 52.54
10^2
10^3
10^4
Consumed-item regret
Slate-average regret
Box width = IQR = Q3 - Q1; whiskers within 1.5 IQR. All test samples shown.
Q1-Q3 box (IQR)
Median line
Mean
Test-seed regret