
A
Estimate (95% CI)
Trials better
q
PS-Demo
+ ECG
11.3 (6.0 to 16.1)
26/32
.002
+ CLMBR-T
20.7 (13.3 to 27.8)
27/32
<.001
+ ECG + CLMBR-T
25.8 (19.0 to 32.2)
26/32
<.001
+ permuted ECG
−0.6 (−5.4 to 4.4)
16/32
.87
+ permuted CLMBR-T
−1.5 (−5.1 to 2.1)
15/32
.57
PS-CVD5 (primary)
+ ECG
8.8 (4.4 to 13.3)
21/32
.002
+ CLMBR-T
12.4 (7.1 to 17.7)
23/32
<.001
+ ECG + CLMBR-T
13.5 (6.6 to 20.4)
23/32
.003
+ permuted ECG
1.0 (−2.8 to 4.8)
15/32
.74
+ permuted CLMBR-T
2.4 (−2.1 to 6.8)
18/32
.50
PS-Flags
+ ECG
−3.0 (−7.3 to 1.1)
14/31
.92
+ CLMBR-T
−2.9 (−8.7 to 3.0)
15/31
.87
+ ECG + CLMBR-T
−6.3 (−17.1 to 3.4)
17/31
.89
+ permuted ECG
−1.8 (−5.8 to 2.5)
13/31
.57
+ permuted CLMBR-T
−6.3 (−11.5 to −1.1)
9/31
.081
hdPS200
+ ECG
7.6 (1.7 to 13.0)
22/32
.033
+ CLMBR-T
−3.5 (−14.0 to 6.0)
18/32
.80
+ ECG + CLMBR-T
−1.4 (−22.5 to 13.3)
22/32
.65
+ permuted ECG
3.0 (−1.4 to 7.3)
23/32
.36
+ permuted CLMBR-T
2.0 (−2.3 to 6.2)
20/32
.54
PS-Clinical
+ ECG
−1.3 (−6.8 to 3.9)
17/32
.78
+ CLMBR-T
0.8 (−3.9 to 5.9)
16/32
.54
+ ECG + CLMBR-T
−0.2 (−6.8 to 6.1)
17/32
.66
+ permuted ECG
−3.4 (−8.7 to 1.3)
14/32
.36
+ permuted CLMBR-T
0.9 (−3.3 to 4.7)
18/32
.76
filled: q < .05 (BH, balance family)
open: q ≥ .05
−20
−10
0
10
20
30
Relative reduction in mean |SMD| vs the rung's base PS, % (95% CI)
54 non-coded held-out characteristics; 32 trials; 1:1, caliper 0.2