C

Head-to-heads (S32, main unless stated; two-sided)



	Estimate (95% CI)	Better	P	q	|Δ log HR| ref → learned	Perm. P
vs PS-Flags						
PS-Demo + CLMBR-T vs PS-Flags, C = 1 (primary)	0.7 (−5.5 to 6.8)	13/31	.81	.86	0.186 → 0.174	.97
vs PS-Flags, C = 0.1	7.7 (−0.1 to 15.8)	20/32	.085	sens.	0.218 → 0.170	.32
vs PS-Flags, C = 0.01	1.0 (−5.1 to 6.8)	14/32	.76	sens.	0.202 → 0.170	.14
vs PS-Flags, CV-tuned C	−1.5 (−7.5 to 4.4)	13/32	.63	sens.	0.216 → 0.170	.001
vs PS-Flags, CV-tuned C (1:3 matching)	1.6 (−4.0 to 6.7)	18/32	.60	sens.	0.223 → 0.166	<.001
vs PS-Flags, CV-tuned C (overlap weights)	1.9 (−1.4 to 5.1)	18/32	.27	sens.	0.184 → 0.176	.70
vs PS-Flags C = 1, trials with Flags retention ≥ 0.5	−1.1 (−7.2 to 5.1)	10/27	.74	sens.	0.206 → 0.182	.82
vs PS-Flags C = 1, Flags retention ≥ 0.7	−2.6 (−9.2 to 4.6)	6/19	.50	sens.	0.222 → 0.211	.89
vs PS-Flags C = 1, Flags retention ≥ 0.9	−5.1 (−13.1 to 5.8)	3/11	.37	sens.	0.305 → 0.280	.77
PS-Demo + CLMBR-T (32 PCs) vs PS-Flags, C = 1	−2.9 (−10.1 to 4.4)	13/31	.44	.60	0.186 → 0.181	1.00
vs hdPS200						
PS-Demo + CLMBR-T vs hdPS200	3.8 (−3.0 to 10.0)	17/32	.29	.47	0.181 → 0.170	.095
PS-CVD5 + CLMBR-T vs hdPS200	3.8 (−2.7 to 9.6)	19/32	.26	.43	0.181 → 0.166	.15
vs PS-Clinical (measured vitals and labs)						
PS-CVD5 + CLMBR-T vs PS-Clinical	−4.9 (−11.2 to 0.9)	9/32	.12	.25	0.158 → 0.166	.19
PS-CVD5 + ECG + CLMBR-T vs PS-Clinical	−5.4 (−11.9 to 1.1)	13/32	.13	.27	0.158 → 0.158	.17