

Step-1

Let $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ be the matrix whose eigen vectors are $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ and $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

Suppose λ_1 and λ_2 are the eigen values to which these are the respective eigen vectors.

Then $S = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $S^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ and $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ such that

$$A = S \Lambda S^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 & -\lambda_2 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 & \lambda_1 - \lambda_2 \\ \lambda_1 - \lambda_2 & \lambda_1 + \lambda_2 \end{bmatrix}$$