

## Step-1

The objective is to find the condition on  $b_1, b_2, b_3$  for the following system to be solvable:

$$x + 2y - 2z = b_1$$

$$2x + 5y - 4z = b_2$$

$$4x + 9y - 8z = b_3$$

Rewrite the system in  $AX = b$  form:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 4 & 9 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

## Step-2

The augmented matrix is:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & b_1 \\ 2 & 5 & -4 & b_2 \\ 4 & 9 & -8 & b_3 \end{array} \right].$$

Apply row reduced echelon form to the augmented matrix.

Add  $-2$  times row 1 to row 2.

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & b_2 - 2b_1 \\ 4 & 9 & -8 & b_3 \end{array} \right].$$

## Step-3

Add  $-4$  times row 1 to row 3.

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 1 & 0 & b_3 - 4b_1 \end{array} \right].$$

Add  $-1$  times row 2 to row 3.

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - 2b_1 - b_2 \end{array} \right].$$

The system is consistent if  $-2b_1 - b_2 + b_3 = 0$ .

Thus, the condition for the system to be solvable is  $-2b_1 - b_2 + b_3 = 0$ .

## Step-4

Now determine the solutions for the system by using the obtained condition.

Take  $b_1 = 1, b_2 = 1$ , then  $b_3 = 3$ .

The vector  $b$  is:

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

The system in matrix form is:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 4 & 9 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

## Step-5

The augmented matrix  $[A \ b]$  is:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & -4 & 1 \\ 4 & 9 & -8 & 3 \end{array} \right].$$

Apply row reduced echelon to get,

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

## Step-6

From the matrix observe that  $z$  is a free variable, and the system can be written as:

$$\begin{aligned} x - 2z &= 3 \\ y &= -1 \end{aligned}$$

Take  $z = t$  then  $x = 3 + 2t$ .

On substitution,

$$X = \begin{bmatrix} 3+2t \\ -1 \\ t \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$X = \left[ \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right],$$

Therefore, the solution is here  $t$  is an arbitrary constant.