

Step-1

Given m independent measurements of pulse rate are b_1, \dots, b_m are weighted by w_1, \dots, w_m .

$$\bar{x}_w = \frac{w_1^2 b_1 + w_2^2 b_2}{w_1^2 + w_2^2}.$$

We have to find the weighted average that replaces

Step-2

We have the weighted error is $E^2 = w_1^2 (x - b_1)^2 + w_2^2 (x - b_2)^2 + \dots + w_m^2 (x - b_m)^2$

And the minimizing process is $\frac{dE^2}{dx} = 0$

$$\Rightarrow 2w_1^2 (x - b_1) + 2w_2^2 (x - b_2) + \dots + 2w_m^2 (x - b_m) = 0$$

$$\Rightarrow 2[w_1^2 (x - b_1) + w_2^2 (x - b_2) + \dots + w_m^2 (x - b_m)] = 0$$

$$\Rightarrow w_1^2 (x - b_1) + w_2^2 (x - b_2) + \dots + w_m^2 (x - b_m) = 0$$

Step-3

Continuation to the above

$$\Rightarrow w_1^2 x - w_1^2 b_1 + w_2^2 x - w_2^2 b_2 + \dots + w_m^2 x - w_m^2 b_m = 0$$

$$\Rightarrow w_1^2 x + w_2^2 x + \dots + w_m^2 x - (w_1^2 b_1 + w_2^2 b_2 + \dots + w_m^2 b_m) = 0$$

$$\Rightarrow x(w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_m^2) = w_1^2 b_1 + w_2^2 b_2 + \dots + w_m^2 b_m$$

$$\Rightarrow x = \frac{w_1^2 b_1 + w_2^2 b_2 + \dots + w_m^2 b_m}{w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_m^2}$$

$$\text{Hence the weighted average is } \boxed{x = \bar{x}_w = \frac{w_1^2 b_1 + w_2^2 b_2 + \dots + w_m^2 b_m}{w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_m^2}}.$$