

Конспекты лекций по алгебре-геометрии

Ведёт: Акопян Ольга Владимировна
перенесено в электронный формат Ширкуновым А.

2024-2025 учебный год, первый семестр

1 Множества

1.1 Основные понятия

Прим.: опушу часть с определением множеств и операций над ними, т.к эта тема пересекается с первыми лекциями по алгебре.

1.2 Ограниченность множеств

Множество E **ограничено сверху**, если $\exists b \in \mathbb{R} : \forall x \in E \quad x \leq b$. В таком случае b называют **мажорантой** множества E . Если $b \in E$, то b обозначают как $\max(e)$, читается как 'максимальный элемент множества E '.

Наименьшая мажоранта множества E называется **супремумом** этого множества или его верхней границей. Записывается через $M = \sup(E)$.

Множество E **ограничено снизу**, если $\exists b \in \mathbb{R} : \forall x \in E \quad x \geq b$. В таком случае b называют **минорантой** множества E . Если $b \in E$, то b обозначают как $\min(e)$, читается как 'минимальный элемент множества E '.

Наибольшая миноранта множества E называется **инфинумом** этого множества или его нижней границей. Записывается через $m = \inf(E)$.

$$M = \sup(E) \Leftrightarrow (\forall x \in E \quad x \leq M \quad \text{and} \quad \forall \epsilon > 0 \quad \exists x_\epsilon : M - \epsilon < x_\epsilon)$$

$$m = \inf(E) \Leftrightarrow (\forall x \in E \quad x \geq m \quad \text{and} \quad \forall \epsilon > 0 \quad \exists x_\epsilon : m + \epsilon > x_\epsilon)$$

Свойства супремума и инфинума множеств:

- $\sup(X + Y) = \sup(X) + \sup(Y)$
- $\inf(X + Y) = \inf(X) + \inf(Y)$
- $\sup(X - Y) = \sup(X) - \inf(Y)$
- $\inf(X - Y) = \inf(X) - \sup(Y)$

$$\begin{aligned} \bullet \sup(\lambda X) &= \begin{cases} \lambda \cdot \sup(X), \lambda > 0 \\ \lambda \cdot \inf(X), \lambda < 0 \end{cases} \\ \bullet \inf(\lambda X) &= \begin{cases} \lambda \cdot \inf(X), \lambda > 0 \\ \lambda \cdot \sup(X), \lambda < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Если множество не обладает свойством ограниченности сверху или снизу, его называют **неограниченным**: $\forall b \in \mathbb{R} \exists x \in E : x > b$ – пример для неограниченности сверху для множества E .

Принцип Архимеда гласит: если существуют $a, b : a < b$, то $\exists n : na > b$ (в классе рассмотрели доказательство от противного).

Мажоранта функции – функция, значения которой не меньше соответствующих значений данной функции.

2 Числовые последовательности

2.1 Ограниченность числовой последовательности

Числовая последовательность действительных чисел – функция, определяемая следующим образом: $f : N \rightarrow R$, $N = \{x \mid x \in \mathbb{N}\}$, $R = \{x \mid x \in \mathbb{R}\}$. Чаще рассматривается как пронумерованное множество действительных чисел.

Последовательность $\{x_n\}$ считается ограниченной, если $\exists k, K : \forall n \in \mathbb{N} \ k \leq x_n \leq K$, где k – миноранта x_n , а K – мажоранта $\{x_n\}$.

Супремумом числовой последовательности называют наименьшую из её мажорант, а **инфинумом** – наибольшую из минорант.

Последовательность $\{x_n\}$ считается неограниченной, если $\forall c > 0 \exists k \in \mathbb{N} : x_k \geq c$.

2.2 Предел числовой последовательности

Числовая последовательность $\{x_n\}$ называется **сходящейся** в случае, если: $\forall \epsilon > 0 \exists N : \forall n > N \ |x_n - A| < \epsilon$, где число A – **предел** этой последовательности. Другими словами, последовательность сходится тогда и только тогда, когда существует некоторый предел равный A .

Данное утверждение понимается следующим образом: каким бы ни было число ϵ , все члены последовательности, начиная с некоторого N , попадают в ϵ -окрестности точки A . Вне ϵ -окрестности лежит лишь конечное число членов $\{x_n\}$.

Значение предела числовой последовательности записывается следующим образом:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = A$$