

代数学続論

体と Galois 理論

目次

1	体の拡大	3
2	Galois 理論の基本定理	5
2.1	Dedekind の補題	5
2.2	Artin の定理	6
2.3	Galois 理論の基本定理	9
3	代数方程式の可解性	12
4	標数 素体	14
4.1	標数 素体	14
4.2	Frobenius 自己準同型	15
5	体上の代数	17
5.1	K-代数	17
5.2	元の添加	18
5.3	体の合成	18
6	代数拡大	20
6.1	代数的、超越的	20
6.2	代数拡大	21
7	代数閉体、分解体、代数閉包	24
7.1	代数閉体	24
7.2	分解体	25
7.3	代数閉包	26
8	etale 代数	27
8.1	対角化	27
8.2	etale 代数の部分代数	29

8.3	分離次数	31
8.4	微分加群	33
8.5	被約	33
9	分離的代数拡大	36
9.1	多項式の分離性	36
9.2	元の分離性	38
9.3	原始元	40
9.4	分離閉体、分離閉包	41
9.5	非分離次数	42
10	ノルムとトレース	44
10.1	ノルムとトレース	44
10.2	正則表現	45
10.3	分離拡大のノルムとトレース	46

1 体の拡大

以降の議論では特に述べない限り体は可換体とする。可換体は以下のように言い換えられる。

\Leftrightarrow 可換整域で (0) と (1) 以外のイデアルがない。

\Leftrightarrow Krull 次元が 0 の可換整域。

\Leftrightarrow 可換整域で 0 以外の元は可逆。

ただし Krull 次元とは環の素イデアルの包含関係による順序の鎖の長さの上限のことである。

K : 体とすると K^\times : 可逆元の集合とし、上の同値からこれは $K^\times = K - \{0\}$ としたものと等しい。

例 1.1. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p : 素数), \mathbb{Q}_p (p 進体)

例 1.2. K : 体としたとき

$K(x)$: 有理関数体 $= \{ \text{多項式} / \text{多項式} (\neq 0) \mid \text{多項式} \in K[x] \}$

$K[[x]]$: 形式的冪級数体 $\{ \sum_{i \in \mathbb{Z}, i \leq n} c_i x^i \mid c_i \in K, n \in \mathbb{Z} \}$

\mathbb{Q} に α を添加した体 $\Leftrightarrow \mathbb{Q}(\alpha)$ ($\alpha \in \mathbb{C}$) $=$ (α を含む最小の体 $\subset \mathbb{C}$) $= \{ f(\alpha) \mid f \in \mathbb{Q}(x), (f \text{ の分母})(\alpha) \neq 0 \} = \{ \alpha \text{ と有理数からできる元全体} \}$

Fact 1.3. R : 可換環 $\supset I$: イデアル のとき、 R/I : 体 $\Leftrightarrow I$: 極大イデアル

例 1.4. $R = K[x], I = (f)$ とするとき Fact から

I が極大 $\Leftrightarrow I$: 素イデアル $\Leftrightarrow f$: 既約

よって $K[x]/(f)$ が体 $\Leftrightarrow f$ が既約

Rem 1.5. $\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$ は零環で体ではない。 \mathbb{F}_1 : 一元体 $\subset \mathbb{Z}$ は実際にはない。

定義 1.6. K, L : 体 $K \subset L$ とする。

(K の体構造) $=$ (L の体構造を K に制限したもの) であるとき K は L の 部分体 (subfield)、 L は K の 拡大体 (extension field) といい、体の拡大 (field extension) L/K とも言う。

定義 1.7. 体の準同型とは環としての準同型のこと。

Note 1.8. 体の準同型は全て単射。

Proof. K, L : 体, $\phi: K \rightarrow L$: 準同型とすると $\ker(\phi)$ は K のイデアルであるから体であることより $\ker(\phi) = (0)$ または $(1) = K$ となる。 $\ker(\phi) = K$ のとき $\phi(K) = 0$ から準同型であるための $\phi(1) = 1$ を満たしていないからこれは不適。したがって $\ker(\phi) = (0)$ より ϕ は単射。 \square

$\text{hom}: \phi: K \rightarrow L$ があると単射より K は L の部分体 $\phi(K)$ と同一視できる。これより L が K を含んでいなくても K の拡大体と見ることができる。

L/K が拡大のときとくに L は K 上のベクトル空間とみなせるため $\dim_K(L)$ が定義できる。 ($\in \mathbb{Z}_{\geq 1} \cup \{\infty\}$)

定義 1.9. $[L:K] := \dim_K(L)$ と書きこれを L/K の 拡大次数 (extension degree) という。この値により拡大は有限次拡大、無限次拡大に分けられる。

例 1.10. $K(x)/K$ とするとき x が不定元なのでこれは無限次拡大。

$K[x]/(f)$ で $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ で既約とすると $a_n = 1$ とできて、 $x^n \equiv -(a_0 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}), (\text{mod } (f))$ となり n 次以上の多項式の次数を下げられるので結局基底は $1, x, \cdots, x^{n-1}$ より $[K(x)/(f) : K] = n$ となるのでこれは有限次拡大。

補題 1.11. $L/M, L/K$: 体の有限次拡大、 $M \supset K$ のとき $[L : M] = [L : K]$ ならば $M = K$ 。

Proof. ここで L の M 上の基底を (e_i) とし K 上の基底を (f_i) とするとまず拡大次数の定義からこの個数は等しい。この値を n とすると $M^n \cong L \cong K^n$ であり $M^n \cong K^n$ となる。したがって $M \supset K$ から $M = K$ となるので示された。 \square

定義 1.12. 体 L に対しその自己同型写像の集合を

$$\text{Aut}(L) := \{ \text{体の自己同型 } \sigma : L \longrightarrow L \}$$

と書きこれは写像の合成について群になっている。また、拡大 L/K に対して K の拡大体としての同型写像 (K - 同型写像) の集合を

$$\text{Aut}_K(L) := \{ \sigma \in \text{Aut}(L) \mid \sigma_K = \text{id}_K \}$$

と書きこれは $\text{Aut}(L)$ の部分群になる。

またこれは K の拡大としての L から L の準同型写像とも言えるため $\text{Hom}_K \text{ の拡大 } (L, L)$ または明らかにときは $\text{Hom}_K(L, L)$ と書ける。

群になることは写像の結合法則、 id_L が単位元、逆元は同型写像より逆写像を考えればよい。

定義 1.13. L/K が拡大、 $K \subset M \subset L$ で M が L の部分体であるとき M は L/K の中間体 (intermediate field) という。これを $L/M/K$ とかくこともある。

また、 $L/M/K$ のとき $\text{Aut}_K(L) \supset \text{Aut}_M(L)$ が得られる。一般に $\text{Aut}_K(M)$ は包含関係が言えない。

定義 1.14. L : 体 $H(\subset \text{Aut}(L))$: 部分集合の 2 つに対し

$$L^H := \{ x \in L \mid \forall \sigma \in H, \sigma(x) = x \}$$

は L の部分体になり、 L の H による固定部分体という。このような元を H により固定される元ともいう。

部分体になることは $\sigma \in H \subset \text{Aut}(L)$ は同型写像より加法乗法を保存し、 $1, 0$ は常に動かないことからわかる。

Rem 1.15. $H_1 \subset H_2 \subset \text{Aut}(L) \implies L^{H_1} \supset L^{H_2}$ が成り立つ。これは H_2 により固定される元は包含関係より H_1 によっても固定されるからである。

Rem 1.16. $L/M/K$ のとき $[L : K] = [L : M][M : K]$ が成り立つ。何れかが無限次元であれば成立する。

有限次元の場合は次のようになる。 L を M 上のベクトル空間と見たとき、その基底は $[L : M]$ 個でその係数は M の元であるから M を K 上のベクトル空間と見たときの $[M : K]$ 個の基底で書かれるため L を K 上のベクトル空間と見たときはその基底の積で書かれるからである。

一般に $V : M\text{-vect.sp.}, M/K$: 拡大のとき V を K 上のベクトル空間と見れて $\dim_K(V) = \dim_M(V) \cdot [M : K]$ となる。

2 Galois 理論の基本定理

2.1 Dedekind の補題

定義 2.1. 有限次拡大 L/K が Galois 拡大であるとは $L^{\text{Aut}_K(L)} = K$ であること。

このときの $\text{Aut}_K(L)$ をとくに $\text{Gal}(L/K)$ と記し、 L/K の Galois 群という。

Rem 2.2. $L^{\text{Aut}_K(L)}$ は K を固定するような元で固定される L の元であるから $L^{\text{Aut}_K(L)} \supset K$ は定義より明らか。それ以外に固定される元が無いということ。

また、よくある Galois 拡大の定義は正規かつ分離な拡大というものでこれとの同値は後で示す。

Galois 理論の基本定理を示すために準備を行う。

補題 2.3. S :群 L :体とし、 $\sigma_1, \dots, \sigma_n : S \longrightarrow L^\times$ を相異なる群準同型とする。このとき $c_1, \dots, c_n \in L$ に対し以下が成り立つ。

$$c_1\sigma_1(x) + \dots + c_n\sigma_n(x) = 0 \ (\forall x \in S) \implies c_1 = \dots = c_n = 0$$

Proof. 成り立たないと仮定し、ある $c_1, \dots, c_n \in S$ が成り立たないとするもののうち n が最小であるような最短の反例であるとする。まずこのとき $n \leq 2$ である。 $n = 1$ のとき $c_1\sigma_1(x) = 0$ であるが $\sigma_1(x) \in L^\times = L - \{0\}$ から $c_1 = 0$ となるからである。

相異なる群準同型より写像として異なるということは $\sigma_n \neq \sigma_1$ より $\exists x_0 \in S, \sigma_n(x_0) \neq \sigma_1(x_0)$ となる。 x_0x を入れると準同型より

$$c_1\sigma_1(x_0)\sigma_1(x) + \dots + c_n\sigma_n(x_0)\sigma_n(x) = 0 \tag{1}$$

となる。これと $\sigma_n(x_0)$ を式にかけたものは

$$c_1\sigma_n(x_0)\sigma_1(x) + \dots + c_n\sigma_n(x_0)\sigma_n(x) = 0 \tag{2}$$

となりこれを辺々ひくと $c_n\sigma_n(x_0)\sigma_n(x)$ が共通であるからそこが消えて、 $\sigma_1(x_0) - \sigma_n(x_0) \neq 0$ より

$$c_1(\sigma_1(x_0) - \sigma_n(x_0))\sigma_1(x) + \dots + c_{n-1}(\sigma_{n-1}(x_0) - \sigma_n(x_0))\sigma_{n-1}(x) = 0$$

となり $c_k(\sigma_k(x_0) - \sigma_n(x_0))$ を新しい係数と見れば左辺は少なくとも全ての項が 0 になることは無いので c_1, \dots, c_n の最短性に矛盾しているから $c_1 = \dots = c_n = 0$ である。

□

補題 2.4. Dedekind の補題

M, L :体とし、 $\sigma_1, \dots, \sigma_n : M \longrightarrow L$ が相異なる体の準同型とする。このとき $c_1, \dots, c_n \in L$ に対し、以下が成り立つ。

$$c_1\sigma_1(x) + \dots + c_n\sigma_n(x) = 0 \ (\forall x \in M) \implies c_1 = \dots = c_n = 0$$

Proof. 乗法群に制限したものは $\sigma_i|_{M^\times} : M^\times \rightarrow L^\times$ でありこれは相異なる群準同型なので補題 2.3 より成立。□

Rem 2.5. 写像 $\text{Hom}_{\text{体}}(M, L) \rightarrow \text{Hom}_{\text{加法群}}(M, L)$ を 体の準同型をその加法群の準同型とみるというものにする。また、このとき $\text{Hom}_{\text{加法群}}(M, L)$ は $(\phi_1 + \phi_2)(x) = \phi_1(x) + \phi_2(x), (c\phi)(x) = c(\phi(x)) \ c \in L$ とすることで L の加法により L -ベクトル空間と見れる。そしてこの写像でそれぞれの元は変わらず変わるのは始域と終域の演算なので単射であり像は一次独立となることを補題 2.4 は述べている。

補題 2.6. Dedekind の補題/ K

$L/M, M/K$:拡大で $\sigma_1, \dots, \sigma_n : M \rightarrow L$ を相異なる K 上の体準同型 ($\sigma_i|_K = \text{id}_K$) とする。このとき $c_1, \dots, c_n \in L$ に対し、以下が成り立つ。

$$c_1\sigma_1(x) + \dots + c_n\sigma_n(x) = 0 \ (\forall x \in M) \implies c_1 = \dots = c_n = 0$$

Proof. Dedekind の補題から明らか。□

Rem 2.7. これも 2.4 と同様に K 上の体準同型であることも考えれば写像 $\text{Hom}_{K\text{-拡大}}(M, L) \rightarrow \text{Hom}_{K\text{-ベクトル空間}}(M, L)$ が単射で像は L 上一次独立である。

2.2 Artin の定理

補題 2.8. $M/K, L/K$:体の拡大として M/K が有限次拡大のとき $|\text{Hom}_{K\text{-拡大}}(M, L)|$ は有限で $|\text{Hom}_{K\text{-拡大}}(M, L)| \leq [M : K]$ が成り立つ。

Proof. まず、 $\text{Hom}_K(M, K) \otimes_K L \cong \text{Hom}_K(M, L)$ を示す。

$f \in \text{Hom}_K(M, K), l \in L$ に対し $\varphi(f, l) : M \rightarrow L, m \mapsto f(m)l$ とする。このときこれは $f \in \text{Hom}_K(M, K)$ から以下のように K 線形写像であるから $\varphi(f, l) \in \text{Hom}_K(M, L)$ である。

$$\begin{aligned} \varphi(f, l)(m_1 + m_2) &= f(m_1 + m_2)l = (f(m_1) + f(m_2))l = f(m_1)l + f(m_2)l = \varphi(f, l)(m_1) + \varphi(f, l)(m_2) \\ \varphi(f, l)(km) &= f(km)l = kf(m)l = k\varphi(f, l)(m) \end{aligned}$$

そして $\phi : \text{Hom}_K(M, K) \times L \rightarrow \text{Hom}_K(M, L), (f, l) \mapsto \phi(f, l) = \varphi(f, l)$ とすると ϕ は以下のように L -双線形写像になる。

$$\begin{aligned} \phi(f_1 + f_2, l)(m) &= (f_1 + f_2)(m)l = f_1(m)l + f_2(m)l = \phi(f_1, l) + \phi(f_2, l) = (\phi(f_1, l) + \phi(f_2, l))(m) \\ \phi(f, l_1 + l_2)(m) &= f(m)(l_1 + l_2) = f(m)l_1 + f(m)l_2 = \phi(f, l_1)(m) + \phi(f, l_2)(m) = (\phi(f, l_1) + \phi(f, l_2))(m) \\ \phi(kf, l)(m) &= (kf)(m)l = k(f(m))l = k\phi(f, l)(m) \\ \phi(f, kl)(m) &= f(m)kl = k(f(m))l = k\phi(f, l)(m) \end{aligned}$$

したがってテンソル積の普遍性から $\theta : \text{Hom}_K(M, K) \otimes_K L \rightarrow \text{Hom}_K(M, L)$ であり $\theta(f \otimes l) : M \rightarrow L, m \mapsto f(m)l$ と定められたものが一意に定まる。

今、有限次拡大であるので M の基底を (m_i) 、その双対空間 $\text{Hom}_K(M, K)$ の基底つまり双対基底を (f_i) 、 L の基底を (l_j) とできる。よって $z \in \text{Hom}_K(M, K) \otimes_K L$ は $z = \sum_{ij} a_{ij}(f_i \otimes l_j), a_{ij} \in K$ と書ける。そして定義から $\theta(z)(m) = \sum_{ij} a_{ij}(f_i(m)l_j)$ となる。 $m = m_i$ とすると双対基底からクロネッカーのデルタから $f_i(m_j) = \delta_{ij}$ となるので $\theta(z)(m_i) = \sum_j a_{ij}l_j$ である。 $\theta(z) = 0$ になるとき、全ての (m_i) において 0 にな

るので (l_j) が基底より一次独立を考えれば $\forall i, \sum_j a_{ij} l_j = 0 \Leftrightarrow a_{ij} = 0$ となるから $z = 0$ より $\ker(\theta) = 0$ より θ は単射。

また、任意の $f \in \text{Hom}_K(M, L)$ に対して $z = \sum_i f_i \otimes f(m_i)$ とおくと $\theta(z)(m) = \sum_i f_i(m) f(m_i)$ から $m = m_i$ とおけば双対基底より同様に $\theta(z)(m_i) = f(m_i)$ であり (m_i) は基底なので $\theta(z) = f$ となるから θ は全射。

よって θ は全単射であり、 K -双線形写像より θ は同型写像となるので $\text{Hom}_K(M, K) \otimes_K L \cong \text{Hom}_K(M, L)$ が成り立つ。

次に $\text{Hom}_K(M, K) \otimes_K L \cong L^n$ を示す。

今 $[M : K] = n$ とするとある基底を取れば M が K ベクトル空間より $M \cong K^n$ とできるので $\text{Hom}_K(M, K) \otimes_K L \cong \text{Hom}_K(K^n, K) \otimes_K L$ となる。また、 $\text{Hom}_K(K^n, K)$ は $M = K^n$ の双対空間なので基底を移せるので $\text{Hom}_K(K^n, K) \cong K^n$ より $\text{Hom}_K(K^n, K) \otimes_K L \cong K^n \otimes_K L$ となる。

そして $\phi : K^n \otimes_K L \longrightarrow L^n, (k_1, \dots, k_n) \otimes l \longmapsto (k_1 l, \dots, k_n l)$ とする。これは $(k_1 l, \dots, k_n l) = (k'_1 l', \dots, k'_n l') \Leftrightarrow \forall i, k_i l = k'_i l'$ であり L が体なので l^{-1} をかければ $k_i = k'_i$ より $(k_1, \dots, k_n) = (k'_1, \dots, k'_n)$ から ϕ は単射。そして、任意の $(l_1, \dots, l_n) \in L^n$ に対して $k_i = l_i l^{-1}$ ととれば $\phi((k_1, \dots, k_n) \otimes l) = (l_1, \dots, l_n)$ より全射。構造も保たれるから $K^n \otimes_K L \cong L^n$ となる。

したがって同型から、 $[M : K] = n = \dim_L(L^n) = \dim_L(K^n \otimes_K L) = \dim_L(\text{Hom}_K(M, K) \otimes_K L) = \dim_L(\text{Hom}_K(M, L))$ より $\dim_L(\text{Hom}_K(M, L)) = [M : K]$ となる。

そして補題 2.7 から単射で一次独立であることから Hom_K の拡大 (M, L) は $\text{Hom}_K(M, L)$ に埋め込めるから $|\text{Hom}_K \text{ の拡大}(M, L)| \leq |\text{Hom}_K(M, L)| = [M : K]$ より示された。□

定理 2.9. Artin の定理

L/K が有限次拡大のとき

$$L/K \text{ が Galois 拡大} \Leftrightarrow K = L^G \text{ となる部分群 } G \subset \text{Aut}(L) \text{ が存在する。}$$

このとき $G = \text{Gal}(L/K), [L : K] = |G|$ が成り立つ。

Proof. 必要十分性を示す。

(\Rightarrow)

$G = \text{Gal}(L/K)$ とすれば Galois 拡大の定義より成立。

(\Leftarrow)

$K = L^G$ のとき G の元は K の元を固定するので $G \subset \text{Aut}_K(L)$ であり、1.15 より包含関係が逆になり $L^G \supset L^{\text{Aut}_K(L)}$ となる。 $L^{\text{Aut}_K(L)}$ は K の元で固定されるような元により固定される L の元なので K を含む。したがって以下のようになる。

$$K = L^G \supset L^{\text{Aut}_K(L)} \supset K$$

より $K = L^G = L^{\text{Aut}_K(L)} = K$ から $K = L^{\text{Aut}_K(L)}$ より L/K は Galois 拡大。

$L^G = L^{\text{Aut}_K(L)}$ から $G = \text{Aut}_K(L)$ とは言えないので以下のように示す。まず $[L : K] = |G|$ を示す。

補題 2.8 から $G \subset \text{Aut}_K(L)$ より $|G| \leq |\text{Aut}_K(L)| = |\text{Hom}_K(L, L)| \leq [L : K]$ となるので $|G| \geq [L : K]$ が言えればよい。

$|G| < [L : K]$ と仮定する。

$G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$, L の K 上の基底を (w_1, \dots, w_n) とする。仮定より $m \leq n$ なので $(n \times m)$ の連立方程式系

$$\begin{cases} \sigma_1(w_1)x_1 + \dots + \sigma_1(w_n)x_n = 0 \\ \vdots \\ \sigma_m(w_1)x_1 + \dots + \sigma_m(w_n)x_n = 0 \end{cases}$$

が作られ、変数の数 (n) より式の数 m のほうが多いから非自明解が存在する。その解を $(c_1, \dots, c_n) \in L^n$ としそのうち 0 が一番多い最短の解を考え添字を並び替え 0 の解を後ろにまとめ、0 でない解 $c_i, (1 \leq i \leq r)$ で連立方程式系を以下のようにできる。

$$\begin{cases} c_1\sigma_1(w_1) + \dots + c_r\sigma_1(w_r) = 0 \\ \vdots \\ c_1\sigma_m(w_1) + \dots + c_r\sigma_m(w_r) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

まず、2.3 のときと同様に $r \leq 2$ である。また、 $c_r (\neq 0) \in L$ で割って $c_r = 1$ と置き直せる。そして $\exists c_i \in L - K$ となる。もし $\forall c_i \in K$ とすると $\sigma|_K = \text{id}_K$ より $c_i\sigma(w_i) = \sigma(c_iw_i)$ と、準同型より $\sigma_1(c_1w_1 + \dots + c_rw_r) = 0 \Rightarrow c_1w_1 + \dots + c_rw_r = 0$ となる。そして (w_i) は基底だから一次独立より $c_1 = \dots = c_r = 0$ となりこれは非自明解であることに矛盾する。よって c_i 全てが K に入ることは無いから $\exists c_i \in L - K$ となりこれを c_1 とおく。このとき K に入っていないから $\exists \sigma \in G, \sigma(c_1) \neq c_1$ が成り立つ。

この σ を連立方程式全体に作用させると以下ようになる。

$$\begin{cases} \sigma(c_1)\sigma(\sigma_1(w_1)) + \dots + \sigma(c_r)\sigma(\sigma_1(w_r)) = 0 \\ \vdots \\ \sigma(c_1)\sigma(\sigma_m(w_1)) + \dots + \sigma(c_r)\sigma(\sigma_m(w_r)) = 0 \end{cases}$$

ここで G は有限なので $\sigma\sigma_i$ は i を動かすことで G のすべての元を出し尽くすから、また添字を付け替えて方程式を並び替えて $\sigma\sigma_i$ を σ_i として以下のようにして良い。

$$\begin{cases} \sigma(c_1)\sigma_1(w_1) + \dots + \sigma(c_r)\sigma_1(w_r) = 0 \\ \vdots \\ \sigma(c_1)\sigma_m(w_1) + \dots + \sigma(c_r)\sigma_m(w_r) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

式 (3) - 式 (4) とすると以下ようになる。

$$\begin{cases} (c_1 - \sigma(c_1))\sigma_1(w_1) + \dots + (c_r - \sigma(c_r))\sigma_1(w_r) = 0 \\ \vdots \\ (c_1 - \sigma(c_1))\sigma_m(w_1) + \dots + (c_r - \sigma(c_r))\sigma_m(w_r) = 0 \end{cases}$$

そして $c_1 - \sigma(c_1) \neq 0$ と $c_r = 1$ から $c_r - \sigma(c_r) = 1 - 1 = 0$ より r の最短性に矛盾する。よって $|G| < [L : K]$ は不適であるから $|G| \geq [L : K]$ なので $|G| = [L : K]$ が成り立つ。

これより $G \subset \text{Aut}_K(L)$ と一番外側の値が同じであるからその間の不等号も等号になるので $|G| = |\text{Aut}_K(L)| = [L : K]$ より $G = \text{Aut}_K(L) = \text{Gal}(L/K)$ も成り立つことがわかる。

□

系 2.10. L/K :有限次拡大で $|\text{Aut}_K(L)| \geq [L : K]$ ならば L/K は Galois 拡大。

Proof. $G = \text{Aut}_K(L)$ とおく。Artin の定理から $K' = L^G$ とすれば $G \subset \text{Aut}(L)$ より L/L^G は Galois 拡大。したがって $[L : L^G] = |G|$ となる。ここで L^G は K の元を固定するような元で固定される L の元なので $L^G \supset K$ である。よって $L/L^G, L/K, L^G/K$ はともに体の拡大であるから $[L : K] = [L : L^G][L^G : K]$ が成り立ち、 $[L : L^G] = |G|$ と仮定 $|G| \geq [L : K]$ より $|G| \geq |G|[L^G : K] \Rightarrow [L^G : K] = 1$ となる。よって $|G| = |\text{Aut}_K(L)| = [L : L^G] = [L : K]$ である。

補題 (1.11) より $L^G = K$ となるので Galois 拡大の定義より L/K は Galois 拡大。

□

Rem 2.11. $|\text{Aut}_K(L)| \leq [L : K]$ は補題 2.8 から $M = L$ とすれば $|\text{Aut}_K(L)| = |\text{Hom}_{K \text{ の拡大}}(L, L)| \leq [L, K]$ より L/K が有限次拡大なら Galois 拡大に限らず常に成り立つ。

よって以下の Galois 拡大の特徴づけが言える。

$$|\text{Aut}_K(L)| = [L/K] \Leftrightarrow L/K \text{ が Galois 拡大}$$

系 2.12. L/K :有限次拡大のとき $\forall L'/L$ (L の拡大体) で次が成り立つ。 L/K :Galois $\Rightarrow \text{Aut}_K(L) (= \text{Gal}(L/K)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{K \text{ の拡大}}(L, L')$ つまり $\text{Aut}_K(L)$ と $\text{Hom}_K(L, L')$ の間に同型写像が作れる。

Proof. 終域がより大きいほうが写像の行き先が増え、 L'/L から $\text{Aut}_K(L) = \text{Hom}_{K \text{ の拡大}}(L, L) \subset \text{Hom}_{K \text{ の拡大}}(L, L')$ である。そして L/K から L'/K も体の拡大であるので補題 2.8 から M を L, L を L' とみなすことで $|\text{Hom}_K(L, L')| \leq [L : K]$ となる。また、 L/K が Galois 拡大より Artin の定理から $|\text{Aut}_K(L)| = [L : K]$ なので $[L : K] = |\text{Aut}_K(L)| = |\text{Hom}_K(L, L)| \leq |\text{Hom}_K(L, L')| = [L : K]$ と包含関係より $\text{Aut}_K(L) = \text{Hom}_K(L, L) = \text{Hom}_K(L, L')$ である。よって $\text{Aut}_K(L)$ と $\text{Hom}_K(L, L')$ の間には同型写像を作ることができる。

□

2.3 Galois 理論の基本定理

定理 2.13. Galois 理論の基本定理

L/K :有限次 Galois 拡大、 $G = \text{Gal}(L/K)$ とおく。このとき以下が成立する。

(1) L/K の任意の中間体 M に対し L/M は Galois 拡大であり、次の 1 : 1 対応がある。

$$\begin{aligned} \{L/K \text{ の中間体}\} &\xleftrightarrow{1:1} \{G \text{ の部分群}\} \\ M &\longmapsto \text{Aut}_M(L) = \text{Gal}(L/M) \\ L^H &\longleftarrow H \end{aligned}$$

(2) この対応で $M_i \longleftrightarrow H_i$ のとき ($i = 1, 2$)

$$M_1 \subset M_2 \Leftrightarrow H_1 \supset H_2$$

(3) $M \longleftrightarrow H$ のとき $\forall \sigma \in G$ に対し

$$\sigma(M) \longleftrightarrow \sigma H \sigma^{-1}$$

(4) $M \longleftrightarrow H$ のとき

$$M/K \text{ が Galois 拡大} \iff H \triangleleft G (H \text{ が } G \text{ の正規部分群})$$

でありこのとき

$$\text{Gal}(M/K) \cong G/H$$

Proof. \cdot (1)

両側から写像で写して戻したときにもとに戻ることを示す。

$H \mapsto L^H \mapsto \text{Aut}_{L^H}(L)$ となるから $H = \text{Aut}_{L^H}(L)$ を示す。 $M = L^H$ とおくと Artin の定理から $M = L^H$ となる $H \subset \text{Aut}(L)$ が存在しているので $L/M = L/L^H$ は Galois であり、 $H = \text{Gal}(L/M) = \text{Gal}(L/L^H)$ となるので $H = \text{Aut}_{L^H}(L)$ が言えた。

次に $M \mapsto \text{Aut}_M(L) \mapsto L^{\text{Aut}_M(L)}$ となるから $M = L^{\text{Aut}_M(L)}$ を示す。 $H = \text{Aut}_M(L)$ とすると $L^H \supset M$ は定義より明らかでそのことから係数がより大きな範囲で取れることより $[L : L^H] \leq [L : M]$ となる。

$[L^H : K] \leq [M : K]$ を示す。仮定より L/K が、Artin の定理より L/L^H が Galois 拡大なので Rem (2.11) から $[L : K] = |G|, [L : L^H] = |H|$ で $[L : K] = [L : L^H][L^H : K]$ から $|G| = |H|[L^H : K]$ となる。そして H が G の部分群より指数を $(G : H)$ と書くこととすれば $|G| = (G : H)|H|$ であるから $(G : H) = [L^H : K]$ が言える。Lagrange の定理から $r = (G : H)$ としたとき $\phi, \varphi \in G$ において同値関係 $\phi^{-1}\varphi \Leftrightarrow \phi \sim \varphi$ による剰余類分割によって $G = \tau_1 H \cup \dots \cup \tau_r H$ とできる。ここで $\tau_i \in G$ が M に制限されたとしても $\tau_i|_M$ は相異なるといえる。これはもしある代表元同士、つまり同値ではない元において $\tau_i(x) = \tau_j(x), \forall x \in M$ とすると自己同型写像であるから逆写像が考えられて $\tau_i^{-1}\tau_j|_M = \text{id}_M$ である。よってこの写像は M の元を固定するので $\tau_i^{-1}\tau_j \in H = \text{Aut}_M(L)$ となる。これは同値関係の定義から $\tau_i \sim \tau_j$ となるので同値ではない元を取ったことに矛盾する。したがって代表元は M に制限しても全て相異なる。このことから M に制限された G の元 $\tau|_M$ は少なくとも $r = (G : H)$ 個あるため補題 (2.8) から $r = (G : H) = [L^H : K] \leq |\text{Hom}_K \text{ の拡大}(M, L)| \leq [M : K]$ であるので $[L^H : K] \leq [M : K]$ が示された。

よっていま $[L^H : K] \leq [M : K], [L : L^H] \leq [L : M]$ が成り立っている。そして $[L : K] = [L : L^H][L^H : K] = [L : M][M : K]$ から 1 つ目の不等式より $1/[L : L^H] \leq 1/[L : M]$ となるので $[L : L^H] \geq [L : M]$ も成り立つ。したがって $[L : L^H] = [L : M]$ となる。 $L^H \supset M$ で拡大次数が等しいので補題 (1.11) から $L^{\text{Aut}_M(L)} = L^H = M$ となる。

よって両側から写像を送って戻したときにもとの元に戻ってくるためこの対応は 1 : 1 対応になっている。

1 : 1 対応より任意の中間体 M に対して $M = L^H$ となるような G の部分群 H が存在し、それは上の議論より $H = \text{Aut}_M(L)$ となる。したがって定義より L/M は Galois 拡大。実際はこのような H が存在することだけで Artin の定理から L/M が Galois 拡大であることがわかる。

\cdot (2)

双方とも定義より固定する元固定される元を考えれば明らかであるがここでは一つ一つ示していく。

(\Leftarrow)

M_1 の任意の元 x をとる。 L/M_i は Galois 拡大より $M_1 = L^{H_1}, M_2 = L^{H_2}$ より $\forall \sigma \in H_1, \sigma(x) = x$ である。 $H_1 \supset H_2$ より $\forall \sigma \in H_2 \subset H_1, \sigma(x) = (x)$ となるから $x \in L^{H_2} = M_2$ となるので $M_1 \subset M_2$ となり成り立つ。

(\Rightarrow)

H_2 の任意の元 σ をとる。 $H_2 = \text{Gal}(L/M_2)$ より $\forall x \in M_2, \sigma(x) = x$ となり、 $M_1 \subset M_2$ より $\forall x \in M_1 \subset M_2, \sigma(x) = x$ である。したがって $\sigma \in \text{Gal}(L/M_1) = H_1$ より $H_1 \subset H_2$ となり成り立つ。

・ (3)

$\forall \sigma \in G$ に対して $\sigma(M) \mapsto \text{Gal}(L/\sigma(M)), \sigma H \sigma^{-1} = \sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1}$ より 1 : 1 対応から $\text{Gal}(L/\sigma(M)) = \sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1}$ を示せばよい。

$\forall \tau \in \text{Gal}(L/M)$ に対して $\sigma \tau \sigma^{-1} \in \sigma H \sigma^{-1}$ であり、 $\tau|_M = \text{id}_M$ から $\forall x \in M, \sigma \tau \sigma^{-1}(\sigma(x)) = \sigma \tau(x) = \sigma(x)$ となる。よって $\sigma \tau \sigma^{-1}$ は $\sigma(M)$ 上恒等写像になるので $\sigma \tau \sigma^{-1} \in \text{Gal}(L/\sigma(M))$ より τ の任意性から $\sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1} \subset \text{Gal}(L/\sigma(M))$ である。

また、 $g = \sigma^{-1}, N = \sigma(M)$ とおく。このとき $\sigma^{-1} \text{Gal}(L/\sigma(M)) \sigma = g \text{Gal}(L/N) g^{-1}$ となり、これと $\text{Gal}(L/g(N))$ に対して上と全く同じことを考えれば $g \text{Gal}(L/N) g^{-1} \subset \text{Gal}(L/g(N))$ となる。そして左右から g, g^{-1} をかけて、 $g = \sigma^{-1}$ から $g(N) = M$ より $\text{Gal}(L/\sigma(M)) \subset \sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1}$ である。

以上より $\text{Gal}(L/\sigma(M)) = \sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1}$ が示されたのでこの対応が成り立つ。

・ (4)

$\forall \sigma \in G$ に対して (1), (3) より $H \triangleleft G \Leftrightarrow \sigma H \sigma^{-1} = H \Leftrightarrow \sigma(M) = M$ であるから $\sigma(M) = M \Leftrightarrow M/K$ が Galois 拡大を示せば良い。

(\Rightarrow)

$\forall \sigma \in G, \sigma(M) = M$ のとき $\sigma|_M : M \rightarrow M$ となるから σ は M の K 上自己同型写像。これより $\pi : G \rightarrow \text{Aut}_K(M), \sigma \mapsto \sigma|_M$ という写像が作れてこれは G の元を M に制限しているだけなので G の構造を保つから群準同型写像である。 $M \Leftrightarrow H$ の対応があるから $\ker(\pi) = \{\sigma \in G | \sigma|_M = \text{id}_M\} = \text{Aut}_M(L) = H$ より準同型定理から $G/H \cong \text{Im}(\pi) \subset \text{Aut}_K(M)$ となる。よって $|G/H| = |\text{Im}(\pi)| \leq |\text{Aut}_K(M)|$ と (1) の話から $|G/H| = (G : H) = [M : K]$ なので $[M : K] \leq |\text{Aut}_K(M)|$ となるため、系 (2.10) から M/K は Galois 拡大である。

そして有限次 Galois 拡大より $[M : K] = |G/H| = |\text{Aut}_K(M)|$ でこれらは有限であり、自然な準同型 $\theta : G/H \rightarrow \text{Aut}_K(M), \sigma H \mapsto \sigma|_M$ は $\ker(\theta) = \{\sigma H \in G/H | \sigma|_M = \text{id}_M\} = \{\sigma H | \sigma \in H\} = H$ となるので単射。したがって θ は同型写像なので $\text{Gal}(M/K) \cong G/H$ が示された。

(\Leftarrow)

M/K が Galois 拡大とすると L/M の拡大に対して系 (2.12) から $\text{Aut}_K(M) = \text{Hom}_K(M, L)$ となる。よって $\text{Hom}_K(M, L) \subset G$ より $\forall \sigma (\in G) : M \rightarrow L$ は $\sigma \in \text{Hom}_K(M, L) = \text{Aut}_K(M)$ だから K 上の M 自己同型写像となるので $\sigma(M) = M$ となる。

□

3 代数方程式の可解性

以下では K :体 $\supset \mathbb{Q}$ (とくに標数 $\text{char}(K) = 0$) (標数は次の章で詳しく述べる) で $f = \sum_{i=0}^n c_i X^i \in K[X]$ とする。

定義 3.1. 方程式 $f(X) = 0$ が 代数的に解ける とは f の任意の根が f の係数 c_i と加減乗除と $\sqrt[m]{} (m \in \mathbb{N})$ を使って書けること。

定義 3.2. L/K_0 が 冪根拡大 とはある n, l と $a_i \in K_i$ によって

$$\begin{aligned} K_0 &\subset K_1 \subset \cdots \subset K_l = L \\ K_i &= K_{i-1}(\sqrt[n_i]{a_{i-1}}) \end{aligned}$$

となるような形の拡大のこと。

つまり、定義 (3.1) は $K_0 := \mathbb{Q}(c_0, \dots, c_n), \alpha_1, \dots, \alpha_n : f$ の解とするとき、 $\alpha_j \in (K_0$ の冪根拡大) ということ。または、 $K_0(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \subset (K_0$ の冪根拡大) になるということ。

定義 3.3. ある群 G における 交換子 (commutator) とは G の元 x, y によってできる $xyx^{-1}y^{-1}$ という形の元のこと。そしてその群における 交換子群 (commutator subgroup) (G, G) とは G の任意の交換子によって生成される群である。つまり $(G, G) := \langle ghg^{-1}h^{-1} | g, h \in G \rangle$ と定義される。

定理 3.4. 群 G に対してその交換子群は正規部分群であり、商群 $G/(G, G)$ は Abel 群である。さらに (G, G) は G/H が Abel 群になるような任意の正規部分群 H のうち最小の正規部分群である。この $G/(G, G)$ を G の最大 Abel 商といい G^{ab} と書く。

Proof. ・ 正規部分群になること

任意の交換子 $xyx^{-1}y^{-1}$ のどのような共役元も

$$g(xyx^{-1}y^{-1})g^{-1} = (g x g^{-1})(g y g^{-1})(g x g^{-1})^{-1}(g y g^{-1})^{-1}$$

となり交換子として書けるので交換子群に含まれる。 (G, G) の任意の元は交換子の積 $c_1 c_2 \cdots c_k$ で表せられるので

$$g(c_1 c_2 \cdots c_k)g^{-1} = (g c_1 g^{-1})(g c_2 g^{-1}) \cdots (g c_k g^{-1})$$

となり右辺のそれぞれが (G, G) に含まれるので任意の交換子群の元の共役元はその交換子群に含まれるから (G, G) は G の正規部分群。

・ $G/(G, G)$ が Abel 群になること

$x, y \in G$ に対して $xyx^{-1}y^{-1} \in (G, G)$ より $(G, G)xyx^{-1}y^{-1} = (G, G)$ なので $(G, G)xy = (G, G)yx$ となるので $G/(G, G)$ は Abel 群である。

・ 最小になること

G/H が Abel 群で H が正規部分群であるとする。このとき $\forall x, y \in G$ に対して $Hxy = Hyx$ であるから $Hxyx^{-1}y^{-1} = H$ より任意の交換子 $xyx^{-1}y^{-1} \in H$ でなければならない。よって G/H が Abel 群となるような任意の正規部分群 H は (G, G) を含むためそのような正規部分群のうち最小である。

□

定義 3.5. 群 G が可解であるとは交換子群 $(G_j, G_j) = \langle ghg^{-1}h^{-1} | g, h \in G \rangle$ としたときある有限な l で以下のようになること。この包含関係の列を可解列という。

$$G \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_l = 1$$

$$G_j = (G_{j-1}, G_{j-1})$$

定義 3.6. Galois 拡大 L/K が 可解拡大 (solvable extension) とは $\text{Gal}(L/K)$ が可解であること。

Galois 拡大 L/K が Abel 拡大 (abelian extension) とは $\text{Gal}(L/K)$ が Abel 群であること。

定理 3.7. 可解拡大は Abel 拡大を繰り返し行うことでできる拡大である。

Proof. 有限次可解拡大 L/K がありその Galois 群を G とする。このとき G の交換子群 $G_1 = (G, G)$ に対応する体を M_1 とする。ここで Galois 理論の基本定理 (2.13) の (4) から $(G, G) \triangleleft G$ より M_1/K が Galois で $\text{Gal}(M_1/K) \cong G/(G, G)$ なので $G/(G, G)$ が Abel より $\text{Gal}(M_1/K)$ も Abel なので M_1/K は Abel 拡大となる。

同様に L/K の可解列 $G \supset G_1 \supset \cdots \supset G_l = 1$ の $G_i = (G_{i-1}, G_{i-1})$ に対応する部分体 M_i を考えると $G_i \triangleleft G_{i-1}$ より基本定理の (4) から M_i/M_{i-1} は Galois で $G_{i-1}/(G_{i-1}, G_{i-1}) = G_{i-1}/G_i \cong \text{Gal}(M_i/M_{i-1})$ となり同様に $\text{Gal}(M_i/M_{i-1})$ は Abel なので M_i/M_{i-1} は Abel 拡大となる。

1 に対応する体は L より上記のことを $i = l$ まで行えば L/M_l まで Abel 拡大になるので有限次可解拡大 L/K は有限次 Abel 拡大 M_i/M_{i-1} ($1 \leq i \leq l, M_0 = K, M_l = L$) の繰り返しでできる拡大となっている。□

定理 3.8. 有限次 Galois 拡大 M/K について

$$M \text{ は } K \text{ の } \exists \text{ 冪根拡大に含まれる} \Leftrightarrow M/K \text{ が可解拡大}$$

がなりたつので

$$\text{方程式 } f(X) = 0 \text{ が代数的に解ける} \Leftrightarrow K_0(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K_0 \text{ が可解拡大}$$

という代数方程式の可解性に関する必要十分条件が言える。

4 標数 素体

4.1 標数 素体

補題 4.1. 任意の環準同型写像 $f: R \longrightarrow S$ にたいして $\ker(f)$ は R のイデアルになる。

とくに、 S が整域のとき $\ker(f)$ は素イデアルである。

Proof. $G = \ker(f)$ とおく。 $x, y \in G, f(x+y) = f(x) + f(y) = 0 + 0 = 0$ より加法について、 $r \in R, x \in G, f(rx) = f(r)f(x) = r \cdot 0 = 0$ よりスカラー倍について閉じている。したがって R が環であることから $G = \ker(f)$ が R の部分加法群になっていることがわかる。そして $r \in R, x \in G, f(rx) = f(r)f(x) = 0$ より $rx \in G$ より $\ker(f)$ は R のイデアルになる。

S が整域のとき $x, y \in R$ にたいして $xy \in G$ であるとする。このとき $f(xy) = f(x)f(y) = 0$ で S が整域より $f(x) = 0$ または $f(y) = 0 \Rightarrow x \in G$ または $y \in G$ より $\ker(f)$ は素イデアルになる。 \square

補題 4.2. \mathbb{Z} は単項イデアル整域であり素イデアルは (0) もしくは (p) (p は素数) である。

Proof. \mathbb{Z} はかけて 0 になるような元は 0 のみなので整域。

\mathbb{Z} の任意のイデアル I をとり $\forall m \in I$ に対して I 内の絶対値が最小で 0 でない元を n とすると、 $m = k \cdot n + r, (0 \leq r < n)$ となる $k, r \in \mathbb{Z}$ が存在する。そして $m, kn \in I$ から $r = m - kn \in I$ となるが n の最小性から $r = 0$ となるので $\forall m \in I, m = kn$ と表せる。よって $I = (n)$ であるから任意のイデアルは単項イデアルになる。逆に任意の元 n の倍数の集合 $n\mathbb{Z} := \{nk | k \in \mathbb{Z}\}$ は \mathbb{Z} 加群であって \mathbb{Z} の部分整域なので n によって生成される単項イデアル $n\mathbb{Z} = (n)$ となる。これより \mathbb{Z} は単項イデアル整域である。

このときイデアルは $(0), (p), (m)$ の 3 つに分けられる。ただしここで $p > 0$ は素数であり $m > 0$ は合成数である。もし負の数による単項イデアルであったとしても絶対値の等しい値をとることで正の値にできる。

$xy \in (0) \Rightarrow xy = 0$ のとき整域より $x = 0$ または $y = 0$ となるので (0) は素イデアル。 $xy \in (p) \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, xy = pk$ となる。 $k = k_1 \cdot k_2$ となる $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ に対して $x = pk_1 \in (p), y = k_2$ もしくは $x = k_1, y = pk_2 \in (p)$ であるから (p) は素イデアル。 (m) に関しては $m = m_1 \cdot m_2$ となる $m_1, m_2 \in \mathbb{Z} - \{1\}$ に対して $m_1 m_2 \in (m)$ だが $m_1, m_2 \notin (m)$ より素イデアルではない。 \square

定義 4.3. K : 可換体 (可換環でもよい) に対して以下のような自然な環準同型写像 ϕ を考える。

$$\begin{aligned} \phi: \mathbb{Z} &\longrightarrow K \\ n &\longmapsto n \cdot 1_K = \underbrace{1_K + \cdots + 1_K}_n \end{aligned}$$

ここで補題 (4.2) から \mathbb{Z} は単項イデアル整域であるから補題 (4.1) から $\ker(\phi)$ は素イデアルなので p を素数として $\ker(\phi) = (0)$ もしくは (p) となる。

この 0 もしくは p を K の 標数 (characteristic) といい $\text{char}(K), \text{Ch}(K)$ と書く。これは $\ker(\phi) = (p)$ のときこの p は $p \cdot 1_K = 0$ となるような最小の正整数である。

Proof. ϕ が環準同型写像になっていることを確かめる。

この ϕ はまず $n = m$ のとき $\phi(n) = n \cdot 1_K = m \cdot 1_K = \phi(m)$ より写像になっている。そして $\phi(1) = 1 \cdot 1_K = 1_K, \phi(n+m) = (n+m) \cdot 1_K = \underbrace{1_K + \cdots + 1_K}_{n+m} = n \cdot 1_K + m \cdot 1_K = \phi(n) + \phi(m), \phi(n)\phi(m) =$

$(n \cdot 1_K)(m \cdot 1_K) = \underbrace{(1_K + \cdots + 1_K)}_n \underbrace{(1_K + \cdots + 1_K)}_m = \underbrace{1_K + \cdots + 1_K}_{nm} = \phi(nm)$ であるから準同型写像になっている。

そして $\ker(\phi) = (p) = \{pl | l \in \mathbb{Z}\}$ から絶対値が p 以下の元は $\ker(\phi)$ に含まれないので p が $\ker(\phi)$ の 0 でない元で絶対値が最小であるから $\phi(p) = 0$ より p は $p \cdot 1_K = 0$ となる最小の正整数。□

定義 4.4. 任意の体 K は \mathbb{Q} または \mathbb{F}_p と同型な体を含む。この \mathbb{Q}, \mathbb{F}_p と同型な体のことを 素体 (prime field) という。

つまり素体とは真の部分体を含まない体とも言える。

Proof. 上記の設定で $\ker(\phi) = (0)$ のとき単射であるから $\text{Im}(\phi) \cong \mathbb{Z}$ となり $\ker(\phi) = (p)$ のとき準同型定理から $\text{Im}(\phi) \cong \mathbb{Z}/(p) = \mathbb{F}_p$ となる。よって K は体であるから \mathbb{Z} を含む最小の体が \mathbb{Q} で \mathbb{F}_p は p 元体であることより $K \supset \text{Im}(\phi) \cong \mathbb{Q}$ もしくは \mathbb{F}_p より素体を含む。□

系 4.5. $\text{char}(K) = 0$ の体 K の元は無数個存在する。

Proof. $\text{char}(K) = 0$ のとき \mathbb{Q} と同型な体を含むので元の個数は少なくとも \mathbb{Q} 以上であり $|\mathbb{Q}| = \infty$ より成立。□

系 4.6. 有限体 K における素体は \mathbb{F}_p と同型で K は \mathbb{F}_p の有限次拡大であり拡大次数を n としたら $K \cong \mathbb{F}_p^n$ になりたつ。そして有限体の元の個数は素数冪、つまり $|K| = p^n$ となる。 $q = p^n$ として $K = \mathbb{F}_q$ と書く。

Proof. 上記の系で K の元の個数が有限ならば $\text{char}(K) \neq 0$ より $\text{char}(K) = p > 0$ であるので素体は \mathbb{F}_p と同型。簡単のために素体を \mathbb{F}_p と書くこととすると $K \supset \mathbb{F}_p$ であり \mathbb{F}_p は K の演算で閉じているから K は \mathbb{F}_p の拡大体。無限次拡大とすると基底が無数個あることになりそれは有限体であることに反するので K/\mathbb{F}_p は有限次拡大。よって有限次拡大より拡大次数を n とすると $K \cong \mathbb{F}_p^n$ が成り立ち、 $|K| = |\mathbb{F}_p^n| = |\mathbb{F}_p|^n = p^n$ より有限体の元の個数は素数冪になる。□

4.2 Frobenius 自己準同型

定義 4.7. K が可換体で $\text{char}(K) = p > 0$ のとき以下は体の準同型でありこれを K の Frobenius 自己準同型という。

$$\begin{aligned}\phi: K &\longrightarrow K \\ a &\longmapsto a^p\end{aligned}$$

Proof. K が可換体であるから $\phi(ab) = (ab)^p = a^p b^p = \phi(a)\phi(b)$ より積に関しては準同型が成立。

同様に可換であるので $\phi(a+b) = (a+b)^p = \sum_{i=0}^p {}_p C_i a^i b^{p-i}$ となる。 $0 < i < p$ のとき ${}_p C_i = p!/(i!(p-i)!) = p \cdot (p-1) \cdots (p-i+1)/i \cdot (i-1) \cdots 2 \cdot 1$ より p が係数にあるので $\text{char}(K) = p > 0$ よりその項は 0 になる。したがって $i = 0, p$ の項だけ残るので $\phi(a+b) = (a+b)^p = a^p + b^p = \phi(a) + \phi(b)$ となるから結果として ϕ は体の自己準同型になっている。□

定義 4.8. 体 K が 完全体 (perfect field) とは $\text{char}(K) = 0$ または $\text{char}(K) = p > 0$ で Frobenius $\phi: K \longrightarrow K$ が同型 (もともと体の準同型より全射であるということ)

($\Leftrightarrow K$ の非自明な非分離拡大が存在しない) これは示さない。

命題 4.9. 有限体は完全体。

Proof. 系 (4.6) より有限体 $K = \mathbb{F}_q$ にたいして Frobenius $\phi : \mathbb{F}_q \longrightarrow \mathbb{F}_q$ は体の準同型より単射で有限集合より全射だから同型写像となるので有限体は完全体。 \square

例 4.10. 逆に完全体ではない例として以下のようなものがある。

$(\sum a_j X^j / \sum b_i X^i) \in K = \mathbb{F}_p(X)$ (X : 変数, $a_j, b_i \in \mathbb{F}_p, \sum b_i X^i \neq 0$) となっている \mathbb{F}_p 上の有理関数体 K を考える。Frobenius $\phi : K \longrightarrow K, a \longmapsto a^p$ は p 乗準同型写像なのでまず \mathbb{F}_p は完全体より全単射であるから係数は \mathbb{F}_p の元全てを取るのので像の有理関数体の係数は \mathbb{F}_p のままである。そして準同型より $\phi(\sum a_j X^j / \sum b_i X^i) = \sum a_j^p (X^p)^j / \sum b_i^p (X^p)^i \in \text{Im}(\phi) = \mathbb{F}_p(X^p) \subset K$ であるので全射ではない。したがって K は完全体ではない。

5 体上の代数

5.1 K -代数

定義 5.1. 環 A の中心 $Z(A)$ とは任意の A の元と可換な A の元でありつまり $Z(A) := \{x \in A \mid \forall a \in A, ax = xa\}$ となる集合でありこれは A の部分環を成す。

Proof. 部分環を成すことを示す。

結合則や分配則は A が環であることより保証される。 $\forall a \in A$ について単位元は定義より $a1 = a = 1a, a0 = 0 = 0a$ より中心に含まれる。また、 $\forall x, y \in Z(A), a(x+y) = ax+ay = xa+ya = (x+y)a, a(xy) = (ax)y = (xa)y = x(ay) = x(ya) = (xy)a$ より加法乗法について閉じているから $Z(A)$ は A の部分環である。 \square

定義 5.2. K -体とする。(可換環でもよい)

このとき K -代数 (K -algebra) A とは以下の同値な条件のうち一つを、すなわち全てを満たすような零環にならないものである。

(1). 単位的環であって環準同型 $\phi: K \rightarrow A$ が与えられており $\text{Im}(\phi) \subset Z(A) = (A \text{ の中心})$ となるもの。 K が体であれば $\text{Im}(\phi) = K \subset Z(A) \subset A$ とみなすことができる

(2). K -加群であり環としての構造を持ち、積が任意の $k \in K, x, y \in A$ にたいして $k(xy) = (kx)y = x(ky)$ が成り立つような K -双線型となるもの。

とくに K 倍できてそれが双線型であり K が体であれば K -ベクトル空間とみなすこともできる。そして $[A:K] := \dim_K(A)$ を A の K 上の次数という。

K -代数 A を $K\text{-alg}, \phi: K \rightarrow A$ と書くときもある。

Proof. 両方共環であることは共通しているから $\text{Im}(\phi) \subset Z(A)$ と K -加群であり積が上記のように成り立つことが同値であることを示せば良い。

まずスカラー乗法を $\cdot: K \times A \rightarrow A, (k, a) \mapsto \phi(k)a$ と定めれば $ka := \phi(k)a$ とすることで K によるスカラー乗法が定義でき、これにより K -加群の構造を持つことができる。

また、 $\text{Im}(\phi) \subset Z(A)$ より A の結合則から $\forall a, b \in A, k(ab) = \phi(k)(ab) = (\phi(k)a)b = (ka)b = (a\phi(k))b = (ak)b = a(\phi(k)b) = a(kb)$ より成り立つ。双線型であることも環 A の定義から明らか。

逆は環準同型 $\phi: K \rightarrow A$ を適切につくれば $k(xy) = (kx)y = x(ky)$ より像は中心に含まれるので成り立つ。

K が体のとき Note (1.8) から ϕ が単射準同型より $K = \text{Im}(\phi)$ と同一視できるため K -代数 A は実際に K を部分環として含んでいる。 \square

例 5.3. K を体としたときその多変数多項式環 $A := K[X_1, \dots, X_n]$ は可換環で K 係数より $K\text{-alg}$ である。また、 I を A のイデアルとしたときその剰余環 $K[X_1, \dots, X_n]/I$ も同様の理由で $K\text{-alg}$ である。

L_i/K を K のある体拡大とするとその拡大の直積 $A := L_1 \times \dots \times L_n$ はそれぞれの成分ごとに拡大体の演算によって L_i/K より $a \in K$ 倍を $(a, \dots, a) \in K \times \dots \times K$ と同一視することで $K\text{-alg}$ とみなせる。

以上の2つはもともと可換な構造の上であったのでそのまま中心に埋め込めたが $A = M_n(K)$ とした行列

環は非可換でありこのときは以降のように定めることで非可換な $K\text{-alg}$ になる。すなわち、

$$K \longrightarrow A$$

$$a \longmapsto \begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix}$$

となる環準同型でこの像は単位行列の定数倍なので A の中心に入るため $K\text{-alg}$ になる。

以下では K -代数は断らない限り全て可換であるとする。

定義 5.4. $K\text{-alg}, \phi: K \longrightarrow A, \psi: K \longrightarrow B$ があるとする。このとき K -代数の準同型 $\varphi: A \longrightarrow B$ とは環準同型であって $K\text{-alg}$ としての構造と可換なもの、つまり $\psi = \varphi \circ \phi$ となるもののこと。

これと同値なものとして環準同型 φ が K -加群の準同型写像であることという定義でも良い。

Proof. 同値性を示す。

$\psi = \varphi \circ \phi$ となっていて $\forall x, y \in A, \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y), \varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ が環準同型であることより成り立つ。 $k \in K$ について $K\text{-alg}$ のスカラー倍の定義から $\phi(k) \cdot 1 = k \in A, \psi(k) \cdot 1 = k \in B$ とみなせる。このとき $\varphi(k) = \varphi(\phi(k) \cdot 1) = \varphi \circ \phi(k) \cdot \varphi(1) = \varphi \circ \phi(k) = \psi(k) = \psi(k) \cdot 1 = k$ より K の元について不変となる。

□

5.2 元の添加

定義 5.5. L/K : 体の拡大、 $S: L$ の部分集合のとき、 $K(S) := (S$ を含む最小の K の拡大体 $\subset L)$ と定義し、これを K 上 S で生成される部分体という。 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ なら $K(S) = K(a_1, \dots, a_n)$ と書く。

S, T と 2 つの L の部分集合があるときその 2 つのを含む最小の K の拡大体は集合 $S \cup T$ を含むと考えれば良いので $K(S \cup T) = K(S)(T) = K(T)(S)$ となりこれを $K(S, T)$ と書く。

定義 5.6. L/K が有限生成とは $L = K(S)$ となる有限集合 $S \subset L$ が存在すること。

特に一元集合で生成されるとき L/K は単生、単元生成 (monogenic)という。

Rem 5.7. 有限次拡大 \Rightarrow 有限生成

Proof. $[L:K] = n$ とするとき L の K 上の基底を $\{w_1, \dots, w_n\}$ とする。 $K(w_1, \dots, w_n)$ はこの基底を含む体なので K 上の線形結合も含むことを考えればこれは L と一致するから有限生成。 □

ここで逆は成り立たない。 $K(X), X$: 変数とするとこれは有理関数体で単生だが $1, X, \dots, X^n, \dots$ が全て異なるので K の無限次拡大となるような反例があるためである。

5.3 体の合成

定義 5.8. $M_1/K, M_2/K$: 体の拡大としたときこの 2 つの合成、合成体、合成拡大 (a composite extension) とは三組 (L, u_1, u_2) で

1. L は K の拡大体。

2. $u_i : M_i \longrightarrow L$ は K の拡大の準同型で L は $u_1(M_1) \cup u_2(M_2)$ により生成される。

となるようなもののことである。したがって写像のとり方の自由性から $M_1/K, M_2/K$ に対しこれらの合成はいくつもありえる。

系 5.9. $M_1/K, M_2/K$: 拡大で $(M_1 \otimes_K M_2)$ の極大イデアルを \mathfrak{m} としたとき $L = (M_1 \otimes_K M_2)/\mathfrak{m}$ は K の拡大でありかつ M_1, M_2 を埋め込める。またこれより $(M_1 \otimes_K M_2)$ は $M_1 - alg, M_2 - alg$ である

Proof. 拡大の準同型を $u_i : K \longrightarrow M_i$ とする。そして $v_1 : M_1 \longrightarrow L, x \longmapsto u_1(x) \otimes 1 \pmod{\mathfrak{m}}$ と $v_2 : M_2 \longrightarrow L, x \longmapsto 1 \otimes u_2(x) \pmod{\mathfrak{m}}$ を考える。 $(\pmod{\mathfrak{m}})$ を除けば $M_1 - alg, M_2 - alg$ であることがわかる。これは体の準同型になるから単射でこれを拡大の準同型と取れば $L/M_1, L/M_2$ は拡大になり、 $v_1 \circ u_1 = v_2 \circ u_2$ を満たし K の拡大でもある。

□

6 代数拡大

6.1 代数的、超越的

K : 体、 A : K -代数とする。

定義 6.1. $x \in A$ が K 上代数的、代数的数 (algebraic) とは

$$\exists f (\neq 0) \in K[X] : K \text{ 係数多項式 s.t. } f(x) = 0$$

となることで代数的でないときこれを超越的、超越的数 (transcendental) という。

命題 6.2. $x \in A$ に対して以下は同値

- (1) $1, x, x^2, \dots$ が K 上一次独立ではない
- (2) $K[x]$ が有限次元
- (3) x は K 上代数的

Proof. $3 \Rightarrow 1$

x が代数的なので、ある $f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in K[X]$ ($0 \neq a_i \in K$) において $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = 0$ より $1, x, x^2, \dots$ は一次独立ではない。

$1 \Rightarrow 3$

一次独立でないのである有限な m で $\sum_{i=0}^m a_i x^i = 0$ となる全ては 0 ではない $a_i \in K$ が存在するのでこれを $f = \sum_{i=0}^m a_i X^i$ とすれば $f \in K[X], f(x) = 0$ となるため x は K 上代数的である。

$2 \Leftrightarrow 3$

$x \in A$ に対し写像 $\phi: K[X] \rightarrow A, X \mapsto x$ は環準同型であり、 $\exists f \in K[X], \ker(\phi) = (f)$ となる。このとき x : 代数的 $\Leftrightarrow f \neq 0$ が定義より言える。したがって環準同型定理より $\text{Im } \phi = K[x] \cong K[X]/(f)$ となる。そして $K[X]/(f)$ は $\deg(f) = n$ 以上の次数の多項式を割り算によりその次数以下にするから $K[X]/(f) = \{a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} | a_i \in K\}$ で表せるので $K[x]$ も同型より有限次元である。

とくに $1, x, \dots, x^{n-1}$ は $n-1$ 次以下の $K[x]$ の元が一次結合で表わせ、一次独立であるから K 上の $K[x]$ における基底となる。

□

定義 6.3. x が K 上代数的数のとき $f(x) = 0$ となる $f(\neq 0) \in K[X]$ のうち次数が最小で monic (最高次の係数が 1) であるものを x の K における最小多項式 (minimal polynomial) という。 $\deg(f)$ を x の次数ともいう。

$f \in K[X]$ に対して $f = gh \Rightarrow f = g$ または $f = h$ となるとき f を既約多項式という。

例 6.4. $a \in \mathbb{Q}$ で平方数でないものにおいて $\sqrt{a} \in \mathbb{C}$ の \mathbb{Q} の最小多項式は $X^2 - a \in \mathbb{Q}[X]$ である。

e, π は \mathbb{Q} 上超越的である。

定義 6.5. K : 可換環、 A : K -alg のとき $x \in A$ が K 上整 (integral) とは

$$\exists f (\neq 0) \in K[X] : K \text{ 係数 monic 多項式 s.t. } f(x) = 0$$

となること。

例 6.6. $\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}$ は $X^2 - 2, X^2 - 1/2$ を考えれば \mathbb{Q} 上整。

しかし、 $1/\sqrt{2}$ は \mathbb{Z} 上で代数的であるが $2X^2 - 1 \in \mathbb{Z}[X]$ の根で monic にならないので \mathbb{Z} 上整ではない。

命題 6.7. K : 体、 $A: K\text{-alg}$ で $x \in A$ が代数的、その最小多項式を $f \in K[X]$ とする。

このとき以下が成立。

- (1) $g \in K[X]$ について $g(x) = 0 \Leftrightarrow f|g$
- (2) $K[X]/(f) \xrightarrow{\sim} K[x], X \pmod{f} \mapsto x$ とできてとくに $1, x, \dots, x^{n-1}$ は $K[x]$ の基底 ($n = \deg f$)
- (3) $x \in A^\times \Leftrightarrow f(0) \neq 0$ でありこのとき $x^{-1} \in K[x]$

Proof. (1)

Euclid の割り算から $g = q \cdot f + r$ となる $q, r \in K[X], \deg r < \deg f$ がある。 $g(x) = 0$ より $q(x)f(x) + r(x) = r(x) = 0$ となるが $\deg f$ の最小性から $r = 0$ であるので $g = q \cdot f$ となるため $f|g$ である。

逆は $f|g \Rightarrow g = f \cdot (x \text{ の多項式})$ で $f(x) = 0$ より従う。

(2)

命題 (6.2) の (2) より従う。

(3)

\Rightarrow

$f = X^n + a_{n-1}X^{n-2} + \dots + a_1X + a_0$ とする。 $x \in A^\times$ より $f(x) = 0$ から

$$-\frac{a_0}{x} = -(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1)$$

であり $\deg f$ の最小性からこの右辺は $\neq 0$ なので $-a_0/x \neq 0 \Rightarrow a_0 \neq 0$ より $f(0) = a_0 \neq 0$ となる。

\Leftarrow

$f(0) = a_0 \neq 0$ とすると $a_0 \in K^\times$ より

$$1 = x \cdot \frac{-(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1)}{a_0}$$

となりこの $-(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1)/a_0$ は $K[x]$ の元であり x の逆元 x^{-1} になるので $x \in A^\times$ と $x^{-1} \in K[x]$ が言えた。 \square

6.2 代数拡大

定義 6.8. 体の拡大 L/K が代数的 (algebraic) とは $\forall x \in L$ が K 上代数的であること。

超越的 (transcendental) とは代数的でないこと

Rem 6.9. L/K : 有限次拡大 $\Rightarrow L$ が代数的

Proof. $\forall x \in L$ に対して $1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$ を考えると $[L:K]$ が有限よりこれは K 上一次独立でないからある有限な n で $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0$ となるような全て $a_0, \dots, a_{n-1} \in K$ が存在する。よって $f = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$ とすればこれは x を根にもつ $f \in K[X]$ より x は代数的でしたがつて L は代数的。 \square

一般に逆は成り立たない。

例 6.10. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots)/\mathbb{Q}$ は代数的だが有限次ではない。

Fact 6.11. 後に示す $x \in K$ の最小多項式 f に対して $[K(x) : K] = \deg_K f$ を認めれば $[\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n}) : \mathbb{Q}] = 2^n$ が示される。上記の例ではこれを用いれば有限次ではないことがわかる。

補題 6.12. $A : K - alg$ で整域とする。このとき $x \in A$ が K 上代数的ならば x は $K[x]$ で可逆。

Proof. x の最小多項式を f とすると命題 (6.7) の (2) より $K[x] \xrightarrow{\sim} K[X]/(f)$ である。 $x \in A$ より $K[x] \subset A$ より $K[x]$ も整域だから $K[X]/(f)$ も整域。したがって (f) は素イデアルなので f は既約多項式より $f(0) \neq 0$ である。これより命題 (6.7) の (3) から $x \in A^\times, x^{-1} \in K[x]$ となる。 \square

命題 6.13. L/K において次は同値。

- (1) L/K は代数的
- (2) L/K の任意の部分 $K - alg$ は体。

Proof. (1) \Rightarrow (2)

任意の部分 $K - alg, A$ をとる。これは $A \subset L$ より整域であるので補題 (6.12) より $\forall x \in A \subset L$ に対して L/K が代数的で x が代数的なので x は $K[x] \subset A$ で可逆。したがって A は体。

(2) \Rightarrow (1)

L の任意の元 x をとる。このとき $K[x]$ は $K - alg$ より仮定から体なので $x^{-1} \in K[x]$ をもつ。よってある n 次多項式で $x^{-1} = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ と書ける。 $1 = x \cdot x^{-1} = a_n x^{n+1} + \dots + a_0 x$ で $a_n \in K^\times$ より $f = X^{n+1} + \dots + a_0/a_n X = 1/a_n$ とすればこれは $f \in K[X]$ で $f(x) = 0$ となるから x は K 上代数的。よって L/K は代数的。 \square

命題 6.14. L/K において $x \in L$ が K 上代数的ならばその最小多項式を f として $K[x] = K(x) \cong K[X]/(f)$ であり、 $[K(x) : K] = \deg_K f$ となる。

Proof. 命題 (6.13) と (6.7) より $K[x]$ は体であり $K[x] \cong K[X]/(f)$ で $\dim_K K[x] = n = \deg f$ が成り立つ。よって体 $K(x) = \{q(x) | q(X) \in K[X]\}$ の定義より $K(x) = K[x]$ となる。そして $\dim_K K[x] = \dim_K K(x) = [K(x) : K] = n = \deg_K f$ である。 \square

系 6.15. L/K : 有限次拡大は $L = K(a_1, \dots, a_r), (a_i \in L)$ の形で $K \subset K(a_1) \subset \dots \subset K(a_1, \dots, a_r) = L$ と体の拡大の列ができる。

a_i の $K(a_1, \dots, a_{i-1})$ 上の拡大次数を n_i とし最小多項式を $f_i \in K(a_1, \dots, a_{i-1})[X]$ とすると $[L : K] = n_1 \dots n_r$ で $\{a_1^{\nu_1} \dots a_r^{\nu_r} | 0 \leq \nu_i \leq n_i\}$ は L の K 上の基底となる。

$$L \cong \left(\left(\left(\frac{K[X_1]}{(f_1)} \right) [X_2]/(f_2) \right) \dots \right) [X_r]/(f_r)$$

が成り立つ。

Proof. 命題 (6.14) を繰り返し用いれば良い。 \square

補題 6.16. K 上代数的数 x, y に関して、 $x + y, xy, x - y$ も代数的であり、 y が 0 で無いのなら x/y も代数的である。

Proof. $x + y, xy, x - y, xy \in K(x, y)$ であり、 x, y の最小多項式をそれぞれ f, g とするとともに有限次。したがって $K(x, y) = K(x)(y)$ は拡大次数が最小多項式の次数と等しいことから有限次拡大である。よって K

上の代数拡大であるのでそこに含まれる元は K 上代数的。 \square

命題 6.17. $L/M/K$ を拡大の列とするとき以下が成り立つ。

$$L/K \text{ が代数的} \Leftrightarrow L/M, M/K \text{ がともに代数的}$$

Proof. (\Rightarrow) は $M \supset K$ より明らか。

(\Leftarrow)

$\forall x \in L$ が K 上代数的であることを示す。 x は M 上代数的なので $\exists f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in M[X], f(x) = 0$ となる。また、 $a_i \in M$ よりこれは K 上代数的であるので命題 (6.14) で L を M と、 x を a_i とみれば $K' = K[a_0, \dots, a_n]$ は体で $K(a_0, \dots, a_n)$ と等しい。したがって K の有限次拡大であり $f \in K'[X]$ で x は K' 上代数的である。同様に命題 (6.14) から $K'[x] \cong K'[X]/(f)$ となる。ここでこの右辺は命題 (6.7) の (2) から $\dim_{K'} K'[X]/(f) = n$ なので左辺は K' 上有限次拡大。そして K' は K 上有限次拡大であったので $K'[x]$ は K 上有限次拡大。したがって Rem(6.9) より $K'[x]/K = K[a_1, \dots, a_n, x]/K$ は代数拡大なので $x \in K'[x] \subset L$ は K 上代数的。 \square

命題 6.18. $M_1/K, M_2/K$: 代数拡大 \Rightarrow 任意の合成拡大 (L, u_1, u_2) は K 上代数的

Proof. $\forall x \in M_1$ は K 上代数的より最小多項式 $f = \sum_{i=0}^n a_i X^i, f(x) = 0$ が存在する。そして u_1 は K -準同型より $0 = u_1(f(x)) = u_1(\sum_{i=0}^n a_i x^i) = \sum_{i=0}^n u_1(a_i) u_1(x)^i = \sum_{i=0}^n a_i u_1(x)^i = f(u_1(x))$ となるから $u_1(x)$ は K 上代数的になる。 u_2 も同様に考えると $u_1(M_1), u_2(M_2)$ は K 上代数的である。補題 (6.16) よりこの集合間の四則演算は全て代数的なので $L = K(u_1(M_1), u_2(M_2))$ は代数的である。 \square

命題 6.19. $M_1/K, M_2/K$:

定義 6.20. L/K : 拡大とする。

K の L の中での相対的代数閉包 (relative algebraic closure) M とは

$$M := \{x \in L \mid x \text{ は } K \text{ 上代数的}\}$$

となるもの。これを \overline{K} と書くこともある。

また、 K が L の中で (相対的に) 閉じているとは $K = M$ となること。

命題 6.21. 上の定義における相対的代数閉包 M は体。

Proof. 補題 (6.16) より和と積について M は閉じている。

$K(x) \subset M$ であり、 $K(x)$ は x を含む最小の L の部分体より $x^{-1}, -x \in K(x) \subset M$ なので逆元も存在する。 \square

例 6.22. K の $K(X)$ (X は変数) の中での相対的代数閉包は X は変数なのでそれが含まれると K 上代数的でなくなるため K である。

\mathbb{R} の \mathbb{C} の中での相対的代数閉包は \mathbb{C} と一致するが \mathbb{Q} の \mathbb{C} の中での相対的代数閉包 $\overline{\mathbb{Q}}$ は \mathbb{C} と一致しない。

7 代数閉体、分解体、代数閉包

7.1 代数閉体

命題 7.1. 体 K について次は同値。

- (AC1) $\forall f \in K[X] - K$ は $K[X]$ において一次の積に分解できる。
- (AC2) $\forall f \in K[X] - K$ は K において少なくとも一つの根を持つ。
- (AC3) 任意の $K[X]$ の既約多項式は一次。
- (AC4) K の代数拡大は K のみ。

Proof. (1) \Rightarrow (2)

一次の積に分解できればそれが根になるので明らか。

(2) \Rightarrow (1)

f のある根を $k \in K$ とすると $f(X) = (X - k)g(X)$ となる $g \in K[X]$ がある。この g に対しても同様なことをして繰り返せば $f = (X - k_1)(X - k_2) \cdots (X - k_n)$ と一次の積に分解できる。

(1) \Leftrightarrow (3)

K 上の既約多項式はそれ以上 $K[X]$ 上で分解できない多項式なので全ての $f \in K[X] - K$ が一次に分解できるので既約多項式は一次。また、分解は既約多項式まで分解できるので一次の積に分解できる。

(3) \Rightarrow (4)

任意の代数拡大 L/K をとると $\forall x \in L$ に対し最小多項式 $f \in K[X]$ がある。これは既約多項式なので (3) より $f(x) = x - k, k \in K$ となっているから $x = k \in K$ より $L = K$ なので代数拡大は K のみ。

(4) \Rightarrow (1)

任意の $f \in K[X] - K$ における任意の既約成分を g とする。 g のある一つの根を x とするとこの元は K 上代数的であるから $[K(x) : K] = \deg_K g$ で有限次拡大なので $K(x) \cong K[X]/(g)$ は K 上の代数拡大。(4) よりこれは K なので $\deg_K g = \dim_K(K[X]/(g)) = \dim_K K = 1$ だから $\deg_K g = 1$ より一次式になる。よって任意の既約成分が一次式になるので $f = (\text{一次の積})$ となる。 \square

定義 7.2. 体 K が上記の命題 (7.1) の (AC1) \sim (AC4) を成り立たせる、つまり全てを満たすとき K を代数閉体 (algebraically closed) という。

相対的代数閉包とはことなり K を含む上の体が最初からは無い。

例 7.3. 代数学の基本定理は \mathbb{C} が代数閉体であることを述べている。

命題 7.4. Ω/K : 拡大、 Ω : 代数閉体とする。このとき K の Ω の中での相対的代数閉包 \overline{K} は代数閉体。

Proof. \overline{K} が (AC2) を満たすことを示す。

$\forall f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \overline{K}[X] - \overline{K} \subset \Omega[X] - \Omega$ は Ω が代数閉体よりある根 $x \in \Omega$ が存在する。 $a_i \in \overline{K}$ より K 上代数的だからそれぞれの最小多項式の次数を考えれば $K' = K(a_0, \dots, a_n)$ は K 上有限次拡大。 x は K' 上代数的より $K'(x)$ は K' 上有限次拡大。この有限次拡大を合わせれば $K(a_0, \dots, a_n)(x)/K = K(a_0, \dots, a_n, x)/K$ は有限次拡大なので代数拡大。よって x は K 上代数的なので $x \in \overline{K}$ より \overline{K} に少なくとも一つの根を持っている。 \square

定理 7.5. Steinitz の定理

$L/K, \Omega/K$: 拡大とし、 L は代数拡大、 Ω は代数閉体とする。このときある K の拡大の準同型写像 $\varphi: L \rightarrow \Omega$ が存在する。(任意の代数拡大は Ω に埋め込める)

Proof. 系 (5.9) から $\Omega' := (L \otimes_K \Omega)/\mathfrak{m}$ は L, Ω の拡大体である。

この拡大の準同型を $\phi: L \rightarrow \Omega', \psi: \Omega \rightarrow \Omega'$ とするとこれは体の準同型より単射。単射準同型なのでそれぞれの像において構造を保つことを考えれば $\phi(L)$ は $\phi(K)$ 上代数拡大、 $\psi(\Omega)$ は代数閉体。よって $\psi(K)$ 上代数的な元を $\psi(\Omega)$ はすべて含む。また写像が可換より $\psi(K) = \phi(K)$ なので $\psi(\Omega)$ は $\phi(K)$ 上代数的な元をすべて含む。よって $\phi(L) \subset \psi(\Omega)$ で単射なので $\psi^{-1}\phi: L \rightarrow \Omega$ となる体の準同型をつくれる。 \square

7.2 分解体

定義 7.6. K : 体で $(f_i)_{i \in I}$: 多項式の族 ($f_i \in K[X] - K$) に対し、 K の拡大体 L が $(f_i)_{i \in I}$ の最小分解体 (minimal splitting field) (もしくはここでは MS 体) とは以下の条件を満たすものである。

- (1) $\forall i \in I, f_i$ は $L[X]$ で一次の積に分解される。(ここではこの条件が成り立つものを分解体という)
- (2) $L = K(\forall i \in I, \forall f_i \text{ の根})$ となる、つまり f_i の根で K 上生成される最小の体であること。

Rem 7.7. $(f_i) = (f_1, \dots, f_n)$ のように有限個の多項式の場合、 $f = f_1 \cdots f_n$ とすると (f_i) の MS 体 = f の MS 体である。

命題 7.8. K 上の多項式の族 $\forall (f_i)_{i \in I}$ に対しその MS 体は存在し、それは K 上の同型を除き一意である。

Proof. $(f_i)_{i \in I} = (f)$ のときを考える。体上の多項式なので最高次の係数を 1 にしても一般性を失わない。 $f = X^n + \sum_{i=1}^n a_i X^{n-i}, a_i \in K$ とおき、 $A_i := K[X_1, \dots, X_n]/I$ を考えるとこれは K -alg である。ただしここで I とは $K[X_1, \dots, X_n]$ において $s_k - (-1)^k a_k$ ($k = 1, \dots, n$) で生成されるイデアルとする。 s_k は X_1, \dots, X_n の k 次基本対称式でありつまり $(X - X_1) \cdots (X - X_n) = X^n - s_1 X^{n-1} + \cdots + (-1)^n s_n$ を満たすものである。 $x_j := X_j \bmod I = X_j + I$ とおき、 x_j の k 次基本対称式を上と同様に t_k とするとき $t_k = s_k + I$ であり、 $s_k - (-1)^k a_k \in I \Leftrightarrow s_k + I = (-1)^k a_k + I$ なので

$$\begin{aligned}
 (X - x_1) \cdots (X - x_n) &= X^n - t_1 X^{n-1} + \cdots + (-1)^n t_n \\
 &= X^n + \sum_{i=1}^n (-1)^i t_i X^{n-i} \\
 &= X^n + \sum_{i=1}^n (-1)^i (s_i + I) X^{n-i} \\
 &= X^n + \sum_{i=1}^n (-1)^i ((-1)^k a_k + I) X^{n-i} \\
 &= X^n + \sum_{i=1}^n (a_k + I) X^{n-i} \\
 &= X^n + (a_1 + I) X^{n-1} + \cdots + (a_n + I)
 \end{aligned}$$

となる。これより f は $A_i[X]$ において $f = (X - x_1) \cdots (X - x_n)$ と分解される。 A_i の任意の極大イデアル \mathfrak{m} に対し $L_i = A_i/\mathfrak{m}$ とおくとこれは体で標準的射像を考えれば f は $L[X]$ 上で一次の積に分解される。 f の根が $x_1, \dots, x_n (= X_1, \dots, X_n \bmod I)$ より A_i の作り方からこの L_i は (f) の MS 体である。

一般の $(f_i)_{i \in I}$ に対しては $L := (\otimes_{i \in I} A_i) / (\text{極大イデアル})$ とするとこれは体で (f_i) の MS 体なので存在性が示された。

一意性は定義 (2) より従う。 \square

7.3 代数閉包

定義 7.9. 体 K の 代数閉包 (algebraic closure) とは K の代数拡大であって代数閉体であるもののこと。これを代数閉な拡大ともいう。

つまり、任意の元に対して最小多項式が存在して、さらに任意の多項式に対してその根が全て含まれる体である。

命題 7.10. Steinitz の定理

任意の体に対しその代数閉包が存在してそれは K 上の同型を除き一意の。

Proof. $(f_i)_{i \in I} = K[X] - K$ として命題 (7.8) を適用すればよい。 \square

系 7.11. $K, K' : \text{体}, \Omega, \Omega' : \text{それらの代数閉包}$ としたとき同型 $\psi : K \xrightarrow{\sim} K'$ に対しそれを延長する同型 $\phi : \Omega \xrightarrow{\sim} \Omega'$ が存在する

Proof. 前述の命題 (7.10) の証明より代数閉包は $(f_i)_{i \in I} = K[X] - K \cong K'[X] - K'$ の MS 体なのでその一意性から同型 $\phi : \Omega \xrightarrow{\sim} \Omega'$ が存在する。 \square

8 etale 代数

8.1 対角化

以下ではとくに述べない限り K を可換体とする。

定理 8.1. $A : K\text{-alg}$ と $L/K : \text{拡大}$ としたときに集合 $\mathcal{H} := \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$ は L -ベクトル空間 $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)$ の中で L 上一次独立。

Proof. A を $K\text{-vect.sp}$ として見ればこれは加法群であるので Dedekind の補題から従う。 \square

補題 8.2. $\dim_L(\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)) = [\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L) : L] = [A : K]$ が成り立つ。

Proof. $A_{(L)} := L \otimes_K A$ としてその双対空間を $(A_{(L)})^* := \text{Hom}_L(A_{(L)}, L)$ とする。以下簡単のため $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)$ を $\text{Hom}(A, L)$ と書く。 $\bar{\cdot} : (A_{(L)})^* \rightarrow \text{Hom}(A, L), u \mapsto \bar{u}$ で $\bar{u} : A \rightarrow L, x \mapsto \bar{u}(x) = u(1 \otimes x)$ とすればこの $\bar{\cdot}$ は同型であり双対空間であることから $\dim_L A_{(L)} = \dim_L (A_{(L)})^* = \dim_L \text{Hom}(A, L)$ である。 $\dim_L A_{(L)} = \dim_K A$ より従う。 \square

系 8.3. 上の状況において $h(L)(= h_A(L)) := |\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)| \leq [A : K]$ が成り立つ。

Proof. $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$ は $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)$ で一次独立より $h(L) \leq \dim_L(\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L))$ である。補題 (8.2) の $\dim_L(\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)) = [A : K]$ より従う。 \square

定義 8.4. $K\text{-alg}$ の A が対角化可能 (diagonalizable) とは $\exists n \geq 1, A \cong K^n$ であること。とくに $n = [A : K]$ である。 K^n は成分ごとの演算を行う直積代数である。

Proof. $n = [A : K]$ であることは A を K -ベクトル空間と見ることからわかる。 \square

定義 8.5. A が拡大 L/K により対角化される (diagonaled by L) とは $L\text{-alg}$ の $L \otimes_K A$ が対角化可能であること。

定義 8.6. A が K 上 etale とは \exists 拡大 L/K により対角化されること。

Rem 8.7. (e_1, \dots, e_n) が $K^n (\cong A)$ の標準基底とすると成分ごとの演算を行うから $e_i^2 = e_i, e_i e_j = 0 (i \neq j), e_1 + \dots + e_n = 1_A$ となる。

命題 8.8. 有限次 $K\text{-alg}$ A について次は同値 ($n = [A : K]$ とする)

- (1) A は対角化可能。
- (2) A の K 上の基底 (e_1, \dots, e_n) で $e_i^2 = e_i, e_i e_j = 0 (i \neq j)$ を満たすものが存在する。
- (3) $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, K)$ は $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, K)$ を生成する。

Proof. (1) \Rightarrow (2) は Rem (8.7) より成立。

(2) \Rightarrow (1)

$A_i = K e_i$ とすると $A_i \cong K$ で $A = \{k_1 e_1 + \dots + k_n e_n | k_i \in K\} = A_1 \times \dots \times A_n \cong K^n$ より対角化可能。

(3) \Rightarrow (1)

有限次 $K\text{-alg}$ なので $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, K) = \{\pi_1, \dots, \pi_n\}$ とする。これは定理 (8.1) より一次独立で

仮定から全体を張るので $\text{Hom}_{K-\text{vect.sp}}(A, K)$ の基底になる。そしてそれを並べた K -代数の準同型 $\pi := (\pi_1, \dots, \pi_n) : A \longrightarrow K^n, a \longmapsto (\pi_1(a), \dots, \pi_n(a))$ とする。 \square

系 8.9. 系 (8.3) における $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| \leq [A : K]$ について

$$|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = [A : K] \Leftrightarrow A \text{ は } L \text{ で対角化される。}$$

Proof. $\pi : \text{Hom}_{K-\text{vect.sp}}(A, L) \longrightarrow \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(L \otimes_K A, L), u \longmapsto \pi u$ とし、 L -線形写像で $\pi u : A_{(L)} \longrightarrow L, (1 \otimes x) \longmapsto (\pi u)(1 \otimes x) := u(x)$ とする。 π は準同型で $\pi u = 0 \Rightarrow \forall x \in A, u(x) = 0 \Leftrightarrow u = 0$ で単射。 $\forall v \in \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(A_{(L)}, L), u(x) := v(1 \otimes x)$ とおけば $\pi u = v$ となるので全射より π は同型なので $\dim_L \text{Hom}_{K-\text{vect.sp}}(A, L) = \dim_L \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(L \otimes_K A, L)$ が成立する。

また、始域と終域を代数の準同型に制限して $\pi : \text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L) \longrightarrow \text{Hom}_{L-\text{alg}}(L \otimes_K A, L)$ でも同様に全単射になるから $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = |\text{Hom}_{L-\text{alg}}(L \otimes_K A, L)|$ である。

命題 (8.8) の (1) \Leftrightarrow (3) で A を $L \otimes_K A$ で置き換えて、補題 (8.2) も用いれば

$$\begin{aligned} A \text{ は } L \text{ で対角化される} &\Leftrightarrow L \otimes_K A \text{ は対角化可能} \\ &\Leftrightarrow \text{Hom}_{L-\text{alg}}(A_{(L)}, L) \text{ は } \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(A_{(L)}, K) \text{ を生成する。 (基底になる)} \\ &\Leftrightarrow |\text{Hom}_{L-\text{alg}}(A_{(L)}, L)| = \dim_L \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(A_{(L)}, K) \\ &\Leftrightarrow |\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = |\text{Hom}_{L-\text{alg}}(A_{(L)}, L)| \\ &\quad = \dim_L \text{Hom}_{L-v.s}(A_{(L)}, L) = \dim_L \text{Hom}_{K-v.s}(A, L) = [A : K] \\ &\Leftrightarrow |\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = [A : K] \end{aligned}$$

\square

命題 8.10. K -alg A について次は同値。

- (1) A は K 上 etale である。 ($\Leftrightarrow \exists$ 拡大により対角化される)
- (2) A は K の \exists 有限次拡大により対角化される。
- (3) A は K の \forall 代数閉な拡大により対角化される。
- (4) A は K の \exists 代数閉な拡大により対角化される。

Proof. (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1) は明らか。

(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) を示す。

(1) \Rightarrow (2)

(1) $\Leftrightarrow \exists L/K$ により対角化される。系 (8.9) から $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = [A : K] = n$ となる。 $\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L) = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ とすると $\phi_i(A)$ は L の部分体で対角化可能だから $\phi_i(A) \otimes_K A \subset L \otimes_K A \cong K^n$ より $\phi_i(A)$ は K 上 n 次以下。よって $M := (\phi_i(A) \text{ たちの合成})(\subset L)$ も K の有限次拡大となり、 $\text{Im}(\phi_i) \subset M$ より終域を制限することができるから $\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, M) = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ である。系 (8.9) より $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, M)| = [A : K]$ だから A は K 上有限次拡大の M で対角化されるから (2) が示された。

(2) \Rightarrow (3)

A はある有限次拡大 M で対角化されたとする。有限次拡大より Rem (6.9) から M は代数拡大でもある。また、 K の任意の代数閉体 Ω をとると定理 (7.5)(Steinitz の定理) から M は Ω に埋め込める。よって $\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, M) \subset \text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, \Omega)$ である。ここで対角化されるので系 (8.9) から $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, M)| = [A : K]$ になることと系 (8.3) から $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, \Omega)| \leq [A : K]$ より

$|\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, M)| = |\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega)| = [A : K]$ となる。よって A は任意の代数閉体 Ω で対角化される。 \square

8.2 etale 代数の部分代数

以下では etale 代数 $A = K^n$ とし、その標準基底を $\{e_1, \dots, e_n\}$ とする。

命題 8.11. $[n] := \{1, \dots, n\}$ でこれを共通部分が無いように $[n] = I_1 \sqcup \dots \sqcup I_r$ ($I_j \neq \emptyset$) と分割する。 $I \subset [n]$ に対して $e_I := \sum_{i \in I} e_i$ とする。 $[n] = I_1 \sqcup \dots \sqcup I_r$ に対し、 $A_{(I_1, \dots, I_r)} := Ke_{I_1} + \dots + Ke_{I_r}$ は A の部分 $K\text{-alg}$ である。

そして A の任意の部分 $K\text{-alg}$ は対角化可能で $A_{(I_1, \dots, I_r)}$ のもので尽き、とくに有限個である。

Proof. e_{I_j} が $A_{(I_1, \dots, I_r)}$ の標準基底になること。

$A_{(I_1, \dots, I_r)}$ の定義より全体を張り、一次独立性も保つ。 e_i は標準基底より打ち消し合って幂等元より $I_k \neq I_l$ とするとき

$$\begin{aligned} e_{I_k}^2 &= \left(\sum_{i \in I_k} e_i \right)^2 = \sum_{i \in I_k} e_i^2 = e_{I_k} \\ e_{I_k} e_{I_l} &= \left(\sum_{i \in I_k} e_i \right) \left(\sum_{i \in I_l} e_i \right) = 0 \\ e_{I_1} + \dots + e_{I_r} &= \sum_{i \in [n]} e_i = 1 \end{aligned}$$

より標準基底になるのでそれで K 上張られている $A_{(I_1, \dots, I_r)}$ は A の部分 $K\text{-alg}$ であり、命題 (8.8) の (2) から対角化可能である。

また、 B を A の任意の部分代数とするとき射影

$$\begin{aligned} v_i : A (= K^n) &\longrightarrow K \\ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} &\longmapsto a_i \end{aligned}$$

の定義域を B に制限したものを考える。これを再度 v_i とおくときこれは $v_i \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K)$ である。

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in B, k \in K$$

とするとき $v_i(\alpha + \beta) = a_i + b_i = v_i(\alpha) + v_i(\beta)$, $v_i(\alpha\beta) = a_i b_i = v_i(\alpha)v_i(\beta)$, $v_i(k\alpha) = k a_i = k v_i(\alpha)$, $v_i(1_{K^n}) = 1_K$ より $v_i \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K)$ である。そして定義より $v_i(e_j) = \delta_{ij}$ なので $\{v_1, \dots, v_n\}$ は $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(B, K)$ を生成する。つまり、 $f \in \text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(B, K)$ に対して $v_i(c_1 e_1 + \dots + c_n e_n) = c_i$ より $f = f(e_1)v_1 + \dots + f(e_n)v_n$ とすればよい。

したがって $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K)$ の元 v_1, \dots, v_n が $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(B, K)$ を生成するので命題 (8.8) から任意の部分代数は対角化可能である。また、基底として $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ で $\varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \varepsilon_i \varepsilon_j = 0 (i \neq j)$ となるものが存在する。

この基底は A の元なので e_1, \dots, e_n で作られるが冪等性と総和が 1 になることを考えれば e_{I_1}, \dots, e_{I_r} で出し尽くされる。したがって全ての部分代数は $A_{(I_1, \dots, I_r)}$ であり、 $[n]$ の分割を考えれば部分代数は有限個。□

命題 8.12. 各 $I \subset [n]$ に対し $\mathfrak{a}_I := \sum_{i \in I} K e_i$ とするとこれは A のイデアルになる。そして A のイデアルはこれに尽き、とくに有限個である。

Proof. \mathfrak{a}_I は明らかに A のイデアルになる。

A のイデアル \mathfrak{a} が $\forall i \in I, e_i \in \mathfrak{a}$ で $\forall j \in J := [n] - I, e_j \notin \mathfrak{a}$ となっているとする。定義より明らかに $\mathfrak{a}_I \subset \mathfrak{a}$ である。 $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in \mathfrak{a}, x_i \in K$ と $j \in J$ に対して $e_j \in A, x \in \mathfrak{a}$ から $x e_j \in \mathfrak{a}$ なので $x e_j = x_1 e_1 e_j + \dots + x_n e_n e_j = x_j e_j \in \mathfrak{a}$ となる。ここで $x_j = 0$ のとき $x_j e_j = 0_{K^n} \in \mathfrak{a}$ である。 $x_j \neq 0$ のとき $x_j e_j \in \mathfrak{a}$ とすると K が体より x_j^{-1} が存在して、 $x_j^{-1} e_j \in A$ であるからイデアルより $x_j^{-1} e_j x_j e_j = e_j \in \mathfrak{a}$ となり、これは矛盾。したがって $x_j e_j \in \mathfrak{a}$ であるときは $x_j = 0$ である。これより $x \in \mathfrak{a}$ は $\sum_{i \in I} x_i e_i$ とかけるから $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}_I$ なので $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_I$ 。任意のイデアルはそれが含んでいる標準基底によってのみ決まるから \mathfrak{a}_I で全てであり I のとり方より有限個である。□

Rem 8.13. $A = K^n$ のイデアル \mathfrak{a} はそれ自身は $K\text{-alg}$ の構造を持つが、一般に A の部分 $K\text{-alg}$ ではない。また、 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_I$ は A のイデアル $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}_J = \mathfrak{a}_{[n]-I}$ の商 $K\text{-alg } A/\mathfrak{b}$ と同型である。

Proof. $K\text{-alg}$ の構造を持つことは $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_I$ で $I = \{1, \dots, k (\neq n)\}$ とすると

$$\begin{aligned} \phi: K &\longrightarrow \mathfrak{a} \\ k &\longmapsto \begin{pmatrix} k \\ \vdots \\ k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

とするとこれは環準同型で K が可換体より $\text{Im}(\phi) \subset (\mathfrak{a} \text{ の中心})$ より $K\text{-alg}$ になる。一般の I についても同様。

また、 \mathfrak{a} の単位元 $1_{\mathfrak{a}}$ は $(\underbrace{1, \dots, 1}_k, 0, \dots, 0)$ であり、これは A の単位元 $1_A = (1, \dots, 1)$ と一致しないので A の部分 $K\text{-alg}$ ではない。

$I = \{1, \dots, k\}$ として考える。このとき $J = \{k+1, \dots, n\}$ である。 $\psi: A \longrightarrow \mathfrak{a}, (a_1, \dots, a_n) \longmapsto (a_1, \dots, a_k)$ とするとこれは $K\text{-alg}$ 準同型で全射であり、 $\ker(\psi) = (a_{k+1}, \dots, a_n) = \mathfrak{b}$ であるから準同型定理より $A/\mathfrak{b} \cong \mathfrak{a}$ となるので示された。□

命題 8.14. etale $K\text{-alg } A$ は部分 $K\text{-alg}$ 及びイデアルを有限個しか持たない。

Proof. etale より ${}^3L/K$ により $L \otimes_K A \cong L^n$ であるので命題 (8.11)(8.12) より $L \otimes_K A$ の部分代数とイデアルは有限個。よって $A \subset L \otimes_K A$ の部分代数とイデアルも有限個。□

Rem 8.15. $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$ は A の素イデアルの集合 $\text{Spec}(A)$ の " L -有理点" の集合である。

例 8.16. $A := K[X, Y]/(f)$ で $f(X, Y) = X^3 + 1 - Y^2$ とする。このとき $\phi \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$ を取り、 $x = X(\text{ mod } f), y = Y(\text{ mod } f), \phi(x) = a, \phi(y) = b$ とする。すると A で $f(X, Y) = 0_A$ から

$\phi(f) = f(a, b) = 0$ よりこの a, b が f の L 上の有理点になる。 ϕ は準同型より x, y の送り先 a, b のみで $\phi(g(X, Y) + f(\in A)) = g(a, b)$ と定まるので $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L) \cong \{(a, b) \in L^2 | f(a, b) = 0\}$ という同型が定まる。

8.3 分離次数

A : 有限次 $K\text{-alg}$ で $\forall L/K$ に対して $h_A(L) := |\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)|$ とおく。このとき系 (8.3) より $h(L) \leq n = [A : K]$ が成り立っている。

補題 8.17. Ω/K : 拡大、 Ω : 代数閉体とすると $\forall L/K$ に対し $h(L) \leq h(\Omega)$

Proof. $L' : K$ の相対的代数閉包とすると $\forall \phi \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$ において A の K 上の基底を (e_1, \dots, e_n) とする。このとき $\forall x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \in A$ と書けて $\phi(x) = a_1 \phi(e_1) + \dots + a_n \phi(e_n)$ となる。 $\{\phi(e_1), \dots, \phi(e_n)\}$ の部分集合が $\phi(A)$ の基底になるので $[\phi(A) : K] \leq [A : K] = n$ より $\phi(A)/K$ は有限次拡大より代数拡大である。よって $\phi(A) \subset L'$ だから $\phi \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L')$ なので $h(L) = h(L')$ になる。定理 (7.5) より L' は代数閉体と見た Ω に埋め込めるので終域が小さくなるから $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L) = \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L') \subset \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega)$ より $h(L) \leq h(\Omega)$ である。□

定義 8.18. $[A : K]_s := \max_{L/K} h_A(L) = h_A(\Omega)$ ($\Omega : K$ の代数閉包, 補題 (8.17) から言える。)

を A の K 上の分離次数 (separable degree) という。系 (8.3) から $[A : K]_s \leq [A : K]$ が言える。

定義 8.19. $\cdot K\text{-alg}$ A が分離的とは $[A : K]_s = [A : K]$ となること。

- ・ とくに有限次拡大 L/K が分離的とは $K\text{-alg}$ として L が分離的であること。
- ・ 代数拡大 L/K が分離的とは \forall 有限次部分体 (中間体) が分離的であること。
- ・ 分離的な拡大を分離拡大、代数的かつ分離的な拡大を分離的代数拡大という。
- ・ 分離的でないとき非分離的という。

命題 8.20. A, B : 有限次 $K\text{-alg}$ 、 L/K : 拡大、 $A_{(L)} = L \otimes_K A$ とする。

- (1) $[A \otimes_K B : K]_s = [A : K]_s [B : K]_s$
- (2) $[A_{(L)} : L]_s = [A : K]_s$
- (3) C : 有限次 $L\text{-alg}$ で L/K が有限次のとき $[C : K]_s = [C : L]_s [L : K]_s$

Proof. (1)

Ω を K の代数閉包とする。定義より $[A \otimes_K B : K]_s = h_{A \otimes_K B}(\Omega)$, $[A : K]_s = h_A(\Omega)$, $[B : K]_s = h_B(\Omega)$ である。そして

$$\begin{aligned} * : \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega) \times \text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, \Omega) &\longrightarrow \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A \otimes_K B, \Omega) \\ (v, u) &\longmapsto v * u \\ v * u : A \otimes_K B &\longrightarrow \Omega \\ a \otimes b &\longmapsto v(a)u(b) \end{aligned}$$

と定める。まず、 $v' * u' = v * u$ のとき $\forall a \otimes b \in A \otimes_K B$, $v'(a)u'(b) = v(a)u(b)$ で Ω の元だから $a \otimes b \neq 0$ で逆元が存在するから $v'(a) = v(a)$, $u'(b) = u(b)$ より $(v', u') = (v, u)$ なので単射。

$u_1 : A \longrightarrow A \otimes_K B, a \longmapsto u_1(a) = a \otimes 1$ と $u_2 : B \longrightarrow A \otimes_K B, b \longmapsto u_2(b) = 1 \otimes b$ とすると

$\forall a \otimes b \in A \otimes_K B = u_1(a)u_2(b)$ となる。任意の $w \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A \otimes_K B, \Omega)$ に対し、 $v_i = w \circ u_i$ とすると準同型より $w(a \otimes b) = w(u_1(a)u_2(b)) = w \circ u_1(a)w \circ u_2(b) = v_1(a)v_2(b)$ となる。よって w に対して $v_1 \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega), v_2 \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, \Omega)$ をとれば $w = v_1 * v_2$ となるので全射。したがって $*$ は全単射だから $h_{A \otimes_K B}(\Omega) = h_A(\Omega)h_B(\Omega)$ より成立。

(2)

$\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega)$ と $\text{Hom}_{L\text{-alg}}(L \otimes_K A, \Omega)$ の間は系 (8.9) の π を用いれば L を Ω として見てもよく、これは全単射であるから $[L \otimes_K A : L]_s = [A : K]_s$ が成り立つ。

(3)

$S = \text{Hom}_{K\text{-alg}}(L, \Omega), T = \text{Hom}_{K\text{-alg}}(C, \Omega)$ とする。 $\sigma \in S$ に対して $T_\sigma = \{f \in T \mid \forall \alpha \in L, f(\alpha) = \sigma(\alpha)\}$ とするとこれは以下で示されるように T を分割する。 $\sigma, \tau \in S$ に対して $f \in T_\sigma \cap T_\tau$ としたとき $\forall \alpha \in L, f(\alpha) = \sigma(\alpha) = \tau(\alpha)$ より $\sigma = \tau$ から $T_\sigma = T_\tau$ となる。また、 $\forall g \in T$ に対して $\sigma := g|_L$ とすれば $\sigma(\alpha) = g(\alpha)$ だから $g \in T_\sigma$ であるので確かに T を分割する。

σ は体の準同型より単射だから Ω の中に $\sigma(L)$ として L を埋め込めるからその2つを同一視することで K の代数閉包 Ω を L の代数閉包と見ることもできる。このとき $\forall f \in T_\sigma$ は定義より $\forall \alpha \in L, f(\alpha) = \sigma(\alpha) \in \sigma(L) \cong L$ で $\sigma(L) \cong L$ 上恒等写像になる。したがって $f \in \text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega)$ より $T_\sigma \subset \text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega)$ である。また、この $\sigma(L)$ と L の同一視から $\alpha \in L$ は Ω の中で $\alpha = \sigma(\alpha) \in \sigma(L)$ であるので $\phi \in \text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega)$ に対して $\phi(\alpha) = \alpha = \sigma(\alpha)$ より $\phi \in T_\sigma$ だから $\text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega) \subset T_\sigma$ である。これより $T_\sigma = \text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega)$ から $|T_\sigma| = [C : L]_s$ となるので分割であることも考えれば $|T| = [C : K]_s = \sum_{\sigma \in S} |T_\sigma| = |S||T_\sigma| = [C : L]_s[L : K]_s$ より示された。□

Note 8.21. 分離次数ではなく拡大次数でも (1) ~ (3) と同様のことが成り立つ。

命題 8.22. A : 有限次 $K\text{-alg}$ について

$$A \text{ が } K \text{ 上分離的} \Leftrightarrow A \text{ は } K \text{ 上 etale}$$

Proof. 系 (8.9) と命題 (8.10) から

$$\begin{aligned} A \text{ が } K \text{ 上分離的} &\Leftrightarrow [A : K]_s = [A : K] \\ &\Leftrightarrow |\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega)| = [A : K] \\ &\Leftrightarrow A \text{ はある } K \text{ の代数閉包 } \Omega \text{ で対角化される。} \\ &\Leftrightarrow A \text{ は } K \text{ 上 etale} \end{aligned}$$

□

系 8.23. 次の3つが成り立つ

- (1) $A \otimes_K B$ が etale/ $K \Leftrightarrow A$ と B がともに etale
- (2) $A/K : \text{etale} \Leftrightarrow A_{(L)}/L : \text{etale}$
- (3) $C/L/K$ のとき C が K 上 etale $\Leftrightarrow C$ が L 上 etale かつ L が K 上 etale

Proof. 代数が分離的であるときその分離次数は拡大次数と等しいという定義とその拡大次数を常に超えないということから命題 (8.20)(8.22) と拡大次数について命題 (8.20) が成り立つことより示される。□

8.4 微分加群

定義 8.24. A/K の微分加群 $\Omega_{A/K}$ とは $I := \ker(A \otimes_K A \rightarrow A, a \otimes b \mapsto ab)$ としたとき $\Omega_{A/K} := I/I^2$ と定義される。定義より $\Omega_{A/K} \subset B := A \otimes_K A/I^2$ は明らか。ここで $A \otimes_K A$ を $a \mapsto a \otimes 1$ と見ることで A 加群と考える。そして $d: A \rightarrow \Omega_{A/K}, a \mapsto d(a) (= da) := 1 \otimes a - a \otimes 1 \pmod{I^2}$ とする。このとき $a, b \in A$ と $k \in K$ に対して

$$\begin{aligned} d(ab) &= bd(a) + ad(b) \\ d(k) &= 0 \end{aligned}$$

が成り立つ。実際、 $d(ab) = 1 \otimes ab - ab \otimes 1 = (1 \otimes a)(1 \otimes b) - (a \otimes 1)(b \otimes 1) = (1 \otimes b)(1 \otimes a - a \otimes 1) + (a \otimes 1)(1 \otimes b - b \otimes 1) + (1 \otimes b)(a \otimes 1) - (a \otimes 1)(1 \otimes b) = bd(a) + ad(b)$ であり、 $d(k) = 1 \otimes k - k \otimes 1 = k(1 \otimes 1) - k(1 \otimes 1) = 0$ より成立。

例 8.25. $A = K[X]$ とすると $\Omega_{A/K} = A \cdot dX (= d(X) = 1 \otimes X - X \otimes 1)$ であり $d: A \rightarrow \Omega_{A/K}, f \mapsto f'dX$ となる

例 8.26. $A = K[X]/(f)$ のとき $\Omega_{A/K} = A/(f')dX = K[X]/(f)/(f')dX = K[X]/(f, f')dX$ となる。

命題 8.27. 有限次 K -alg A について

$$A \text{ は } K \text{ 上で etale} \Leftrightarrow \Omega_{A/K} = 0$$

が成り立つ。

系 8.28. $A = K[X]/(f)$ で $\text{etale}/K \Leftrightarrow (f, f') = 1$ (f とその形式微分 f' によって作られるイデアルが 1_K を含む $\Leftrightarrow f$ と f' が互いに素)

Proof. 例 (8.26) と命題 (8.27) から $\Omega_{A/K} = 0 \Leftrightarrow (f, f') = K[X] = (1_K)$ より成り立つ。 \square

8.5 被約

定義 8.29. 可換環 A が被約 (reduced) とは 0 以外の冪零元を持たないこと。 ($\Leftrightarrow a \neq 0$ なら $a^2 \neq 0$) K -alg A が被約とはそれが可換環として被約であること。

例 8.30. 体、整域は被約。被約 \times 被約 = 被約

図形的には重なっていないことと見ることができる。

補題 8.31. 可換環 A に冪等元 $e (\neq 0, 1)$ が存在するとき $A = A_1 \times A_2$ となる $\{0\}$, A ではない部分環 A_1, A_2 が存在する。

Proof. $e' := 1 - e$ とするとこれも $(1 - e)(1 - e) = 1 - 2e + e^2 = 1 - e$ より冪等元である。また、 $ee' = e(1 - e) = e - e^2 = 0$ をみtas。 $A_1 := Ae, A_2 := Ae'$ とするとこれは 和と積について閉じているから A の部分環になっていて以下の準同型写像を考える。

$$\begin{aligned} \phi: A &\rightarrow A_1 \times A_2 \\ x &\mapsto (ex, e'x) \end{aligned}$$

ここで $\phi(x) = 0 \Leftrightarrow ex = 0 \wedge e'x = (1-e)x = 0 \Rightarrow (1-e)x + ex = 0 \Rightarrow x = 0$ より $\ker(\phi) = \{0\}$ から単射。また、 $\forall (ea, e'b)$ に対して $ea + e'b \in A$ をとると $\phi(ea + e'b) = (e(ea + e'b), e'(ea + e'b)) = (ea, e'b)$ より全射。したがって同型写像になるから $A \cong A_1 \times A_2 (= Ae \times Ae')$ となる。 \square

補題 8.32. M : 有限生成 A 加群で \mathfrak{a} を A のイデアルとして ϕ を M の A 加群の自己準同型であり $\phi(M) \subset \mathfrak{a}M$ を満たすとする。このとき M の生成系を (x_1, \dots, x_n) として ϕ はある $a_i \in \mathfrak{a}$ により $\phi^n + a_1\phi^{n-1} + \dots + a_n = 0$ となる。

Proof. 定義から $\forall i, \phi(x_i) \in \mathfrak{a}M$ から $\phi(x_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$ となる a_{ij} が存在するので以下の式変形で

$$\begin{aligned}\phi(x_i) - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j &= 0 \\ \sum_{j=1}^n \delta_{ij}\phi(x_i) - a_{ij}x_j &= 0 \\ \sum_{j=1}^n (\delta_{ij}\phi - a_{ij})x_j &= 0\end{aligned}$$

となる。ここで n 次正方行列 $A := (\delta_{ij}\phi - a_{ij})$ を考えることが出来てこれは $\vec{x} := {}^T(x_1, \dots, x_n)$ に対して $A\vec{x} = 0$ となる。 \vec{x} の元は M の生成系から 0 ではないのでこの連立方程式は非自明解を持つからその行列式 $\det A = \det(\delta_{ij}\phi - a_{ij}) = 0$ である。この行列式は ϕ の n 次式になり、 n 次部分は A の対角線上の積のみであるので n 次の係数は 1 でその他の係数は $a_{ij} \in \mathfrak{a}$ の積の和だからある $a_i \in \mathfrak{a}$ で $\phi^n + a_1\phi^{n-1} + \dots + a_n = 0$ となるので示された。 \square

系 8.33. M を有限生成 A 加群として、 \mathfrak{a} を $\mathfrak{a}M = M$ となる A のイデアルとする。このとき $xM = 0$ と $x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$ となる $x \in A$ が存在する。

Proof. 補題 (8.32) で $\phi = \text{id}_M$ とすると $\phi(M) = M = \mathfrak{a}M$ から条件を満たしているので $\phi^n + a_1\phi^{n-1} + \dots + a_n = 1 + a_1 + \dots + a_n = 0$ となる $a_1, \dots, a_n \in \mathfrak{a}$ が存在する。ここで $x = 1 + a_1 + \dots + a_n$ とおくと $x \in A$ であり、 $xM = 0M = 0$ と $a_1 + \dots + a_n \in \mathfrak{a}$ から $x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$ となる。 \square

命題 8.34. 有限次 K -alg A において次は同値。

- (1) A は被約。
- (2) A はある有限次体拡大 L_i/K により $A \cong L_1 \times \dots \times L_n$ となる。

Proof. (2) \Rightarrow (1)

体は被約であることより明らか。

(1) \Rightarrow (2)

A が体であれば K の拡大体と見ることで $L := A$ で成立する。

A が体でないとして A の次元について帰納法を用いる。 $[A : K] = 1$ のとき $A \cong K$ から K が可換体より成立。 $[A_i : K] = m \leq n$ の K -alg A_i について題意が満たされているとする。 $[A : K] = n$ のときもし A が幂等元 $e (\neq 0, 1)$ を持っていれば補題 (8.31) より $A \cong A_1 \times A_2$ となる 0 でも A でもない部分環が存在して部分環であることから $[A_1 : K], [A_2 : K] \leq [A : K]$ となるので帰納法の仮定から A は題意を満たす。

よって A が幂等元 $e (\neq 0, 1)$ を持っていることを示す。 $\mathfrak{a} (\neq (0), (1))$ は A のイデアルで K -ベクトル空間としてみたときに次数が最小のものとする。 $\mathfrak{a} \neq (0)$ より 0 でない $x \in \mathfrak{a}$ がとれる。 A が被約より $x^2 \neq 0$ な

ので $\mathfrak{a}^2 \neq \{0\}$ であり $\mathfrak{a}^2 \subset \mathfrak{a}$ を満たす。そして \mathfrak{a} の次数の最小性から $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$ となる。

A が有限次 K -alg よりそのイデアル \mathfrak{a} も有限生成であるので系 (8.33) において $M = \mathfrak{a}$ としてもよく、 \mathfrak{a} 自身は $\mathfrak{a}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$ を満たしているので $xM = 0, x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$ となる $x \in A$ が存在する。 $e := 1 - x$ とすると $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ より $e \in \mathfrak{a}$ で $(1 - e)\mathfrak{a} = 0$ となる。したがって $\forall x \in \mathfrak{a}, (1 - e)x = 0 \Leftrightarrow ex = x$ となるから $x = e \in \mathfrak{a}$ をとると $e^2 = e$ から幂等元 e が存在して $\mathfrak{a} = Ae$ となる。 $\mathfrak{a} \neq (0), (1)$ から $e \neq 0, 1$ であるので A は幂等元 $e (\neq 0, 1)$ を持っているので示された。 \square

定理 8.35. 有限次 K -alg A について次は同値。

- (1) A は K 上 etale。
- (2) $\forall L/K$ に対し $L \otimes_K A$ は被約。とくに、 A は被約。
- (3) ある K の完全拡大体 P が存在して $P \otimes_K A$ が被約になる。
- (4) $A \cong L_1 \times \cdots \times L_n, L_i/K$ は有限次分離拡大。分離拡大は次の章で説明する。

Proof. (1) \Rightarrow (2)

L を K の任意の体拡大とし、その代数閉包を Ω とおくと $L \subset \Omega$ より $L \otimes_K A$ は $\Omega \otimes_K A$ の部分環と同型である。また、 A は K 上 etale より命題 (8.10) から Ω で対角化されるから $\Omega \otimes_K A \cong \Omega^n$ となり、これは体の直積代数から被約であるから $L \otimes_K A$ も被約である。 \square

例 8.36. $\text{char}(K) = p > 0$ で K が完全体でないとすると Frobenius が同型でないので $a \in K^\times - (K^\times)^p$ という元が少なくとも一つとれる。このとき $A = K[X]/(X^p - a)$ は体で、とくに被約。これは $L := K(\alpha), (\alpha = \sqrt[p]{a})$ と同型になる。

その係数拡大は標数を考えて $L \otimes_K A = L[X]/(X^p - a) = L[X]/(X - \alpha)^p$ となる。よって $\xi := (X - \alpha) \pmod{(X - \alpha)^p}$ は幂零元なので $L \otimes_K A$ は被約でない。

9 分離的代数拡大

9.1 多項式の分離性

命題 9.1. 代数拡大 L/K について次は同値。

- (1) L/K : 分離的。
- (2) L/K の \forall 部分拡大 M/K は分離的。

Proof. 定義 (8.19) から明らか。 □

命題 9.2. $f \in K[X] - K$ について以下は同値。

- (1) $(f, f') = 1$ ($\Leftrightarrow f$ とその形式微分 f' が互いに素)
- (2) f の判別式 $\text{disc}(f) \neq 0$ ($f = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ のとき $\text{disc}(f) := \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2$ と定義する)
- (3) K のある拡大 L 上で f は相異なる一次式の積になる。
- (4) f の任意の根は単根 (重解でない)
- (5) $K[X]/(f)$ は étale/ K ($\Leftrightarrow K$ 上分離的)

Proof. (5) \Leftrightarrow (1)

系 (8.28) で示した。

(2) \Leftrightarrow (3) \Leftrightarrow (4)

明らか。

(1) \Rightarrow (2) ($\deg f > 1$ のときを考える) 対偶 $\text{disc}(f) = 0 \Rightarrow (f, f') \neq 1$ を示す。

$\text{disc}(f) = 0$ よりある $0 \leq i < j \leq n$ があり $\alpha_i = \alpha_j$ となる。 $i = 1, j = 2$ としても一般性を失わない。これは f の根なので $f = (X - \alpha_1)^2 Q(X)$ となる $Q(X) \in K[X]$ が存在する。よって $f' = 2(X - \alpha_1)Q(X) + (X - \alpha_1)^2 Q'(X) = (X - \alpha_1)(2Q(X) + (X - \alpha_1)Q'(X))$ となるから f, f' は共通の α_1 という根を持つので互いに素でないから $(f, f') \neq 1$ となる。

(2) \Rightarrow (1) ($\deg f > 1$ のときを考える) 対偶 $(f, f') \neq 1 \Rightarrow \text{disc}(f) = 0$ を示す。

$(f, f') \neq 1$ よりある α があってそれを $f = (X - \alpha)Q_1(X), f' = (X - \alpha)Q_2(X)$ として共通根として持つ。この二つから $f' = Q_1(X) + (X - \alpha)Q_1'(X) = (X - \alpha)Q_2(X)$ より $(X - \alpha)(Q_1'(X) - Q_2(X)) = Q_1(X)$ となるから $f = (X - \alpha)^2(Q_1'(X) - Q_2(X))$ より重根をもつ。したがって根の差の積である $\text{disc}(f) = 0$ である。

$\deg f = 1$ のときは f の根は 0 より常に $\text{disc}(f) = 0$ となるからこの命題には不適。 □

定義 9.3. これらが成り立つとき f を 分離的 という。そうでないとき非分離的という。

命題 9.4. 既約多項式 $f \in K[X]$ について次は同値。

- (1) f は分離的。
- (2) f は ($\exists L$ に) 少なくとも一つの単根をもつ。
- (3) $f' \neq 0$
- (4) $\text{char}(K) = 0$ か、または $\text{char}(K) = p > 0$ で $f \notin K[X^p]$

Proof. (1) \Rightarrow (2) は命題 (9.2) で示した。

(2) \Rightarrow (3)

α を f の単根とする。 $f'(\alpha) = 0$ とすると命題 (9.2) の (2) \Rightarrow (1) の証明より $f = (X - \alpha)^2 Q(X)$ となるから α が単根に矛盾するので $f'(\alpha) \neq 0$ である。よって $f' \neq 0$

(3) \Rightarrow (1)

体上の多項式より f を monic としよ。 α を f の任意の根とする。 f が既約多項式で monic より f は最小多項式であるからその次数の最小性と $f' \neq 0$ より f' は多項式で $f'(\alpha) \neq 0$ であるから α は単根。これが任意の f の根について成り立つから f は分離的。

(3) \Leftrightarrow (4)

$f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in K[X]$ について

$$\begin{aligned} f' &= \sum_{i=0}^n a_i i X^{i-1} = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = \cdots = a_n = 0 & (\text{char}(K) = 0) \\ a_i = 0 \ (p \nmid i) & (\text{char}(K) = p > 0) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} f = a_0 & (\text{char}(K) = 0) \\ f = \sum a_{pk} X^{pk} \in K[X^p] & (\text{char}(K) = p > 0) \end{cases} \end{aligned}$$

より、既約多項式は $f \in K[X] - K$ で否定を考えれば成立。 \square

系 9.5. 体 K について次は同値。

(1) K は完全体

(2) 任意の既約多項式 $f \in K[X]$ は分離的

((3) $\forall L/K$: 代数拡大は分離的)

Proof. (1) \Leftrightarrow (2) のみ示す。

$\text{char}(K) = 0$ のとき命題 (9.4) の (1) \Leftrightarrow (4) から \forall 既約多項式 $f \in K[X]$ は分離的。

$\text{char}(K) = p > 0$ のとき

$$K \text{ が完全体} \Leftrightarrow \forall f \in K[X^p] - K \text{ は可約}$$

を示す。これより、既約ならば $f \notin K[X^p] - K$ が言えて命題 (9.4) の (4) \Leftrightarrow (1) より既約ならば分離的が言える。

(\Rightarrow)

$f = \sum a_i X^{pi} \in K[X^p] - K$ で $K^p := \{x^p | x \in K\}$ (p 乗元の集合) とする。 K が完全体なので Frobenius が全射だから $K = K^p$ なので $\forall a_i \in K$ に対して $\exists b_i \in K, a_i = b_i^p \in K^p = K$ である。したがって $\text{char}(K) = p > 0$ に注意すれば $f = \sum b_i^p X^{pi} = (\sum b_i X^i)^p$ より $\sum b_i X^i \in K[X]$ で分解できるから f は可約。

(\Leftarrow) 対偶の K : 非完全 $\Rightarrow \exists f \in K[X^p] - K$ は既約 を示す。

K : 非完全とする。このとき $K^p \neq K$ から $\exists a \in K^\times - K^p$ が取れる。ここで $f = X^p 0a \in K[X]$ は既約になる。

b を f の根 ($b^p = a$) とし、 g を b の K 上の最小多項式とする。最小性から $g \mid f$ で $\text{char}(K) = p > 0$ より $f = (X - b)^p$ となるから $g = (X - b)^d$ ($d^e = p$) と書ける。 $f = g^e$ の形になり、 p が素数から $d = p$ または $d = 1$ になる。 $d = 1$ とすると $g \in K[X]$ より $b \in K$ であり、 $a = b^p \in K^p$ から $a \in K^\times - K^p$ に矛盾する。

よって $d = p$ で $f = g$ となるから f は既約。これより既約な $f \in K[K^p] - K$ が存在するので対偶が示された。 \square

9.2 元の分離性

定義 9.6. L/K : 拡大としたとき、 K 上代数的な元 $x \in L$ が K 上分離的とは体の拡大 $K(x)/K$ が分離的であること。そうでないとき非分離的という。

命題 9.7. $x \in L$: K 上代数的な元、 $f : x$ の最小多項式とすると、次は同値。

- (1) x は K 上分離的。
- (2) f は分離多項式。
- (3) x は f の単根。
- (4) $K[X]/(f)$ は K 上 etale ($\Leftrightarrow K$ 上分離的)

Proof. x が K 上代数的なので命題 (6.14) から $K(x) = K[X]/(f)$ となる。

x が K 上分離的るとき定義から $K(x)/K$ が分離的なので $K[X]/(f)$ が K 上分離的である。そして命題 (9.2) の (5) \Leftrightarrow (4) より f の任意の根は単根より x は f の単根であり、 f は分離多項式である。 \square

系 9.8. $x \in L$ が $\exists g \in K[X]$ の単根ならば x は K 上分離的。

Proof. x の最小多項式を f としたとき最小性から $f \mid g$ より $f = gh$ となる $h \in K[X]$ が存在する。このとき h が x を根として持っているとする f の最小性に矛盾するから $h(x) \neq 0$ である。したがって $f = gh$ は x を単根としてもつので命題 (9.7) から x は K 上分離的。 \square

系 9.9. $x \in L$ が K 上分離的ならば L/K の任意の中間体 M でも分離的。

Proof. x の M 上の最小多項式を f_M とし、 K 上の最小多項式を f_K とする。このとき $K[X] \subset M[X]$ から $M[X]$ 上で $f_M \mid f_K$ となる。 x は K 上分離的なので f_K の単根であるから系 (9.8) で $g = f_K \in M[X]$ と見れば x は M 上分離的である。 \square

命題 9.10. 拡大 L/K について以下は同値。

- (1) L は K 上代数的かつ分離的。
- (2) L の任意の元 x は K 上代数的かつ分離的。
- (3) L は K 上代数的かつ分離的な元のある部分集合 $S (\subset L)$ によって K 上生成される。($L = K(S)$ となる)

Proof. (1) \Rightarrow (2) L/K が代数的なので L の任意の元は K 上代数的。分離的であることから、 L/K の任意の有限次部分拡大が分離的である。 $\forall x \in L$ は代数的元なので命題 (6.14) より $K(x)/K$ は有限次部分拡大。したがって $K(x)/K$ が分離的だから定義より x は分離的。

(2) \Rightarrow (3) 仮定より L の任意の元は K 上代数的かつ分離的なので $S = L$ ととれて、 $K(L) = L$ より成立する。

(3) \Rightarrow (1) 任意の $x \in L$ は S のある有限部分集合 S' によって $x \in K(S')$ となり、 $K(S')$ は有限次拡大より x は K 上代数的。よって L は K 上代数的。 $S' = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ となっている時を考えれば良い。 $L' = K(S') (= K(\alpha_1, \dots, \alpha_n))$ とおくと $\alpha_i \in L$ は K 上代数的なので命題 (6.14) から L'/K は有限次拡大よ

り代数的である。 $K_0 := K, K_n := L'$ として、 $K_{i+1} := K_i(\alpha_{i+1}), 0 \leq i \leq n-1$ と定めると拡大の列

$$K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_n$$

が作られる。 α_{i+1} は K 上分離的なので系 (9.9) から K_n/K_0 の中間体である K_i 上分離的になる。よって定義から $K_i(\alpha_i)/K_i = K_{i+1}/K_i$ は分離的であるので $[K_{i+1} : K_i]_s = [K_{i+1} : K_i]$ となり、 L'/K が有限次より $[K_{i+1} : K_i]$ も有限だから命題 (8.20) の (3) を繰り返し用いれば

$$\begin{aligned} [L' : K] &= [K_n : K_0] = \prod_{i=0}^{n-1} [K_{i+1} : K_i] \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} [K_{i+1} : K_i]_s = [K_n : K_0]_s = [L' : K]_s \end{aligned}$$

となり L'/K は分離的である。 □

系 9.11. 代数拡大 L/K において次は同値。

- (1) L/K は分離的。
- (2) $\forall x \in L$ は K 上の最小多項式の単根。

Proof. 命題 (9.10) の (1) \Leftrightarrow (2) から成立する。 □

命題 9.12. (1) L/K がある集合 S によって $L = K(S)$ とするとき

S の任意の元が K 上代数的かつ分離的 $\Rightarrow L/K$ は分離的

- (2) 代数拡大 $L_1/K, L_2/K$ ($\subset {}^3L$) に対して L_1, L_2 の合成体を L_1L_2 とすると、

L_1L_2/K が分離的 $\Leftrightarrow L_1/K, L_2/K$ がともに分離的

- (3) $L/M/K$ で L/K : 代数拡大のとき

L/K が分離的 $\Leftrightarrow L/M, M/K$ が分離的

- (4) $L/K, K'/K$ とその合成体 $L' := LK' = K'(L)$ について L/K が代数的であるとき

L/K が分離的 $\Rightarrow L'/K'$ が分離的

Proof. (1)

S の元は代数的かつ分離的で L は K 上 S で生成されるから命題 (9.10) の (3) \Leftrightarrow (1) から成立。

(2)

(\Rightarrow) 定義より $L_1, L_2 \subset L_1L_2$ から明らか。

(\Leftarrow) (4) で $L = L_1, K' = L_2, L' = L_1L_2$ とおけば L_1/K が分離的より L_1L_2/L_2 が分離的になる。(3) から $L_1L_2/L_2, L_2/K$ が分離的より L_1L_2/K が分離的より示された。

(3)

(\Rightarrow) L/K が分離的より、 $\forall x \in L$ は K 上分離的。したがって $\forall x \in M \subset L$ も K 上分離的であるから M は K 上分離的。また、系 (9.9) より $\forall x \in L$ は M 上分離的でもあるので L は M 上分離的。

(\Leftarrow) まず、命題 (6.17) より、 $L/M, M/K$ は代数拡大。 $\forall x \in L$ をとると M 上代数的かつ分離的より最小多項式 $f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in M[X]$ があり、これは分離多項式である。 $M' := K(a_1, \dots, a_n)$ とすると

$f \in M'[X]$ であり、 x の最小多項式のままである。 $L' := M'(x)(= K(x, a_1, \dots, a_n))$ とすると、命題 (6.14) と $f \in M'[X]$ から、 $L' = M'[X]/(f)$ は有限次拡大で、 x は最小多項式 f の単根だから命題 (9.7) より、 L' は M' 上分離的。また、 M'/K は M/K が分離的より定義から分離的。よって $L'/M, M'/K$ が有限次拡大かつ分離的であることから系 (8.23) の (3) から $[L' : K] = [L' : M'][M' : K] = [L' : M']_s[M' : K]_s = [L' : K]_s$ となるので L'/K も分離的。したがって $x \in L'$ は K 上分離的であるから元の任意性より L は K 上分離的。
(4)

L/K が代数的より、 $\forall x \in L$ は K 上代数的であるが、 $K \subset K'$ より K' 上代数的でもある。また、 x の K 上の最小多項式を f とすると $f \in K[X] \subset K'[X]$ で、 L/K が分離的から x は f の単根なので系 (9.8) より x は K' 上分離的。したがって L は K' 上分離的かつ代数的な元の集合なので命題 (9.10) の (3) \Leftrightarrow (1) から $L' = K'(L)$ は K' 上代数的かつ分離的。 \square

9.3 原始元

定義 9.13. L/K : 拡大で、 $x \in L$ が L/K の原始元 (primitive element) とは $L = K[x](= K[X]/(f) = K(x))$ となること。ただし f は x の K 上の最小多項式である。定理 (6.14) から L/K が原始元を持つためには有限次拡大であることが必要である。

定理 9.14. L/K について次は同値。

- (1) L/K は原始元をもつ
 - (2) L/K は中間体を有限個しか持たない。
- さらに、 L/K が有限次分離拡大ならこれらが成立する。

Proof. (1) \Rightarrow (2)

原始元を $x \in L$ とし、その最小多項式を $f \in K[X]$ とする。 f を L 上で割り切ることができる monic 多項式 $g \in L[X]$ に対して、その係数で生成される K 上の体を E_g とする。この $\deg(f) = n$ のとき、 L で f は高々 n 個の既約多項式の積に表すことができる。この既約多項式の積の組み合わせが g になりうるので g の個数は高々 2^n 個であるのでこのような体 E_g は有限個である。 L の中間体が全て E_g でかければ有限個だけであることがわかるのでそれを示す。

M をある中間体とすると $K \subset M, L = K[x]$ より $M[x] = L$ となる。ここで x の M 上の最小多項式を f_M とすると $[L : M] = \deg(f_M)$ である。 $K[X] \subset M[X]$ より $f_M | f$ であるので f_M は M 上、したがって L 上で f を割り切る。 $f_M \in M[X]$ より f_M の係数はすべて M に含まれているから $E_{f_M} \subset M$ である。また、 $E_{f_M}[x] = L$ より、 $f_M \in E_{f_M}[X], f_M(x) = 0$ から $[L : E_{f_M}] \leq \deg(f_M) = [L : M]$ となるので $M \subset E_{f_M}$ である。したがって $M = E_{f_M}$ となり E_g の形で書けるから中間体は高々 2^n 個の有限個しか持たない。

(2) \Rightarrow (1)

まず原始元の最小多項式の存在性のため、 L/K が代数拡大であることを背理法により示す。 L/K が超越元 x を持つと仮定する。このとき命題 (6.2) の (3) \Leftrightarrow (1) の否定から $1, x, x^2, \dots$ は一次独立である。したがってその部分集合 $1, x^2, (x^2)^2, \dots$ も一次独立より x^2 も K 上超越元である。ここで $K(x) = K(x^2)$ と仮定すると、 $x = f(x^2)/g(x^2)$ となる $f(X), g(X) (\neq 0) \in K[X]$ が存在するから、 x が $Xg(X^2) - f(X^2) \in K[X]$ の根になる。 $Xg(X^2)$ は奇数次、 $f(X^2)$ は偶数次より $Xg(X^2) - f(X^2)$ となるからこれは x を根にもつ 0 でない K 上多項式になるため x の超越性に矛盾する。よって $K(x) \neq K(x^2)$ であるから $K(x^2) \subsetneq K(x)$ で

ある。これを繰り返せば

$$K \subset \cdots \subsetneq K(x^3) \subsetneq K(x^2) \subsetneq K(x) \subset L$$

となり無限個の中間体が存在してしまうのでこれは仮定に矛盾するから L/K は超越元を持たないから代数拡大である。

さらに、 L/K は有限生成であることを背理法により示す。有限生成でないとすると $\alpha_i \in L$ により

$$K \subsetneq K(\alpha_1) \subsetneq K(\alpha_1, \alpha_2) \subsetneq \cdots \subsetneq K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \subsetneq \cdots \subset L$$

として無限個の中間体が存在してしまうので仮定に矛盾するから L/K は有限生成。以上より L/K は有限次元代数拡大である。

単拡大であることを示す。

・ K が有限体のとき

系 (4.6) からある素数 p と正整数 $f = [K : F_p]$ があり、 $q = p^f$ として、 $K \cong F_q$ (位数 $q = p^f$ の有限体) となる。 L/K は有限次拡大より拡大次数を e とすると、 $L \cong F_{q^e}$ とできる。 F_{q^e} の乗法群 $F_{q^e}^\times$ は位数 $q^e - 1$ の巡回群になるので $F_{q^e}^\times$ は位数 $q^e - 1$ の元 $\zeta \in F_{q^e}^\times$ を持つ。したがって $F_{q^e}^\times = \{1, \zeta, \dots, \zeta^{q^e-2}\}$ から、 $F_{q^e} = \{0, 1, \zeta, \dots, \zeta^{q^e-2}\}$ となる。よって $F_{q^e} \subset F_q(\zeta) \subset F_{q^e}$ から $L = F_{q^e} = F_q(\zeta) = K(\zeta)$ より原始元 ζ が存在する。

・ K が無限体のとき

$\forall \alpha \in L$ について有限次拡大より $[K(\alpha) : K] \leq [L : K] \leq \infty$ なので $\{[K(\alpha) : K] | \alpha \in L\}$ は正整数の有界集合。したがってある $\alpha_0 \in L$ が存在して、 $\forall \alpha \in L$ で $[K(\alpha) : K] \leq [K(\alpha_0) : K]$ となる。ここで任意に $\beta \in L$ を一つ定める。 $\forall c \in K$ について $M_c := K(c\alpha_0 + \beta)$ とする。これは L/K の中間体より有限個しかないが K が無限体より、 c は無限個とれるのである異なる $c_1, c_2 \in K$ で $M := M_{c_1} = M_{c_2}$ となる。このとき $c_1, c_2 \in K \subset M$ から $c_1 - c_2 \in M, c_1 - c_2 \neq 0$ より $(c_1 - c_2)^{-1} \in M$ が存在する。また、 $(c_1\alpha_0 + \beta) - (c_2\alpha_0 + \beta) = (c_1 - c_2)\alpha_0 \in M$ なので $(c_1 - c_2)^{-1}$ をかけても M に含まれているので $\alpha_0 \in M$ となる。そして $c_1\alpha_0 \in M$ にもなるので $\beta = (c_1\alpha_0 + \beta) - c_1\alpha_0 \in M$ である。これより、 $K(\alpha_0) \subset M = K(c_1\alpha_0 + \beta)$ で $[K(\alpha_0) : K] \leq [K(c_1\alpha_0 + \beta) : K]$ となるが α_0 の定義から $[K(\alpha_0) : K] = [K(c_1\alpha_0 + \beta) : K]$ で $K(\alpha_0) = K(c_1\alpha_0 + \beta) = M$ である。そして任意にとった $\beta \in L$ が $M = K(\alpha_0)$ に含まれるので $L = K(\alpha_0)$ となるから L/K は原始元 α_0 をもつ。□

例 9.15. $L := F_p(X, Y), K := F_p(X^p, Y^p)$ とする。この中間体として $K(f_i), f_i := X + g_i Y, g_i \in F_p(X, Y)$ をとると、 $g_i \neq g_j \Rightarrow K(f_i) \neq K(f_j)$ となり、 g_i のとり方は無限個あるので L/K の中間体は無限個あるから L/K に原始元は存在しない。

例 9.16. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ は $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ ともできるので原始元が存在するから中間体は有限個。

9.4 分離閉体、分離閉包

定義 9.17. L/K : 拡大に対して K の L の中での 相対的分離 (代数) 閉包 (relative separable (algebraic) closure) L_s とは

$$L_s := \{x \in L | x \text{ は } K \text{ 上分離的}\}$$

となるもの。これは命題 (9.10) の (2) \Leftrightarrow (1) より K 上代数的かつ分離的な拡大で L に含まれる代数的かつ分離的な拡大のうち最大のもの。

定義 9.18. L/K が代数拡大とする。 $L_s = K$ となるときこの拡大を純非分離拡大という。

定義 9.19. 体 Ω が分離閉体 (separably closed) とはその分離的代数拡大は Ω のみであること。

定義 9.20. Ω が体 K の分離閉包 (separable closure) とは K の代数拡大で分離閉体であること。 K 上分離閉な拡大ともいう。

命題 9.21. $\Omega : K$ 上代数閉な拡大とするとき

- (1) Ω_s は K の分離閉包。
- (2) K の分離閉包は K 上の同型を除き一意

Proof. (1) L を Ω_s の分離的代数拡大とする。 Ω_s は K 上代数的な元の集合でもあるので Ω が K 上の代数閉包より拡大 Ω/Ω_s がつくれる。 L/Ω_s は代数拡大で Ω は代数閉体なので命題 (7.5) から Ω_s –準同型 $u : L \rightarrow \Omega$ が存在し、 Ω の中に L を $u(L)$ として埋め込める。このとき Ω の中で $u(L)/\Omega_s, \Omega_s/K$ はともに分離的なので命題 (9.12) の (3) より $u(L)/K$ は分離的で u は Ω_s –準同型から K –準同型でもあるので構造を保存するから $u(L)/K$ は代数拡大。したがって $u(L)/K$ は代数的かつ分離的な拡大であり $\Omega_s \subset u(L)$ なので相対的分離閉包の最大性から $\Omega_s = u(L)$ となる。これより u の終域を制限して Ω_s –準同型 $u : L \rightarrow \Omega_s$ とできる。これは体の準同型から単射であり、 $u(L) = \Omega_s$ より全射なので同型なので $L \cong \Omega_s$ となる。そして、 L は Ω_s の拡大なので $\Omega_s \subset L$ から $L = \Omega_s$ となる。 Ω_s の任意の分離的代数拡大は Ω_s だけであることが示されたので Ω_s は分離閉体である。相対的分離閉包の定義から K の代数拡大でもあるので K の分離閉包である。

(2) E を K の分離閉包とする。 E は K の代数拡大より Ω が K の代数閉包より定理 (7.5) から K –準同型 $v : E \rightarrow \Omega$ が存在して E を Ω に $v(E)$ として埋め込める。 v は構造を保存するから $v(E)$ は K の分離閉包なので分離的代数拡大になっているから Ω_s の最大性より $v(E) \subset \Omega_s$ であり、 $v(E)$ は Ω_s/K の中間体となっている。 Ω_s/K が分離的より命題 (9.12) の (3) から $\Omega_s/v(E)$ は分離的。 $v(E)$ が K の分離閉包より分離閉体だから $v(E)$ の分離拡大はそれ自身だけなので $v(E) = \Omega_s$ である。 $E \subset \Omega_s$ は一般に言っていないので $E = \Omega_s$ とはならない。これより、 v の終域を制限した K –準同型 $v : E \rightarrow \Omega_s$ は同型写像になるので任意の K の分離閉包は Ω_s と同型になるから同型を除いて一意に定まる。 \square

系 9.22. L/K : 分離的代数拡大、 E/K : 分離閉な拡大としたときある K –準同型 $\phi : L \rightarrow E$ が存在する。
(任意の分離的代数拡大は分離閉体 E に埋め込める)

定理 (7.5) の代数閉体のときと同じである。

Proof. Ω を E の代数閉包とすると K の Ω の中での相対的分離閉包 Ω_s は K 上分離的な元の集合なので $\Omega_s \subset E$ である。 Ω は K 上代数閉でもあるので命題 (9.21) の (1) より Ω_s は K の分離閉包となるから (2) と $\Omega_s \subset E$ から同型より更に、 $\Omega_s = E$ となる。また、 Ω は K の代数閉包であるから L/K が代数拡大より定理 (7.5) から K –準同型 $v : L \rightarrow \Omega$ が存在する。 v は構造を保存するから $v(L)$ は K 上分離的かつ代数的であるから、 $v(L) \subset \Omega_s = E$ である。したがって K –準同型 $v : L \rightarrow E$ が存在する。 \square

9.5 非分離次数

定義 9.23. L/K とその K の L の中での相対的分離閉包 L_s について $[L : K]_i := [L : L_s]$ を L/K の非分離次数 (inseparable degree) という。

補題 9.24. 有限次拡大 L/K とその相対的分離閉包 L_s について $x \in L - L_s$ の L_s 上の最小多項式 $f \in L_s[X]$ はある素数 p と正整数 e と $y = x^{p^e} \in L_s$ で $f = X^{p^e} - y$ と書ける。

Proof. L/K が有限次拡大より代数拡大である。 $\text{char}(K) = 0$ のとき K は完全体より系 (9.5) の (1) \Leftrightarrow (3) からその任意の代数拡大 L/K は分離的なので $L = L_s$ となる。したがって $L - L_s = \emptyset$ より補題は成立する。

$\text{char}(K) = p > 0$ のときのみを考える。 f の根 x は K 上分離的な元の集合の L_s に含まれないので非分離的な元である。したがって f は非分離的なので命題 (9.4) の (1) \Leftrightarrow (4) から $\text{char}(K) = p > 0$ で考えていることに注意すれば $f \in L_s[X^p]$ である。よって $f = g_1(X^p), g_1 \in L_s[X]$ となる g_1 が存在する。もし g_1 が非分離的であるとまた f と同様に $g_1 \in L_s[X^p]$ となるから $g_1 = g_2(X^p), g_2 \in L_s[X]$ となる g_2 が存在し、 $f = g_2(X^{p^2})$ となる。これを g_n と g_{n+1} に帰納的に繰り返せば f, g_i が有限次よりあるところで分離的な多項式になり止まるのでこれを $g_e = g$ とおくと $f = g(X^{p^e}), g \in L_s[X], e \in \mathbb{Z}$ と書ける。 $f \in L_s[X^p]$ より $\deg(f) = p^{e'}$ とおけるので $p^e \cdot \deg(g) = \deg(f) = p^{e'}$ が成り立つ。

f は x を根として持つので $f(x) = g(x^{p^e}) = 0$ より g の根でもある。この g の根を y とすると y は L_s 上分離的で $y = x^{p^e} \in L$ である。 L_s 上分離的な元なので定義より $L_s(y)/L_s$ が分離的となるが L_s は命題 (9.21) の (1) より分離閉体なので $L_s(y) = L_s$ とならなくてはならない。したがって $y \in L_s$ である。ここで $h(X) = X^{p^e} - y$ とすると $h(X) \in L_s[X]$ であり、 $\text{char}(K) = p > 0$ より $(X - x)^{p^e} = X^{p^e} - x^{p^e} = X^{p^e} - y = h(X)$ から $h(X)$ は x を根にもつ L_s 上の多項式となる。

このとき $\deg(g) > 1$ と仮定すると $p^e \cdot \deg(g) = p^{e'}$ の等式より $p^{e'-e} = \deg(g) > 1$ から $e' > e$ となるから $\deg(h) = p^e < p^{e'} = \deg(f)$ となる。しかしこれは f の最小性に矛盾するから $\deg(g) = 1$ である。したがって $g(X) = X - y$ より $f(X) = g(X^{p^e}) = X^{p^e} - y$ となるので $x \in L - L_s$ の最小多項式は $x^{p^e} = y$ となる $y \in L_s$ によって $X^{p^e} - y$ とかける。

□

命題 9.25. 有限次拡大 L/K について

$$[L : K]_s = [L_s : K]$$

がなりたつ。

Proof. Ω を K の代数閉包とする。 L_s/K は命題 (9.10) の (2) \Leftrightarrow (1) より分離的なので $[L_s : K]_s = [L_s : K] = |\text{Hom}_K(L_s, \Omega)|$ となる。そして、 $[L : K]_s = |\text{Hom}_K(L, \Omega)|$ であるから定義域を制限する写像 $\text{Hom}_K(L_s, \Omega) \rightarrow \text{Hom}_K(L, \Omega)$ が全単射であることを示せば $[L : K]_s = [L_s : K]$ となることが示される。

・全射性

$\forall \phi \in \text{Hom}_K(L_s, \Omega)$ の L への拡張を $\tilde{\phi} \in \text{Hom}_K(L, \Omega)$ とする。補題 (9.24) から $x \in L - L_s$ の L_s 上の最小多項式がある素数 p と $n \in \mathbb{Z}$ と $a \in L_s$ で $X^{p^n} - a$ の形になる。よって $\tilde{\phi}(x)^{p^n} = \tilde{\phi}(x^{p^n}) = \tilde{\phi}(a) = \phi(a)$ より $\tilde{\phi}(x) = \phi(a)^{1/p^n}$ と定まる。この $\tilde{\phi}$ をとればいいので全射

・単射性

$\phi \in \text{Hom}_K(L_s, \Omega)$ の $\tilde{\phi} \in \text{Hom}_K(L, \Omega)$ への延長は $\tilde{\phi}(x) = \phi(a)^{1/p^n}$ より ϕ に依るので一意的なので単射。

□

10 ノルムとトレース

10.1 ノルムとトレース

定義 10.1. A : 有限次 K -alg とする。 $x \in A$ に対して x 倍写像

$$\begin{aligned} T_x : A &\longrightarrow A \\ a &\longmapsto xa \end{aligned}$$

は A が K -alg より K -線形写像になる。よって $\dim_K(A) = n$ のときある A の基底 $\{e_1, \dots, e_n\}$ により、 $T_x = (t_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ とおいたとき行列表示は

$$T_x(e_j) = xe_j = \sum_{i=1}^n t_{ij}e_i$$

を満たすような $t_{ij} \in K$ で作られてこれにより行列 $T_x : K^n \longrightarrow K^n$ にできて行列の記法で

$$x(e_1, \dots, e_n) = (e_1, \dots, e_n)T_x$$

と書くことができる。

この行列 T_x について x の トレース (trace) $\mathrm{Tr}_{A/K}(x)$ と x の ノルム (norm) $\mathrm{N}_{A/K}(x)$ を

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{A/K}(x) &:= \mathrm{Tr}(T_x) \\ \mathrm{N}_{A/K}(x) &:= \det(T_x) \end{aligned}$$

とするとこの値は K の元であるから

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{A/K} : A &\longrightarrow K \\ \mathrm{N}_{A/K} : A &\longrightarrow K \end{aligned}$$

という写像になっていて $\mathrm{Tr}_{A/K}$ は K -線形写像、 $\mathrm{N}_{A/K}$ は乗法的 ($\mathrm{N}(xy) = \mathrm{N}(x)\mathrm{N}(y)$) である。とくに、定義域を乗法群 A^\times に制限すれば

$$\mathrm{N}_{A/K}|_{A^\times} : A^\times \longrightarrow K$$

は群準同型になる。

例 10.2. $x \in K$ のとき $n := [A : K]$ として、 A の基底を $\{e_1, \dots, e_n\}$ とする。 $T_x = (t_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ とおいたとき行列表示は

$$T_x(e_j) = \sum_{i=1}^n t_{ij}e_i$$

とできて $T_x(e_j) = xe_j$ で基底の一次独立性から $t_{jj} = x, t_{ij} = 0$ ($i \neq j$) となるので

$$T_x = \begin{pmatrix} x & & \\ & \ddots & \\ & & x \end{pmatrix}$$

と書ける。したがって $\mathrm{Tr}_{A/K}(x) = nx, \mathrm{N}_{A/K}(x) = x^n$ となる。

例 10.3. $A := K[X]/(f)$ で $f = X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n \in K[X]$ とする。 $x := X + (f) \in A$ についてその x 倍写像 T_x は

$$T_x = \begin{pmatrix} 0 & & -a_n \\ 1 & \ddots & \vdots \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_1 \end{pmatrix}$$

と書けるから $\text{Tr}_{A/K}(x) = -a_1, N_{A/K}(x) = (-1)^n a_n$ となる。

Proof. $x \in A$ はその定義から f の根になっている。命題 (6.7) の (2) より $\{1, x, \dots, x^{n-1}\}$ は A の基底になっているのでこの基底を用いて T_x を行列表示にする。 $T_x := (t_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ は x の指数を考えれば

$$T_x(x^j) = \sum_{i=0}^{n-1} t_{i+1,j+1} x^i \quad (0 \leq j \leq n-1)$$

とできる。 $T_x(x^j) = x^{j+1}$ ($0 \leq j \leq n-1$) より $1 \leq j+1 \leq n-1$ のとき

$$t_{i+1,j+1} = \begin{cases} 1 & (j+1 = i) \\ 0 & (j+1 \neq i) \end{cases}$$

$j+1 = n$ のとき $x \cdot x^{n-1} = x^n = X^n + (f) = -a_1X^{n-1} - \cdots - a_n + (f) = -a_1x^{n-1} - \cdots - a_n$ であるので

$$\begin{aligned} T_x(x^{n-1}) &= x^n = -a_1x^{n-1} - a_2x^{n-2} - \cdots - a_n \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} t_{i+1,n} x^i = t_{nn}x^{n-1} + t_{n-1,n}x^{n-2} + \cdots + t_{1n} \end{aligned}$$

より $t_{n-k,n} = -a_{k+1}$ となる。よって T_x は上記の形になる。

$\text{Tr}_{A/K}(x) = \text{Tr}(T_x) = -a_1$ は明らか。 $N_{A/K}(x) = \det(T_x)$ は n 列をとなりの列と順番に入れ替えていけば入れ替えるごとに -1 倍されて 1 列まで移動させれば行列式の性質より $\det(T_x) = (-1)^{n-1}(-a_n) \det(E_n) = (-1)^n a_n$ となる。 \square

Fact 10.4. $L/M/K$ に対し、 Tr, N は推移的。つまり、

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{L/K} &= \text{Tr}_{M/K} \circ \text{Tr}_{L/M} \\ N_{L/K} &= N_{M/K} \circ N_{L/M} \end{aligned}$$

が成り立つ。

10.2 正則表現

命題 10.5. 体拡大 L/K について x 倍写像を作る対応 T を L の K 上の基底 $\{e_1, \dots, e_n\}$ によって $T_x \in M_n(K)$ で考えると

$$\begin{aligned} T : L &\longrightarrow M_n(K) \\ x &\longmapsto T_x \end{aligned}$$

は T_x の成分の定まり方より写像であり、単射環準同型になる。この K 上の写像 T を基底 $\{e_1, \dots, e_n\}$ に関する A/K の 正則表現 という。

Proof. $T_x, T_y, T_{x+y}, T_{cx}, T_{xy} \in M_n(K)$ ($x, y \in A, c \in K$) についてこれはそれぞれ

$$\begin{aligned} x(e_1, \dots, e_n) &= (e_1, \dots, e_n)T_x \\ y(e_1, \dots, e_n) &= (e_1, \dots, e_n)T_y \\ (x+y)(e_1, \dots, e_n) &= (e_1, \dots, e_n)T_{x+y} \\ cx(e_1, \dots, e_n) &= (e_1, \dots, e_n)T_{cx} \\ xy(e_1, \dots, e_n) &= (e_1, \dots, e_n)T_{xy} \end{aligned}$$

を満たしている。それぞれ演算結果が等しくなることを考えれば

$$\begin{aligned} T_{x+y} &= T_x + T_y \\ T_{cx} &= cT_x \\ T_{xy} &= T_x T_y \end{aligned}$$

を満たすので $T: L \rightarrow M_n(K)$ は環準同型である。

また、 e_j が基底なので $T(x) = T_x = 0 \Leftrightarrow t_i j = 0(\forall i, j) \Leftrightarrow x e_j = 0(\forall j) \Leftrightarrow x = 0$ が成り立つから $\ker(T) = \{0\}$ より T は単射。 \square

10.3 分離拡大のノルムとトレース

命題 10.6. $L/K: n$ 次分離拡大、 $\Omega: K$ の代数閉包、 $\sigma_i \in \text{Hom}_K(L, \Omega)$, ($1 \leq i \leq n = [L: K] = [L: K]_s$ (分離拡大より)) とする。このとき L の n 個の元 e_1, \dots, e_n について次は同値。

- (1) e_1, \dots, e_n は L/K の基底。
- (2)

$$\det(\sigma_i(e_j)) = \begin{vmatrix} \sigma_1(e_1) & \cdots & \sigma_1(e_n) \\ \sigma_2(e_1) & \cdots & \sigma_2(e_n) \\ \vdots & & \vdots \\ \sigma_n(e_1) & \cdots & \sigma_n(e_n) \end{vmatrix} \neq 0$$

Proof. (1) \Rightarrow (2)

$\det(\sigma_i(e_j)) = 0$ と仮定すると $X = (\sigma_i(e_j))$ とおいたとき $\vec{x}X = 0$ は非自明解 $(c_1, \dots, c_n) \in \Omega^n$ をもつ。つまり $\sum_{i=1}^n c_i \sigma_i(e_j) = 0$ ($1 \leq j \leq n$) となるものが存在している。このとき任意の元 $\alpha \in L$ に対して、基底であることより $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i e_i$ となる $a_i \in K$ が存在する。このとき σ_i は K を動かさないので

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c_i \sigma_i(\alpha) &= \sum_{i=1}^n c_i \sigma_i \left(\sum_{i=1}^n a_i e_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n c_i \sum_{j=1}^n a_j \sigma_i(e_j) \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \sum_{i=1}^n c_i \sigma_i(e_j) \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

となるが c_i は全ては 0 で無いので Dedekind の補題 (2.6) に矛盾する。よって $\det(\sigma_i(e_j)) \neq 0$

(2) \Rightarrow (1)

(2) を満たすような e_1, \dots, e_n が一次独立であることを示す。 $c_1 e_1 + \dots + c_n e_n = 0$ となる $c_i \in K$ をとる。全体に σ_j をかけると $\sum_{i=1}^n c_i \sigma_j(e_i) = 0$ であるから

$$\begin{pmatrix} \sigma_1(e_1) & \cdots & \sigma_1(e_n) \\ \vdots & & \vdots \\ \sigma_n(e_1) & \cdots & \sigma_n(e_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0$$

となる。ここで仮定より $\det(\sigma_i(e_j)) \neq 0$ なのでこの連立方程式は自明解のみをもつから $c_1 = \dots = c_n = 0$ であるので e_1, \dots, e_n は一次独立。 L/K は n 次拡大なので基底の個数は n 個だからこの e_1, \dots, e_n が基底になる。 \square

命題 10.7. $L/K : n$ 次分離拡大、 Ω を K の代数閉包、 $\sigma_i : L \rightarrow \Omega, \alpha \mapsto \alpha^{\sigma_i} (= \alpha^{(i)}) := \sigma_i(\alpha), \sigma_i \in \text{Hom}_K(L, \Omega)$ としたとき $\alpha \in L$ について

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{L/K}(\alpha) &= \sum_{i=1}^n \alpha^{(i)} = \sum_{i=1}^n \alpha^{\sigma_i} \\ N_{L/K}(\alpha) &= \prod_{i=1}^n \alpha^{(i)} = \prod_{i=1}^n \alpha^{\sigma_i} \end{aligned}$$

となる。

Proof. L/K の基底を e_1, \dots, e_n とする。任意の $\alpha \in L$ についてこの基底による正則表現 $T : L \rightarrow M_n(K), \alpha \mapsto T_\alpha$ は $\alpha(e_1, \dots, e_n) = (e_1, \dots, e_n)T_\alpha$ を満たす。これに σ_i をかけると $\sigma_i(T_\alpha) = T_\alpha$ であり、 $\alpha^{(i)}(e_1^{(i)}, \dots, e_n^{(i)}) = (e_1^{(i)}, \dots, e_n^{(i)})T_\alpha$ となる。これは

$$T_\alpha^\circ := \begin{pmatrix} \alpha^{(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha^{(n)} \end{pmatrix}$$

と $M := (e_j^{(i)})_{i,j=1,\dots,n}$ によって $T_\alpha^\circ M = M T_\alpha$ となる。命題 (10.6) の (1) \Rightarrow (2) より $\det(M) \neq 0$ なので正則行列より M^{-1} が存在するから $T_\alpha = M^{-1} T_\alpha^\circ M$ とできる。したがって Tr と \det の性質から

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{L/K}(\alpha) &= \text{Tr}(T_\alpha) = \text{Tr}(M^{-1} T_\alpha^\circ M) = \text{Tr}(T_\alpha^\circ) = \sum_{i=1}^n \alpha^{(i)} = \sum_{i=1}^n \alpha^{\sigma_i} \\ N_{L/K}(\alpha) &= \det(T_\alpha) = \det(M^{-1} T_\alpha^\circ M) = \det(T_\alpha^\circ) = \prod_{i=1}^n \alpha^{(i)} = \prod_{i=1}^n \alpha^{\sigma_i} \end{aligned}$$

が成り立つ。 \square

系 10.8. L/K が有限次分離拡大なら $\text{Tr}_{L/K}(\alpha) \neq 0$ となる $\alpha \in L$ が存在する。

Proof. 任意の $\alpha \in L$ について命題 (10.7) から $\text{Tr}_{L/K}(\alpha) = \sum_{i=1}^n \alpha^{(i)}$ であり、これが 0 に等しいとすると命題 (??) に矛盾するからある $\alpha \in L$ で $\text{Tr}_{L/K}(\alpha) \neq 0$ となる。 \square

補題 10.9. L/K を標数 $p > 0$ の有限次純非分離拡大とする。このとき $\alpha \in L$ について以下が成立する。

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) &= [L : K]\alpha \\ \mathrm{N}_{L/K}(\alpha) &= \alpha^{[L:K]}\end{aligned}$$

とくに $[L : K] > 1$ のとき $\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) = 0$ である。

Proof. 標数 $p > 0$ の体の有限次拡大なので $[L : K] = p^e, [L : K(\alpha)] = p^f, [K(\alpha) : K] = p^g, f + g = e$ とする。 $\mathrm{char}(K) = p > 0$ の純非分離拡大なので $K = L_s$ から、補題 (9.24) より α の最小多項式 $f(X) \in K[X]$ が存在して命題 (6.14) より次数は $p^g = [K(\alpha) : K]$ なので $f = X^{p^g} - \alpha^{p^g} = (X - \alpha)^{p^g}$ とかける。 Tr と N の推移律から

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) &= \mathrm{Tr}_{K(\alpha)/K}(\mathrm{Tr}_{L/K(\alpha)}(\alpha)) \\ \mathrm{N}_{L/K}(\alpha) &= \mathrm{N}_{K(\alpha)/K}(\mathrm{N}_{L/K(\alpha)}(\alpha))\end{aligned}$$

である。 $\alpha \in K(\alpha)$ より例 (10.2) から $\mathrm{Tr}_{L/K(\alpha)}(\alpha) = [L : K(\alpha)](\alpha), \mathrm{N}_{L/K(\alpha)}(\alpha) = \alpha^{[L:K(\alpha)]}$ であることと Tr が準同型で N が乗法的であることより

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) &= \mathrm{Tr}_{K(\alpha)/K}([L : K(\alpha)]\alpha) = [L : K(\alpha)]\mathrm{Tr}_{K(\alpha)/K}(\alpha) = p^f \mathrm{Tr}_{K(\alpha)/K}(\alpha) \\ \mathrm{N}_{L/K}(\alpha) &= \mathrm{N}_{K(\alpha)/K}(\alpha^{[L:K(\alpha)]}) = (\mathrm{N}_{K(\alpha)/K}(\alpha))^{[L:K(\alpha)]} = \mathrm{N}_{K(\alpha)/K}(\alpha)^{p^f}\end{aligned}$$

となる。また、 $K(\alpha) = K[X]/(f)$ より例 (10.3) から $f = X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n$ のとき $\mathrm{Tr}_{K(\alpha)/K}(\alpha) = -a_1, \mathrm{N}_{K(\alpha)/K}(\alpha) = (-1)^n a_n$ である。二項定理より $f = (X - \alpha)^{p^g} = X^{p^g} - p^g X^{n-1} \alpha + \cdots + (-\alpha)^{p^g}$ なので $a_1 = -p^g \alpha, a_n = (-\alpha)^{p^g}$ であるのでこれを代入すれば

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) &= p^f \cdot -(-p^g \alpha) = p^{f+g} \alpha = p^e \alpha = [L : K]\alpha \\ \mathrm{N}_{L/K}(\alpha) &= ((-1)^{p^g} (-\alpha)^{p^g})^{p^f} = ((-1)^{2p^g} \alpha^{p^g})^{p^f} = \alpha^{p^e} = \alpha^{[L:K]}\end{aligned}$$

となり、示された。 $[L : K] = p^e$ より $[L : K] > 1$ では p の幂なので $\mathrm{char}(K) = p > 0$ より $\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) = 0$ である。 \square

補題 10.10. 有限次拡大 L/K に対して、 K の代数閉包を Ω とし $\sigma_i \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega), 1 \leq i \leq s := [L : K]_s$ とする。このとき $\forall \alpha \in L$ に対して

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) &= [L : K]_i \sum_{i=1}^s \alpha^{\sigma_i} \\ \mathrm{N}_{L/K}(\alpha) &= \left(\prod_{i=1}^s \alpha^{\sigma_i} \right)^{[L:K]_i}\end{aligned}$$

となる。(命題 (10.7) では有限次分離拡大であったがより一般に有限次拡大で述べている)

Proof. 定義より $[L : K]_i = [L : L_s], s = [L : K]_s = |\mathrm{Hom}_K(L, \Omega)|$ である。命題 (??) から $s = [L : K]_s = [L_s : K]$ となっていてその証明から $\mathrm{Hom}_K(L_s, \Omega)$ と $\mathrm{Hom}_K(L, \Omega)$ の間の定義域を制限する写像が全単射であるから $\sigma_i \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega)$ に対して $\sigma_i|_{L_s} \in \mathrm{Hom}_K(L_s, \Omega)$ が全部で s 個ある。このとき $\forall \alpha \in L$ に対して L/L_s は定義から純非分離拡大なので命題 (10.9) から

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{L/L_s}(\alpha) &= [L : L_s]\alpha = [L : K]_i \alpha \\ \mathrm{N}_{L/L_s}(\alpha) &= \alpha^{[L:L_s]} = \alpha^{[L:K]_i}\end{aligned}$$

となる。 $\text{Tr}_{L/L_s}, \text{N}_{L/L_s}$ はともに $L \rightarrow L_s$ の写像なので $[L : K]_i \alpha, \alpha^{[L:K]_i} \in L_s$ である。

命題 (10.7) から $\text{Tr}_{L_s/K}, \text{N}_{L_s/K}$ について $\sigma_i|_{L_s} : L_s \rightarrow \Omega, 1 \leq i \leq s$ より

$$\begin{aligned}\text{Tr}_{L_s/K}(\beta) &= \sum_{i=1}^s \beta^{\sigma_i|_{L_s}} = \sum_{i=1}^s \beta^{\sigma_i} \\ \text{N}_{L_s/K}(\gamma) &= \prod_{i=1}^s \gamma^{\sigma_i|_{L_s}} = \prod_{i=1}^s \gamma^{\sigma_i}\end{aligned}$$

となる。 $\beta := [L : K]_i \alpha, \gamma := \alpha^{[L:K]_i}$ とすれば推移律より

$$\begin{aligned}\text{Tr}_{L/K}(\alpha) &= \text{Tr}_{L_s/K}(\text{Tr}_{L/L_s}(\alpha)) = \text{Tr}_{L_s/K}(\beta) = \sum_{i=1}^s \beta^{\sigma_i} = \sum_{i=1}^s [L : K]_i \alpha^{\sigma_i} = [L : K]_i \sum_{i=1}^s \alpha^{\sigma_i} \\ \text{N}_{L/K}(\alpha) &= \text{N}_{L_s/K}(\text{N}_{L/L_s}(\alpha)) = \text{N}_{L_s/K}(\gamma) = \prod_{i=1}^s \gamma^{\sigma_i} = \prod_{i=1}^s \left(\alpha^{[L:K]_i} \right)^{\sigma_i} = \left(\prod_{i=1}^s \alpha^{\sigma_i} \right)^{[L:K]_i}\end{aligned}$$

となり成立する。 \square

系 10.11. L/K を有限次非分離拡大で $[L : K] > 1$ とすれば任意の $\alpha \in L$ について $\text{Tr}_{L/K}(\alpha) = 0$ となる。

(補題 (10.9) は純非分離拡大のみだったが一般の非分離拡大で成り立つことを述べている)

Proof. $\text{char}(K) = 0$ は分離拡大なので $\text{char}(K) = p > 0$ とする。このとき $[L : K] > 1$ から $[L : K] = p^e$ ($e \in \mathbb{Z}^+$) であるから $[L : K]_i = [L : L_s] = p^f$ ($f \in \mathbb{Z}^+$) となる。補題 (10.10) より任意の $\alpha \in L$ で $\text{Tr}_{L/K}(\alpha) = [L : K]_i \sum_{i=1}^s \alpha^{\sigma_i} = p^f \sum_{i=1}^s \alpha^{\sigma_i}$ となる。これは $\text{char}(K) = p > 0$ より 0 になるので示された。 \square

命題 10.12. 有限次拡大 L/K について以下は同値

- (1) L/K は分離拡大。
- (2) $\text{Tr}_{L/K}(\alpha) \neq 0$ となる $\alpha \in L$ が存在する。

Proof. (1) \Rightarrow (2)

系 (10.8) で示した。

(2) \Rightarrow (1)

$[L : K] > 1$ のとき系 (10.11) の対偶をとればよい。 $[L : K] = 1$ のとき L_s は $K \subset L_s \subset L$ であり、 $L = K$ から $L_s = L$ なので $L/K = L_s/K$ は分離拡大。 \square