

## 8 etale 代数

### 8.1 対角化

以下ではとくに述べない限り  $K$  を可換体とする。

**定理 8.1.**  $A : K\text{-alg}$  と  $L/K : \text{拡大}$  としたときに集合  $\mathcal{H} := \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$  は  $L$ -ベクトル空間  $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)$  の中で  $L$  上一次独立。

*Proof.*  $A$  を  $K\text{-vect.sp}$  として見ればこれは加法群であるので Dedekind の補題から従う。  $\square$

**補題 8.2.**  $\dim_L(\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)) = [\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L) : L] = [A : K]$  が成り立つ。

*Proof.*  $A_{(L)} := L \otimes_K A$  としてその双対空間を  $(A_{(L)})^* := \text{Hom}_L(A_{(L)}, L)$  とする。以下簡単のため  $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)$  を  $\text{Hom}(A, L)$  と書く。 $\bar{\cdot} : (A_{(L)})^* \rightarrow \text{Hom}(A, L), u \mapsto \bar{u}$  で  $\bar{u} : A \rightarrow L, x \mapsto \bar{u}(x) = u(1 \otimes x)$  とすればこの  $\bar{\cdot}$  は同型であり双対空間であることから  $\dim_L A_{(L)} = \dim_L (A_{(L)})^* = \dim_L \text{Hom}(A, L)$  である。 $\dim_L A_{(L)} = \dim_K A$  より従う。  $\square$

**系 8.3.** 上の状況において  $h(L)(= h_A(L)) := |\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)| \leq [A : K]$  が成り立つ。

*Proof.*  $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$  は  $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)$  で一次独立より  $h(L) \leq \dim_L(\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L))$  である。補題 (8.2) の  $\dim_L(\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, L)) = [A : K]$  より従う。  $\square$

**定義 8.4.**  $K\text{-alg}$  の  $A$  が対角化可能 (diagonalizable) とは  $\exists n \geq 1, A \cong K^n$  であること。とくに  $n = [A : K]$  である。 $K^n$  は成分ごとの演算を行う直積代数である。

*Proof.*  $n = [A : K]$  であることは  $A$  を  $K$ -ベクトル空間と見ることからわかる。  $\square$

**定義 8.5.**  $A$  が拡大  $L/K$  により対角化される (diagonaled by  $L$ ) とは  $L\text{-alg}$  の  $L \otimes_K A$  が対角化可能であること。

**定義 8.6.**  $A$  が  $K$  上 etale とは  $\exists$  拡大  $L/K$  により対角化されること。

**Rem 8.7.**  $(e_1, \dots, e_n)$  が  $K^n (\cong A)$  の標準基底とすると成分ごとの演算を行うから  $e_i^2 = e_i, e_i e_j = 0 (i \neq j), e_1 + \dots + e_n = 1_A$  となる。

**命題 8.8.** 有限次  $K\text{-alg}$   $A$  について次は同値 ( $n = [A : K]$  とする)

- (1)  $A$  は対角化可能。
- (2)  $A$  の  $K$  上の基底  $(e_1, \dots, e_n)$  で  $e_i^2 = e_i, e_i e_j = 0 (i \neq j)$  を満たすものが存在する。
- (3)  $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, K)$  は  $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(A, K)$  を生成する。

*Proof.* (1)  $\Rightarrow$  (2) は Rem (8.7) より成立。

(2)  $\Rightarrow$  (1)

$A_i = Ke_i$  とすると  $A_i \cong K$  で  $A = \{k_1 e_1 + \dots + k_n e_n | k_i \in K\} = A_1 \times \dots \times A_n \cong K^n$  より対角化可能。

(3)  $\Rightarrow$  (1)

有限次  $K\text{-alg}$  なので  $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, K) = \{\pi_1, \dots, \pi_n\}$  とする。これは定理 (8.1) より一次独立で

仮定から全体を張るので  $\text{Hom}_{K-\text{vect.sp}}(A, K)$  の基底になる。そしてそれを並べた  $K$ -代数の準同型  $\pi := (\pi_1, \dots, \pi_n) : A \longrightarrow K^n, a \longmapsto (\pi_1(a), \dots, \pi_n(a))$  とする。  $\square$

系 8.9. 系 (8.3) における  $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| \leq [A : K]$  について

$$|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = [A : K] \Leftrightarrow A \text{ は } L \text{ で対角化される。}$$

*Proof.*  $\pi : \text{Hom}_{K-\text{vect.sp}}(A, L) \longrightarrow \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(L \otimes_K A, L), u \longmapsto \pi u$  とし、 $L$ -線形写像で  $\pi u : A_{(L)} \longrightarrow L, (1 \otimes x) \longmapsto (\pi u)(1 \otimes x) := u(x)$  とする。 $\pi$  は準同型で  $\pi u = 0 \Rightarrow \forall x \in A, u(x) = 0 \Leftrightarrow u = 0$  で単射。 $\forall v \in \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(A_{(L)}, L), u(x) := v(1 \otimes x)$  とおけば  $\pi u = v$  となるので全射より  $\pi$  は同型なので  $\dim_L \text{Hom}_{K-\text{vect.sp}}(A, L) = \dim_L \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(L \otimes_K A, L)$  が成立する。

また、始域と終域を代数の準同型に制限して  $\pi : \text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L) \longrightarrow \text{Hom}_{L-\text{alg}}(L \otimes_K A, L)$  でも同様に全単射になるから  $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = |\text{Hom}_{L-\text{alg}}(L \otimes_K A, L)|$  である。

命題 (8.8) の (1)  $\Leftrightarrow$  (3) で  $A$  を  $L \otimes_K A$  で置き換えて、補題 (8.2) も用いれば

$$\begin{aligned} A \text{ は } L \text{ で対角化される} &\Leftrightarrow L \otimes_K A \text{ は対角化可能} \\ &\Leftrightarrow \text{Hom}_{L-\text{alg}}(A_{(L)}, L) \text{ は } \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(A_{(L)}, K) \text{ を生成する。 (基底になる)} \\ &\Leftrightarrow |\text{Hom}_{L-\text{alg}}(A_{(L)}, L)| = \dim_L \text{Hom}_{L-\text{vect.sp}}(A_{(L)}, K) \\ &\Leftrightarrow |\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = |\text{Hom}_{L-\text{alg}}(A_{(L)}, L)| \\ &\quad = \dim_L \text{Hom}_{L-\text{v.s}}(A_{(L)}, L) = \dim_L \text{Hom}_{K-\text{v.s}}(A, L) = [A : K] \\ &\Leftrightarrow |\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = [A : K] \end{aligned}$$

$\square$

命題 8.10.  $K$ -alg  $A$  について次は同値。

- (1)  $A$  は  $K$  上 etale である。 ( $\Leftrightarrow \exists$  拡大により対角化される)
- (2)  $A$  は  $K$  の  $\exists$  有限次拡大により対角化される。
- (3)  $A$  は  $K$  の  $\forall$  代数閉な拡大により対角化される。
- (4)  $A$  は  $K$  の  $\exists$  代数閉な拡大により対角化される。

*Proof.* (3)  $\Rightarrow$  (4)  $\Rightarrow$  (1) は明らか。

(1)  $\Rightarrow$  (2)  $\Rightarrow$  (3) を示す。

(1)  $\Rightarrow$  (2)

(1)  $\Leftrightarrow \exists L/K$  により対角化される。系 (8.9) から  $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L)| = [A : K] = n$  となる。 $\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, L) = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$  とすると  $\phi_i(A)$  は  $L$  の部分体で対角化可能だから  $\phi_i(A) \otimes_K A \subset L \otimes_K A \cong K^n$  より  $\phi_i(A)$  は  $K$  上  $n$  次以下。よって  $M := (\phi_i(A) \text{ たちの合成})(\subset L)$  も  $K$  の有限次拡大となり、 $\text{Im}(\phi_i) \subset M$  より終域を制限することができるから  $\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, M) = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$  である。系 (8.9) より  $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, M)| = [A : K]$  だから  $A$  は  $K$  上有限次拡大の  $M$  で対角化されるから (2) が示された。

(2)  $\Rightarrow$  (3)

$A$  はある有限次拡大  $M$  で対角化されるとする。有限次拡大より Rem (??) から  $M$  は代数拡大でもある。また、 $K$  の任意の代数閉体  $\Omega$  をとると定理 (??)(Steinitz の定理) から  $M$  は  $\Omega$  に埋め込める。よって  $\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, M) \subset \text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, \Omega)$  である。ここで対角化されるので系 (8.9) から  $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, M)| = [A : K]$  になることと系 (8.3) から  $|\text{Hom}_{K-\text{alg}}(A, \Omega)| \leq [A : K]$  より

$|\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, M)| = |\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega)| = [A : K]$  となる。よって  $A$  は任意の代数閉体  $\Omega$  で対角化される。  $\square$

## 8.2 etale 代数の部分代数

以下では etale 代数  $A = K^n$  とし、その標準基底を  $\{e_1, \dots, e_n\}$  とする。

**命題 8.11.**  $[n] := \{1, \dots, n\}$  でこれを共通部分が無いように  $[n] = I_1 \sqcup \dots \sqcup I_r$  ( $I_j \neq \emptyset$ ) と分割する。 $I \subset [n]$  に対して  $e_I := \sum_{i \in I} e_i$  とする。 $[n] = I_1 \sqcup \dots \sqcup I_r$  に対し、 $A_{(I_1, \dots, I_r)} := Ke_{I_1} + \dots + Ke_{I_r}$  は  $A$  の部分  $K\text{-alg}$  である。

そして  $A$  の任意の部分  $K\text{-alg}$  は対角化可能で  $A_{(I_1, \dots, I_r)}$  のもので尽き、とくに有限個である。

*Proof.*  $e_{I_j}$  が  $A_{(I_1, \dots, I_r)}$  の標準基底になること。

$A_{(I_1, \dots, I_r)}$  の定義より全体を張り、一次独立性も保つ。 $e_i$  は標準基底より打ち消し合って幂等元より  $I_k \neq I_l$  とするとき

$$\begin{aligned} e_{I_k}^2 &= \left( \sum_{i \in I_k} e_i \right)^2 = \sum_{i \in I_k} e_i^2 = e_{I_k} \\ e_{I_k} e_{I_l} &= \left( \sum_{i \in I_k} e_i \right) \left( \sum_{i \in I_l} e_i \right) = 0 \\ e_{I_1} + \dots + e_{I_r} &= \sum_{i \in [n]} e_i = 1 \end{aligned}$$

より標準基底になるのでそれで  $K$  上張られている  $A_{(I_1, \dots, I_r)}$  は  $A$  の部分  $K\text{-alg}$  であり、命題 (8.8) の (2) から対角化可能である。

また、 $B$  を  $A$  の任意の部分代数とするとき射影

$$\begin{aligned} v_i : A (= K^n) &\longrightarrow K \\ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} &\longmapsto a_i \end{aligned}$$

の定義域を  $B$  に制限したものを考える。これを再度  $v_i$  とおくときこれは  $v_i \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K)$  である。

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in B, k \in K$$

とすると  $v_i(\alpha + \beta) = a_i + b_i = v_i(\alpha) + v_i(\beta)$ ,  $v_i(\alpha\beta) = a_i b_i = v_i(\alpha)v_i(\beta)$ ,  $v_i(k\alpha) = k a_i = k v_i(\alpha)$ ,  $v_i(1_{K^n}) = 1_K$  より  $v_i \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K)$  である。そして定義より  $v_i(e_j) = \delta_{ij}$  なので  $\{v_1, \dots, v_n\}$  は  $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(B, K)$  を生成する。つまり、 $f \in \text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(B, K)$  に対して  $v_i(c_1 e_1 + \dots + c_n e_n) = c_i$  より  $f = f(e_1)v_1 + \dots + f(e_n)v_n$  とすればよい。

したがって  $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K)$  の元  $v_1, \dots, v_n$  が  $\text{Hom}_{K\text{-vect.sp}}(B, K)$  を生成するので命題 (8.8) から任意の部分代数は対角化可能である。また、基底として  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$  で  $\varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \varepsilon_i \varepsilon_j = 0 (i \neq j)$  となるものが存在する。

この基底は  $A$  の元なので  $e_1, \dots, e_n$  で作られるが冪等性と総和が 1 になることを考えれば  $e_{I_1}, \dots, e_{I_r}$  で出し尽くされる。したがって全ての部分代数は  $A_{(I_1, \dots, I_r)}$  であり、 $[n]$  の分割を考えれば部分代数は有限個。  $\square$

**命題 8.12.** 各  $I \subset [n]$  に対し  $\mathfrak{a}_I := \sum_{i \in I} K e_i$  とするとこれは  $A$  のイデアルになる。そして  $A$  のイデアルはこれに尽き、とくに有限個である。

*Proof.*  $\mathfrak{a}_I$  は明らかに  $A$  のイデアルになる。

$A$  のイデアル  $\mathfrak{a}$  が  $\forall i \in I, e_i \in \mathfrak{a}$  で  $\forall j \in J := [n] - I, e_j \notin \mathfrak{a}$  となっているとする。定義より明らかに  $\mathfrak{a}_I \subset \mathfrak{a}$  である。 $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in \mathfrak{a}, x_i \in K$  と  $j \in J$  に対して  $e_j \in A, x \in \mathfrak{a}$  から  $x e_j \in \mathfrak{a}$  なので  $x e_j = x_1 e_1 e_j + \dots + x_n e_n e_j = x_j e_j \in \mathfrak{a}$  となる。ここで  $x_j = 0$  のとき  $x_j e_j = 0_{K^n} \in \mathfrak{a}$  である。 $x_j \neq 0$  のとき  $x_j e_j \in \mathfrak{a}$  とすると  $K$  が体より  $x_j^{-1}$  が存在して、 $x_j^{-1} e_j \in A$  であるからイデアルより  $x_j^{-1} e_j x_j e_j = e_j \in \mathfrak{a}$  となり、これは矛盾。したがって  $x_j e_j \in \mathfrak{a}$  であるときは  $x_j = 0$  である。これより  $x \in \mathfrak{a}$  は  $\sum_{i \in I} x_i e_i$  とかけるから  $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}_I$  なので  $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_I$ 。任意のイデアルはそれが含んでいる標準基底によってのみ決まるから  $\mathfrak{a}_I$  で全てであり  $I$  のとり方より有限個である。  $\square$

**Rem 8.13.**  $A = K^n$  のイデアル  $\mathfrak{a}$  はそれ自身は  $K\text{-alg}$  の構造を持つが、一般に  $A$  の部分  $K\text{-alg}$  ではない。

また、 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_I$  は  $A$  のイデアル  $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}_J = \mathfrak{a}_{[n]-I}$  の商  $K\text{-alg } A/\mathfrak{b}$  と同型である。

*Proof.*  $K\text{-alg}$  の構造を持つことは  $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_I$  で  $I = \{1, \dots, k (\neq n)\}$  とすると

$$\begin{aligned} \phi: K &\longrightarrow \mathfrak{a} \\ k &\longmapsto \begin{pmatrix} k \\ \vdots \\ k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

とするとこれは環準同型で  $K$  が可換体より  $\text{Im}(\phi) \subset (\mathfrak{a} \text{ の中心})$  より  $K\text{-alg}$  になる。一般の  $I$  についても同様。

また、 $\mathfrak{a}$  の単位元  $1_{\mathfrak{a}}$  は  $(\underbrace{1, \dots, 1}_k, 0, \dots, 0)$  であり、これは  $A$  の単位元  $1_A = (1, \dots, 1)$  と一致しないので  $A$  の部分  $K\text{-alg}$  ではない。

$I = \{1, \dots, k\}$  として考える。このとき  $J = \{k+1, \dots, n\}$  である。 $\psi: A \longrightarrow \mathfrak{a}, (a_1, \dots, a_n) \longmapsto (a_1, \dots, a_k)$  とするとこれは  $K\text{-alg}$  準同型で全射であり、 $\ker(\psi) = (a_{k+1}, \dots, a_n) = \mathfrak{b}$  であるから準同型定理より  $A/\mathfrak{b} \cong \mathfrak{a}$  となるので示された。  $\square$

**命題 8.14.** etale  $K\text{-alg } A$  は部分  $K\text{-alg}$  及びイデアルを有限個しか持たない。

*Proof.* etale より  ${}^3L/K$  により  $L \otimes_K A \cong L^n$  であるので命題 (8.11)(8.12) より  $L \otimes_K A$  の部分代数とイデアルは有限個。よって  $A \subset L \otimes_K A$  の部分代数とイデアルも有限個。  $\square$

**Rem 8.15.**  $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$  は  $A$  の素イデアルの集合  $\text{Spec}(A)$  の " $L$ -有理点" の集合である。

**例 8.16.**  $A := K[X, Y]/(f)$  で  $f(X, Y) = X^3 + 1 - Y^2$  とする。このとき  $\phi \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$  を取

り、 $x = X \pmod{f}, y = Y \pmod{f}, \phi(x) = a, \phi(y) = b$  とする。すると  $A$  で  $f(X, Y) = 0_A$  から  $\phi(f) = f(a, b) = 0$  よりこの  $a, b$  が  $f$  の  $L$  上の有理点になる。 $\phi$  は準同型より  $x, y$  の送り先  $a, b$  のみで  $\phi(g(X, Y) + f(\in A)) = g(a, b)$  と定まるので  $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L) \cong \{(a, b) \in L^2 | f(a, b) = 0\}$  という同型が定まる。

### 8.3 分離次数

$A$  : 有限次  $K\text{-alg}$  で  $\forall L/K$  に対して  $h_A(L) := |\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)|$  とおく。このとき系 (8.3) より  $h(L) \leq n = [A : K]$  が成り立っている。

**補題 8.17.**  $\Omega/K$  : 拡大、 $\Omega$  : 代数閉体とすると  $\forall L/K$  に対し  $h(L) \leq h(\Omega)$

*Proof.*  $L' : K$  の相対的代数閉包とすると  $\forall \phi \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L)$  において  $A$  の  $K$  上の基底を  $(e_1, \dots, e_n)$  とする。このとき  $\forall x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \in A$  と書いて  $\phi(x) = a_1 \phi(e_1) + \dots + a_n \phi(e_n)$  となる。 $\{\phi(e_1), \dots, \phi(e_n)\}$  の部分集合が  $\phi(A)$  の基底になるので  $[\phi(A) : K] \leq [A : K] = n$  より  $\phi(A)/K$  は有限次拡大より代数拡大である。よって  $\phi(A) \subset L'$  だから  $\phi \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L')$  なので  $h(L) = h(L')$  になる。定理 (??) より  $L'$  は代数閉体と見た  $\Omega$  に埋め込めるので終域が小さくなるから  $\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L) = \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, L') \subset \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega)$  より  $h(L) \leq h(\Omega)$  である。□

**定義 8.18.**  $[A : K]_s := \max_{L/K} h_A(L) = h_A(\Omega)$  ( $\Omega : K$  の代数閉包, 補題 (8.17) から言える。)

を  $A$  の  $K$  上の分離次数 (separable degree) という。系 (8.3) から  $[A : K]_s \leq [A : K]$  が言える。

**定義 8.19.**  $\cdot K\text{-alg}$   $A$  が分離的とは  $[A : K]_s = [A : K]$  となること。

- ・とくに有限次拡大  $L/K$  が分離的とは  $K\text{-alg}$  として  $L$  が分離的であること。
- ・代数拡大  $L/K$  が分離的とは  $\forall$  有限次部分体 (中間体) が分離的であること。

**命題 8.20.**  $A, B$  : 有限次  $K\text{-alg}$ 、 $L/K$  : 拡大、 $A_{(L)} = L \otimes_K A$  とする。

- (1)  $[A \otimes_K B : K]_s = [A : K]_s [B : K]_s$
- (2)  $[A_{(L)} : L]_s = [A : K]_s$
- (3)  $C$  : 有限次  $L\text{-alg}$  で  $L/K$  が有限次のとき  $[C : K]_s = [C : L]_s [L : K]_s$

*Proof.* (1)

$\Omega$  を  $K$  の代数閉包とする。定義より  $[A \otimes_K B : K]_s = h_{A \otimes_K B}(\Omega), [A : K]_s = h_A(\Omega), [B : K]_s = h_B(\Omega)$  である。そして

$$\begin{aligned} * : \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega) \times \text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, \Omega) &\longrightarrow \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A \otimes_K B, \Omega) \\ (v, u) &\longmapsto v * u \\ v * u : A \otimes_K B &\longrightarrow \Omega \\ a \otimes b &\longmapsto v(a)u(b) \end{aligned}$$

と定める。まず、 $v' * u' = v * u$  のとき  $\forall a \otimes b \in A \otimes_K B, v'(a)u'(b) = v(a)u(b)$  で  $\Omega$  の元だから  $a \otimes b \neq 0$  で逆元が存在するから  $v'(a) = v(a), u'(b) = u(b)$  より  $(v', u') = (v, u)$  なので単射。

$u_1 : A \longrightarrow A \otimes_K B, a \longmapsto u_1(a) = a \otimes 1$  と  $u_2 : B \longrightarrow A \otimes_K B, b \longmapsto u_2(b) = 1 \otimes b$  とすると  $\forall a \otimes b \in A \otimes_K B = u_1(a)u_2(b)$  となる。任意の  $w \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A \otimes_K B, \Omega)$  に対し、 $v_i = w \circ u_i$  とす

ると準同型より  $w(a \otimes b) = w(u_1(a)u_2(b)) = w \circ u_1(a)w \circ u_2(b) = v_1(a)v_2(b)$  となる。よって  $w$  に対して  $v_1 \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega), v_2 \in \text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, \Omega)$  をとれば  $w = v_1 * v_2$  となるので全射。したがって  $*$  は全単射だから  $h_{A \otimes_K B}(\Omega) = h_A(\Omega)h_B(\Omega)$  より成立。

(2)

$\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega)$  と  $\text{Hom}_{L\text{-alg}}(L \otimes_K A, \Omega)$  の間は系 (8.9) の  $\pi$  を用いれば  $L$  を  $\Omega$  として見てもよく、これは全単射であるから  $[L \otimes_K A : L]_s = [A : K]_s$  が成り立つ。

(3)

$S = \text{Hom}_{K\text{-alg}}(L, \Omega), T = \text{Hom}_{K\text{-alg}}(C, \Omega)$  とする。 $\sigma \in S$  に対して  $T_\sigma = \{f \in T \mid \forall \alpha \in L, f(\alpha) = \sigma(\alpha)\}$  とするとこれは以下で示されるように  $T$  を分割する。 $\sigma, \tau \in S$  に対して  $f \in T_\sigma \cap T_\tau$  としたとき  $\forall \alpha \in L, f(\alpha) = \sigma(\alpha) = \tau(\alpha)$  より  $\sigma = \tau$  から  $T_\sigma = T_\tau$  となる。また、 $\forall g \in T$  に対して  $\sigma := g|_L$  とすれば  $\sigma(\alpha) = g(\alpha)$  だから  $g \in T_\sigma$  であるので確かに  $T$  を分割する。

$\sigma$  は体の準同型より単射だから  $\Omega$  の中に  $\sigma(L)$  として  $L$  を埋め込めるからその2つを同一視することで  $K$  の代数閉包  $\Omega$  を  $L$  の代数閉包と見ることもできる。このとき  $\forall f \in T_\sigma$  は定義より  $\forall \alpha \in L, f(\alpha) = \sigma(\alpha) \in \sigma(L) \cong L$  で  $\sigma(L) \cong L$  上恒等写像になる。したがって  $f \in \text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega)$  より  $T_\sigma \subset \text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega)$  である。また、この  $\sigma(L)$  と  $L$  の同一視から  $\alpha \in L$  は  $\Omega$  の中で  $\alpha = \sigma(\alpha) \in \sigma(L)$  であるので  $\phi \in \text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega)$  に対して  $\phi(\alpha) = \alpha = \sigma(\alpha)$  より  $\phi \in T_\sigma$  だから  $\text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega) \subset T_\sigma$  である。これより  $T_\sigma = \text{Hom}_{L\text{-alg}}(C, \Omega)$  から  $|T_\sigma| = [C : L]_s$  となるので分割であることも考えれば  $|T| = [C : K]_s = \sum_{\sigma \in S} |T_\sigma| = |S||T_\sigma| = [C : L]_s[L : K]_s$  より示された。□

**Note 8.21.** 分離次数ではなく拡大次数でも (1) ~ (3) と同様のことが成り立つ。

**命題 8.22.**  $A$  : 有限次  $K\text{-alg}$  について

$$A \text{ が } K \text{ 上分離的} \Leftrightarrow A \text{ は } K \text{ 上 etale}$$

*Proof.* 系 (8.9) と命題 (8.10) から

$$\begin{aligned} A \text{ が } K \text{ 上分離的} &\Leftrightarrow [A : K]_s = [A : K] \\ &\Leftrightarrow |\text{Hom}_{K\text{-alg}}(A, \Omega)| = [A : K] \\ &\Leftrightarrow A \text{ はある } K \text{ の代数閉包 } \Omega \text{ で対角化される。} \\ &\Leftrightarrow A \text{ は } K \text{ 上 etale} \end{aligned}$$

□

**系 8.23.** 次の3つが成り立つ

- (1)  $A \otimes_K B$  が etale/ $K \Leftrightarrow A$  と  $B$  がともに etale
- (2)  $A/K : \text{etale} \Leftrightarrow A_{(L)}/L : \text{etale}$
- (3)  $C/L/K$  のとき  $C$  が  $K$  上 etale  $\Leftrightarrow C$  が  $L$  上 etale かつ  $L$  が  $K$  上 etale

*Proof.* 代数が分離的であるときその分離次数は拡大次数と等しいという定義とその拡大次数を常に超えないということから命題 (8.20)(8.22) と拡大次数について命題 (8.20) が成り立つことより示される。□

## 8.4 微分加群

**定義 8.24.**  $A/K$  の微分加群  $\Omega_{A/K}$  とは  $I := \ker(A \otimes_K A \longrightarrow A, a \otimes b \longmapsto ab)$  としたとき  $\Omega_{A/K} := I/I^2$  と定義される。定義より  $\Omega_{A/K} \subset B := A \otimes_K A/I^2$  は明らか。ここで  $A \otimes_K A$  を  $a \longmapsto a \otimes 1$  と見ることで  $A$  加群と考える。そして  $d: A \longrightarrow \Omega_{A/K}, a \longmapsto d(a) := 1 \otimes a - a \otimes 1 \pmod{I^2}$  とする。