

Метод на допирателните (Нютон)

Дадено е уравнението:

$x^2 - 33\sin(x + \frac{\pi}{p+1}) - (p + 2q) = 0$, където **p** и **q** са съответно предпоследната и последната цифра от факултетния ни номер.

$$x^2 - 33\sin(x + \frac{\pi}{2}) - 19 = 0$$

1. Да се намери общия брой на корените на уравнението.
2. Да се локализира най-малкия реален корен в интервал $[a, b]$.
3. Да се проверят условията за приложение на метода на допирателните (Нютон).
4. Да се определи началното приближение за итерационния процес по метода на допирателните (Нютон).
5. Да се изчисли корена по метода на допирателните с точност 0,0000000001. Представете таблица с изчисленията.
6. Да се провери колко итерации биха били необходими, ако се използва метода на разполовяването в същия интервал $[a, b]$ за същата точност.
7. Да се направи сравнение кой метод е по-ефективен за избрания интервал.


```
In[12]:= f[x_] := x^2 - 33 Sin[x +  $\frac{\pi}{2}$ ] - 19
```

```
In[13]:= f[x]
```

```
Out[13]=  
-19 + x^2 - 33 Cos[x]
```


1. Да се намери общия брой на корените на уравнението.

```
In[14]:= Plot[f[x], {x, -10, 10}]
```



```
In[15]:= Plot[f[x], {x, 6, 8}]
```

```
Out[15]=
```




Брой корени: 6

2. Да се локализира най-малкия реален корен в интервал $[a, b]$.


```
In[16]:= Plot[f[x], {x, -7, -6}]
```

```
Out[16]=
```




```
In[17]:= Plot[{f[x], f'[x], f''[x]}, {x, -7, -6}, PlotLegends -> "Expressions"]
```

```
Out[17]=
```



```
In[18]:= Plot[{f[x], f'[x], f''[x]}, {x, -6.9, -6.7}, PlotLegends → "Expressions"]
```

```
Out[18]=
```



```
In[19]:= f[-6.9]
```

```
Out[19]=
```

```
1.69107
```

```
In[20]:= f[-6.7]
```

```
Out[20]=
```

```
-4.28464
```

Извод:

1. $f(-6.9) = 1.691... > 0$
2. $f(-6.7) = -4.284... < 0$


Следователно в двата края на функцията има различни знаци и функцията е непрекъсната в избрания интервал $[-6.9; -6.7]$. Следва, че функцията има поне един корен в дадения интервал.

3. Проверка на условията за сходимост

Проверка на първата производна

```
In[21]:= Plot[f'[x], {x, -6.9, -6.7}]
```

```
Out[21]=
```




Извод: (1) Стойностите на първата производна в разглеждания интервал $[-6.9; -6.7]$ са между -33 и -27. Следователно първата $f'(x) < 0$ в целия разглеждан интервал $[-6.9; -6.7]$.

Проверка на втората производна

In[23]:= `Plot[f''[x], {x, -6.9, -6.7}]`

Out[23]=



Извод: (2) Стойностите на първата производна в разглеждания интервал $[-6.9; -6.7]$ са между 28 и 33. Следователно втората $f''(x) > 0$ в целия разглеждан интервал $[-6.9; -6.7]$.

Извод: от (1) и (2) следва, че $f'(x)$ и $f''(x)$ са с постоянни знаци в разглеждания интервал $[-6.9; -6.7]$ => Методът на допирателните е сходящ.

4. Избор на начално приближение

$f'' > 0$ за текущата задача. Следователно избираме x_0 , така че $f(x_0) \cdot f'' > 0$.


$$\Rightarrow f(x_0) > 0$$

$$\Rightarrow x_0 = -6.9$$

Пресмятане на постоянните величини:

In[24]:= `Plot[Abs[f''[x]], {x, -6.9, -6.7}]`

Out[24]=



От геометрични съображения максимума се достига в десния край на интервала, а минимума - в левия.


In[25]:= **M2 = Abs[f' '[-6.9]]**

Out[25]=

28.9189

In[26]:= **Plot[Abs[f' [x]], {x, -6.9, -6.7}]**

Out[26]=



От геометрични съображения максимума се достига в левия край на интервала, а минимума - в десния.

In[27]:= **m1 = Abs[f' [-6.7]]**

Out[27]=

26.76

In[28]:= **p = $\frac{M2}{2 m1}$**

Out[28]=

0.540338

5. Да се изчисли корена по метода на допирателните с точност 0, 0 000 000 001

```
In[38]:= f[x_] := x^2 - 33 Sin[x +  $\frac{\pi}{2}$ ] - 19
x0 = -6.9;
M2 = Abs[f''[-6.9]];
m1 = Abs[f'[-6.7]];
p =  $\frac{M2}{2 m1}$ ;
epszad = 0.0000000001;
eps = 1;
Print["n = ", 0, " xn = ", x0, " f(x) = ", f[x0], " f'(x) = ", f'[x0]];
For[n = 1, eps > epszad, n++,
  x1 = x0 -  $\frac{f[x0]}{f'[x0]}$ ;
  Print["n = ", n, " xn = ", x1, " f(xn) = ",
    f[x1] " f'(xn) = ", f'[x1], " εn = ", eps = p * (x1 - x0)^2];
  x0 = x1
]
n = 0 xn = -6.9 f(x) = 1.69107 f'(x) = -32.8885
n = 1 xn = -6.84858 f(xn) = 0.0386531 f'(xn) = -31.3769 εn = 0.00142857
n = 2 xn = -6.84735 f(xn) = 0.0000226662 f'(xn) = -31.3401 εn = 8.2 × 10-7
n = 3 xn = -6.84735 f(xn) = 7.81597 × 10-12 f'(xn) = -31.3401 εn = 2.82631 × 10-13
```

6. Да се провери колко итерации биха били необходими, ако се използва метода на разполовяването в същия интервал [a, b] за същата точност

```
In[47]:= Log2[ $\frac{-6.7 + 6.9}{0.0000000001}$ ] - 1
Out[47]=
29.8974
```

6. Да се направи сравнение кой метод е по-ефективен за избрания интервал

Извод: По метода на допирателните (Нютон) биха били необходими 4 итерации за достигане на исканата точност. А по метода на разполовяването са необходими 30

итерации. Следователно методът на допирателните е по-ефективен за избрания интервал $[-6.9, -6.7]$.