



İç Hastalıklarına Giriş

Doç. Dr. Miraç VURAL KESKİNLER
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Hasta size geldiğinde

Yaş

Cinsiyet

Eşlik eden hastalıkları

Kullandığı ilaçlar

Size başvuru şikayeti

Özgeçmiş

Soy geçmiş



GENEL DEĞERLENDİRME

Cilt

Yüz

Baş

Boyun

Kalp ve Akciğer

Abdomen

Kas iskelet sistemi

Nörolojik sistem

İlk bakışta gözünüze çarpabilecek bazı bulguları bilmek lazım...

Solukluk

Anemi



Sarılık

Hepatit, kanserler



Ödem

KY, Böbrek yet



Ekzoftalmus

Hipertiroidi



Ekzoftalmus (proptosis): Göz küresinin ileri doğru yer değiştirmesi

Miksödem

Hipotiroidi



Siyanoz

KOAH, Konj kalp hast



Ağız Muayenesi

Mukoza

Dudaklar

Diş ve diş etleri

Dil, damak, orafarenks



Dudaklar

- ❖ Soluk renk; Ağır anemi
- ❖ Mor renk; Siyanoz
- ❖ Parlak kırmızı; Polistemia
- ❖ Kiraz kırmızı; CO zehirlenmelerinde

Angular stomatit

- ❖ Riboflavin eks (B2)
- ❖ Demir eksikliği
- ❖ Diyabet
- ❖ AIDS
- ❖ Uygun olmayan diş protezi

Dil Muayenesi

Boyutu, hareketleri, rengi, yüzeyi, altı dikkatle incelenmelidir

Ön: Filiform

Orta; Konikal

Arka; Sirkumvallat papilla



Makroglossi;


- ❖ Ödem
- ❖ Maligniteler
- ❖ Amiloid birikimi



Glossit: Papilla kaybı, yüzey parlak, dil hassas

- ❖ B vitamini eksikliği
 - ❖ Demir eksikliği anemisi ve çölyak hastalığı
- Coğrafik dil; filiform papillalar kaybolup tekrar çıkar

Oral kandidiyazis



- ❖ Diyabet
- ❖ AIDS gibi imm n s presif durumlar

El ve tırnaklar

Hipertiroidide eller sıcak ve nemlidir

Tremor: Parmakların gergin olarak açılıp, eller öne doğru uzatılırsa ince titreme görülmesi

Anemide avuç içleri soluktur

Tırnakta çukurlaşma (Pitting): Psöriazis



Onikolizis (Tırnağın ayrılması): Tırnak plağının tırnak yatağından ayrılması (psöriazis, hipertiroidi, mikotik enfeksiyonlar)

Splinter hemoraji: Tırnak altında kapiller kanama (Subakut bakteriyel endokardit, AFLAS, vaskülitler)





Kaşık tırnak; dış yüzeyin çukurlaşması
Ciddi demir eksikliği anemisi



Lunula


ÇOMAK PARMAK

Çomak parmak;


- ❖ Akciğer kanseri (özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanseri)
- ❖ Bol balgamla giden bronşektazi
- ❖ Kistik fibrozis
- ❖ İdiopatik pulmoner fibrozis
- ❖ Akciğer apsesi
- ❖ Arteriovenöz malformasyon
- ❖ Sağ-sol şantlı siyanozlu kalp hastalıkları
- ❖ Kolitis ülseroza, Crohn hastalığı gibi inflamatuvar barsak hastalıkları
- ❖ Primer bilier sirozda görülmektedir

Schamroth Belirtisi

Normal



Çomak Parmak ve Tırnak




Kardiyovasküler Muayene

Nabız Alınan Arterler

Arteryal Nabız

- ❖ Temporal
- ❖ Karotis
- ❖ Radial
- ❖ Brakiyal
- ❖ Femoral
- ❖ Popliteal



Laboratuvar tahlili deęerlendirme


A microscopic view of numerous red blood cells (erythrocytes) against a dark red background. The cells are biconcave discs, appearing as lighter red, semi-transparent structures. They are scattered across the frame, with some in sharp focus and others blurred, creating a sense of depth. The overall composition is dense and textured.



The development of erythrocyte




The development of platelet




Granulocytes (granular leukocytes)

Agranulocytes (not granular leukocytes)


The development of eosinophils




The development of basophils



The development of neutrophils



The development of lymphocytes



The development of monocytes



Hemogram

Hemogram, kanda bulunan kırmızı kan hücresi, nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit, monosit ve trombosit gibi hücrelerin sayılarak, çeşitli hastalıkların tespitinde kullanılan kan testidir

Hemogram		Tarihi : 20.11.2016 11:56		Örnek Türü: Tam Kan	
Test Adı	Sonuç	Birim	Referans Değer		
WBC	8.11	$10^3/uL$	4.8-10.8		
NE%	51.6	%	43.0-65.0		
LY%	39.7	%	5.5-20.5		
MO%	4.2	%	5.5-11.7		
EO%	3.9	%	0.0-2.0		
BA%	0.6	%	0.2-1.0		
NE#	4.18	$10^3/uL$	2.2-4.8		
LY#	3.22	$10^3/uL$	1.3-2.0		
MO#	0.34	$10^3/uL$	0.3-0.8		
EO#	0.32	$10^3/uL$	0.0-0.2		
BA#	0.05	$10^3/uL$	0.0-0.1		
RBC	6.22	$10^6/uL$	4.70-6.00		
HGB	14.7	g/dL	14.0-18.0		
HCT	43.4	%	38.0-42.0		
MCV	81.0	fL	80.0-97.0		
MCH	23.6	pg	27.0-31.0		
MCHC	29.2	g/dL	32.0-36.0		
RDW_CV	13.1	%	11.5-15.5		
RDW_SD	38.8	fL	37.0-54.0		
PLT	332	$10^3/uL$	130-400		
MPV	9.6	fL	7.4-10.4		
PCT	0.32	%	0.000-0.990		
PDW	11.7	fL	0.00-99.9		
PLCR	23.1	%	13.0-43.0		

WBC (White Blood Count): Lökosit ismiyle de bilinen beyaz kan hücreleri veya immünositler olarak da adlandırılan bağışıklık hücreleri,

vücudun korunmasında görev alan bağışıklık sisteminin Nötrofil, bağışıklık sisteminin ilk savunma fazını oluşturan granülosit

sınıfına giren beyaz kan hücreleridir.

Vücuttaki bazofil, eozinofil gibi diğer beyaz kan hücreleri ile birlikte

vücudumuza giren bakteri ve diğer zararlı

lenfositler kemik iliğinden

üretildiği inflamasyondan korumaktadır

lenfositlerin temel görevi, vücuda giren virüs, bakteri, mantar ve parazitler

gibi patojenlerden kaçınarak fazla kan kaybını önlemekle görevli,

trombosit olarak bilinen renksiz, en küçük kan hücrelerinin kandaki sayısını

Hemoglobin



Hemoglobin (HBG) seviyeleri desilitrede gram (g/dL) cinsinden ifade edilir.

Kandaki düşük hemoglobin seviyesi, doğrudan düşük bir oksijen seviyesi ile ilgilidir.

Hemoglobin, kansızlık ya da demir eksikliği problemlerinde ilk bakılan parametredir.

Normali kaçtır?

Hgb:

- Yetişkin erkekler: 13,5 – 17,5 gr/dl
- Yetişkin kadınlar: 12,5 – 15,5 gr/dl


WBC: 4.000-10.000

PLT: 150.000- 450.000

INR (Normali:1)

- INR kanın pıhtılaşma süresini ifade etmek için kullanılan bir ölçüm birimidir.
- PT (protrombin zamanı) tahlili ile aynı işlevi görür.
- INR tahlil değerinin farkı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya çapında standart bir değer olarak belirlenmiş olmasıdır.
- Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin düzenli olarak INR kan tahlili yaptırması gerekir.
- Kan tahlili yaptırarak, pıhtılaşma problemi olup olmadığı ortaya çıkar

INR yüksekliğinde diş çekimi, invaziv işlemler dikkatli yapılmalı ya da ertelenmelidir)



Biyokimya tahlili nasıl deęerlendirilir?

BUN (Blood Urea Nitrogen) :

Kan üre azotunun ölçülmesi için BUN testi ya da farklı bir deyişle kan üre azotu testi yapılır.

Kanda var olan ürenin azot kısmının miktarının ölçüldüğü test sayesinde böbrek fonksiyonları değerlendirilir

Kreatinin: Böbrek fonksiyonlarının göstergelerinden biridir.

Normal kreatinin değerleri ortalama olarak 0,6-1,3 mg/Dl'dir. Bu değer 1,3 üzerinde ise böbrek yetmezliği düşünülür.

Ama bazı durumlarda ağır spor yapan sporcularda kas metabolizmasının hızlı olması nedeniyle kreatinin değerinin yükseldiği gözlenmiştir.

Alanin Aminotransferaz (ALT) ve Aspartat Aminotransferaz (AST)

ALT testi karaciğerdeki hasarı incelemek ve karaciğer hastalıklarını teşhis etmek adına kullanılır.

AST testi ise siroz, hepatit ve karaciğer hasarı gibi sorunların teşhisinde kullanılır

C-reaktif protein (CRP), iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir.

Hormonlar

Vitaminler

Lipidler

Elektrolitler