

Endodontik Tedavide Ne Zaman Antibiyotik Kullanılır?

Endodontide antibiyotik kullanımı çok sınırlı durumlarda endikedir.

Çünkü çoğu endodontik enfeksiyon lokalizedir ve kanal içi dezenfeksiyon + drenaj ile kontrol altına alınabilir.

🔑 Antibiyotik Endikasyonları (gerçekten gerekli durumlar):

Sistemik bulgu varlığı:

- Ateş ($>38^{\circ}\text{C}$)
- Lenfadenopati
- Halsizlik, yaygın rahatsızlık hali
- Taşikardi

Yaygın veya hızlı ilerleyen enfeksiyon:

- Selülit
- Fasyal boşluk enfeksiyonları (özellikle submandibular, sublingual, pterigomandibular boşluklar)
- Diffüz şişlik, yumuşak dokuya yayılan ödem

Bağıışıklık sistemi baskılanmış hastalar:

- Kemoterapi görenler
- Organ nakli geçirmiş hastalar
- Kontrolsüz diyabetik hastalar

⚠ Antibiyotiğin Endikasyonu Olmayan Durumlar:

- Sadece pulpitis (irreversible pulpitis, reversible pulpitis)
- Lokalize apikal apsede drenaj sağlanabiliyorsa
- Periapikal lezyon ama sistemik bulgu yoksa

💊 Kullanılan antibiyotikler:

Amoksisilin 1000 mg, 12 saatte 1 (genellikle profilaksidede tercih) marka ismi Largopen

Genel durumlar veya dirençli vakada geniş spektrum gerekiyorsa: Amoksisilin + Klavulanik asit (ilk tercih), marka ismi Augmentin, Amoklavin, Klomaks

Penisilin allerjisinde: ilk tercih Azitromisin (piyasa adı Azitro)

Alternatif: Klindamisin (Klindan), metronidazol (Flagyl)...

📌 Özetle:

Antibiyotik tek başına tedavi değildir. Kanal tedavisinin temelini mekanik-temizleme + irrigasyon + uygun restorasyon oluşturur. Antibiyotik sadece sistemik yayılım veya bağışıklık yetersizliği varsa destekleyicidir.