

Endodontide Antibiyotik Profilaksisi

Aseptik çalışıldığında ve genişletme işlemleri kanal içinde sınırlı kaldığında endodontik tedavi bakteriyemiye neden olmamaktadır. Bununla beraber kanallar foramen apikalenin dışına çıkarak prepare edildiğinde %25-30 bakteriyemi olasılığı bulunamaktadır. Kana geçen mikroorganizma sayısı foramen apikalenin genişliğine, kök kanalındaki enfeksiyonun düzeyine ve kök kanal tedavisi yöntemine bağlıdır. Bu nedenle riskli hastalarda endodontik tedavi antibiyotik profilaksisi önerilir.

Endodontik tedavi öncesi antibiyotik profilaksisi, yalnızca belirli hasta gruplarında uygulanır ve amaç, özellikle bakteriyemi riskinin sistemik komplikasyonlara yol açabileceği durumlarda koruyucu önlem almaktır. Güncel kılavuzlara (özellikle Amerikan Kalp Derneği “AHA” ve Amerikan Endodontistler Birliği “AAE”) göre bu uygulama rutin değildir, sadece belirli yüksek riskli durumlarda gereklidir.

1. Yüksek Riskli Kardiyak Durumlar (AHA 2021’e göre)

Bu hastalarda dental işlemler sırasında bakteriyemi, infektif endokardit (IE) riskini artırabilir. Profilaksi önerilir:

- Yapay kalp kapağı (prostatik kalp kapağı veya kalp kapağı onarımında kullanılan yapay materyal). Kalça, diz gibi büyük protez taşıyan hastalarda genellikle profilaksi gerekli değildir.
- Geçmişte geçirilmiş infektif endokardit.
- Konjenital kalp hastalıkları:
 - Tedavi edilmemiş siyanotik doğumsal kalp hastalığı.
 - Protetik olarak onarılmış konjenital kalp defekti işleminden sonra (ilk 6 ay içinde).
 - Kalıcı rezidüel defekt olan düzeltmeler.
- Kalp nakli sonrası gelişen kapak hastalığı.

🔴 Önerilen antibiyotik: Amoksisilin 2 g, işlemten 30–60 dk önce (erişkinler için).

2. Bağışıklığı Baskılanmış Hastalar

Aşağıdaki gibi bazı immünsüprese hastalarda tıp doktoru ile konsülte edilerek antibiyotik profilaksisi uygulanabilir.

⚠ Bu hastalarda karar interdisipliner olmalı (diş hekimi + ilgili uzman).

- Romatoid artrit (RA), sistemik lupus eritematozus (SLE)
- Organ transplantasyonu
- İmmünsüpresif ilaç kullanımı (steroid, kemoterapi)
- Diyabetik hastalarda kötü glisemik kontrol
- Kemoterapi alanlar
- Ağır nötropeni (<500 hücre/mm³)

- İleri AIDS (CD4 <200)
- Organ nakli sonrası erken dönem
- Uzun süreli steroid kullanımı

Bu hastalarda bakteriyemi daha kolay sistemik enfeksiyona neden olabilir. Ancak her zaman değil, hastaya göre değerlendirme gerekir.

Profilaksi

◆ Profilaksi Gerekmeyen Durumlar

- Mitral kapak prolapsusu (üfürüm olsun ya da olmasın)
- Kalp damar stentleri
- Pacemaker (kalp pili)
- Kalp bypass cerrahisi geçmişi
- Eklem protezleri (rutin şartlarda)
- Dişeti kanaması olmayan küçük işlemler (radyografi, süt dişi çekimi, anestezi enjeksiyonu vb.)

◆ Hangi Diş İşlemlerinde Profilaksi Gerekir?

- Yalnızca kanama potansiyeli olan işlemler:
- Endodontik tedavi (özellikle vital olmayan dişler, apeks açık lezyonlar, intrakanal irrigasyon vb.)
- Diş çekimi
- Cerrahi işlemler (apikal rezeksiyon, flap operasyonları)
- Diş taşı temizliği, küretaj
- Periodontal cerrahi

◆ Profilaksi Protokolü (Yetişkin)

Durum	Antibiyotik	Doz
Standart	Amoksisilin	2 g , 30-60 dk önce
Penisilin alerjisi varsa 1. seçenek	Azitromisin / Klaritromisin	500 mg
Penisilin alerjisi varsa 2. seçenek	Klindamisin	600 mg

✓ Sonuç

Endodontik tedavi öncesi antibiyotik profilaksisi yalnızca aşağıdaki gibi durumlarda yapılır:

Yüksek riskli kalp hastalığı (özellikle endokardit riski olanlar)

Bazı immünsüpresyon durumları

Sistemik yayılım riski taşıyan enfeksiyon varlığı

🧠 Gereksiz profilaksi, antibiyotik direncini artırır. Bu yüzden her zaman bireysel karar ve tıbbi danışma ile yapılmalıdır. li durumlarda gereklidir.

Koroner Hastalıklar

Koroner arter hastalıkları genelde endodontik tedaviye kontrendikasyon oluşturmaz. Fakat bu hastalıklara sahip bireylerde bazı önlemler alınabilir. Koroner hastalık öyküsü olan bireylerde antikoagülan tedavisi devam edebilmektedir. Cerrahi olmayan tedaviler; vital pulpa ekstirpasyonu da dahil olmak üzere antikoagülan kesilmesi gerekmez. Eğer cerrahi girişim gerekli hale gelirse hastanın doktoruna danışarak gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Kumadin kullanan hastalarda cerrahi işleme izin veren INR değeri 3.5 ve altıdır.