

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	

ILAÇLAR	TUTARI
Reçete, hekimin imza ve kaşesini taşıyan, hekime hukuki bir sorumluluk yükleyen resmi bir belgedir. Günümüzde e-imzanın yaygınlaşması ile elle reçete yazma devri kapanmak üzeredir. Fakat, yine de her hekim elle reçete yazmayı bilmelidir. E-imza ile yazılan reçetelerin doğrudan sisteme düşmesi ve hastanın telefonuna kod şeklinde gelmesi büyük bir avantajdır. Dr. Nuri Can AYDIN	

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
ILAÇLAR	TUTARI
Reçetede hekime ait ad-soyad, diploma numarası, uzmanlık alanı gibi bilgiler yer almalıdır. Hastaya ait ad-soyad, TC kimlik bilgileri yazılmalıdır. İsterirse tanrı da eklenebilir. Tarih atılması unutulmamalıdır. En son hekim tarafından kaşe ve imza atılarak paraflanmalıdır. dt Nuri Can AYDIN	

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Abuzer Hastapil	Tarih :	07/09/2025
Hastanın Kurumu :	İstanbul xxx üniversite hast.	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)	uzm. dt. xxx xxxx
Fabihin Kurumu :	Tanı : Akut Apikal Apse		
ILAÇLAR		TUTARI	
Örnek bir reçete ve reçetede ki simgeler <u>Rp</u> I. Augmentin 1000 mg tb D: I B (bir) S: 2x1 II. Apranax forte 550 mg D: I B (bir) S: 3x1 D ve S? ?		dt. Nuri Can AYDIN Hekim Ad-Soyad Kaşe imza	

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
ILAÇLAR	TUTARI
dt. Nuri Can AYDIN "R", "R_x", "R_p" simgelerinin özel bir işlevi yoktur, ancak geleneksel olarak hala kullanılmaktadır. ★ Latince "a" anlamına gelen "Recipe" der (ingilizce receive) gelmektedir. Reçetenin sol üst köşesine <u>Rp</u> yazılabilir. "D" simgesi Fransızca Donne, ingilizce Dispense türkçe "ver" anlamına gelir. "S" simgesi ingilizce "sign" den gelir. önerilen ilacın kullanım tarifidir.	

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Abuzer Hastapil	Tarih :	07/09/2025
Hastanın Kurumu :		Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)	Uzm. Dr. xxx xxx
Tabibin Kurumu :			
ILAÇLAR		TUTARI	
"Örneğin" <u>RP</u> I. Gentamisin göz damlası %0,3 5ml D: 1 B (bir) S: 6 x 2 Anlamı şudur: I. Gentamisin göz damlası %0,3 5ml Bir kutu ver Günde 6 kere 2 damla kullan Paraf sonradan kötü niyetle reçeteye başka bir şey eklenmesi içindir.		Dr. Nuri Can AYDIN Herim Ad Soyad Kaşe imza	

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Abuzer Hostagil	Tarih :	07/09/2025
Hastanın Kurumu :		Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)	Uzm. Dt.
Tabibin Kurumu :			XXXX XXX XXXXX

ILAÇLAR

TUTARI

Penisilin alerjisi olmayan yetişkin hastada;

Akut Apikal Apse

dt. Nuri Can
AYDIN

Rp

I. Augmentin 1000 mg tb
D: 1 B (bir)
S: 2x1

II. Apranax Fort 550 mg
D: 1 B (bir)
S: 2x1

!

Dental apselerde
özellikle orta şiddet
ağrı-iltihapta etkili
steroidsiz ağrı kesici:

Dicloflam 50mg
D: 1 B ★
S: 2x1

Augmentin amoksisilin ve klavulanik asittir.
Piyasadaki muadilleri; Amoklavın, klamoks, croxilex...

Apranax Fort naproksen sodyumdur.

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaç grubuna aittir (NSAİD)

Yerine arveles 25 mg yazılabilir; iğeriği
deksketoprofen trometamol'dür. NSAİD grubundadır.

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	

ILAÇLAR	TUTARI
Perisilin alerjisi olmayan çocuk hasta; 40 kg altında hap yutamayan çocuk; Akut Apikal Apse <u>Rp</u> I. Augmentin 400/57 oral Süsp. D: 1 B (bir) S: 2x1 II. Calpol Şurup D: 1 B (bir) S: 2x1 Augmentin 400/57 genellikle çocuklar için kullanılır. 12 yaş veya 40 kg sonrasında kullanılmaz! Calpol şurup, parasetamol etken maddeli, çocuklarda ateş ve ağrıyı hafifletmek için kullanılan bir ilaçtır.	dt. Nuri Can AYDIN

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
İLAÇLAR	TUTARI
Perisilin alerjisi olan yetişkin hastada Antibiyotik : Azitro 500 mg tb → ilk gün 500 mg D: 1 B (bir) S: 1x1 veya Macrol 500 mg tb D: 1 B (bir) S: 2x1 veya Klacid 500 mg tb D: 1 B (bir) S: 2x1 ilk gün 500 mg yüklenme doz, takip eden 4 gün 250 mg (tableti bölerek) Dr. Nuri Can AYDIN	

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
İLAÇLAR	TUTARI
Çocuklarda penisilin alerjisi varsa; 20 kg altında I. Macrol 125mg oral Sosp. D: 1 B S: 2x1 20 kg üstü I. Macrol 250mg oral sōsp. D: 1 B S: 2x1 dt. Nuri Can AYDIN	

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
ILAÇLAR	TUTARI
Klindamisin, güncel antibiyotik yönergelerinde ölümcül pseudomembranöz enterokolit (şiddetli ishal) yapma olasılığı nedeniyle ilk sıradan çıkarıldı. Eskiden penisilin alerjisiyle ilk sıraydı. Şuan azitromisin öneriliyor. Ancak azitromisin etkisiz kalırsa, güçlü etkileri olan klindamisin hastaya gerekli bilgilendirme ve takip ile verilebilir. I. Klindan 150 mg D: 1 B (bir) S: 4x1	dt. Nuri Can AYDIN

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
İLAÇLAR	TUTARI
Mide rahatsızlığı olduğunu Söyleyen hastalarda yazılan ilaçlara ek olarak; Lansor 15 mg tb D: 1 B (bir) S: 1 x 1 Lansor midedeki parietal hücrelerde bulunan proton pompaların bloke ederek mide asidi üretimini azaltır.	dt. Nuri Can AYDIN ★

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	

ILAÇLAR	TUTARI
---------	--------

Karaciğer veya Böbrek Yetmezliği
olan hastalar;

Rp

I. Augmentin 1000 mg tb

D: 1 B

S: 2x1

II. Parol 500 mg

D: 1 B

S: 2x1

St. Nuri Can
AYDIN

Amoksisilin karaciğerde
metabolize olur

BÖBREK

YETMEZLİĞİ

böbrek yetmezliğinde
arveles veya apranax kullanılmAZ

Rp

I. Sef 1000 mg

D: 1 B (bir)

S: 2x1

II. Parol 500 mg

D: 1 B (bir)

S: 2x1

Sefalosporinler
böbrekten metabolize olur

KARACİĞE

YETMEZLİĞİ

Parol böbreğe ve karaciğere
daha az zararlı ama yine de
kontrollü kullanılmalı

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	

ILAÇLAR

TUTARI

Hipo Kazası ! ! !

Dr. Nuri Can
AYDINRp

I. Augmentin 1000 mg tb
D: 1B (bir)
S: 2x1

II. Arveles 25mg tb
D: 1B
S: 2x1

III. Rupafin 10mg tb
D: 1B
S: 1x1

Antihistaminik
alerji önleyici★ hipo kazalarında işlem
esnasında sırasıyla;

- 1- Anestezi takviyesi
- 2- Serum fizyolojik ile yıkama
- 3- Dekort 0.5 ml kök ucuna
- 4- Dipropsan 0.5 ml kök ucuna
- 5- Yanak ve diş arasına buz uygulanmak

ilk 3 gün ödem
olmasını önlergüçlü antiinflamatuar
güçlü antialerjik

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
İLAÇLAR	TUTARI
Fasiyal paraliz oluşan hasta <u>Rp</u> I. Prednol 16 mg tb D: 1 B S: 2x2 (ilk 3 gün 2x2) son 2 gün 2x1 II. Arveles 25 mg tb D: 1 B S: 3x1 III. Panto 40 mg tb D: 1 B S: 2x1 IV. Bepanthol eye drop 10 ml D: 1 B S: 3x1	Kortikosteroiddir burun akıntısı, hapşırma, kaşınma, tıkanıklık gibi belirtileri hafifletir. Dr. Nuri Can AYDIN kortikosteroidin yarattığı mide hassasiyetini önlmek için kullanılır normalde reflü ilacıdır. göz kuruluğu için

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
İLAÇLAR	TUTARI
Sinüs perforasyonu olunan hastada <u>Rp</u> I. Augmentin 1000 mg tb D: 1 B (bir) S: 2x1 II. Arveles 25 mg tb D: 1 B (bir) S: 3x1 III. Andorex / Kloroben gargara D: 1 B (bir) S: 3x1 IV. Kongest tb D: 1 B (bir) S: 2x1 V. İliadin Sprey D: 1 B (bir) S: 3x1 Sadece ilk 3 gün H. Nuri Can AYDIN ağızdaki bakteri yükünü azaltır baş ağrısı, burun tıkanıklığı hapşırma ve burun akıntısı belirtilerini azaltır Saman nezlesi, diğer alerjik rinitler ve rinosinüzitlere bağlı sekresyonun drenajına yardımcı olur.	

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
İLAÇLAR	TUTARI
Fungal (Mantar) lezyonlarda; <u>Rp</u> Fungostatin 100.000 IU 50ml Süspansiyon D: 1 B S: 4x1 Aft ve ağız içi yaralarında; Aftojel 5g D: 1 B S: 2x1 veya 3x1 HSV tip 1'de; Zovirax krem  Asiklovir D: 1 B S: 5x1	dt. Nuri Can Aydın Asiklovir Antiviral

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih ;
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
İLAÇLAR	TUTARI
Sinir Zedelenmesi vakalarında (hastada uyuzukluk / karıncalanma yaşamamışse) Rp // I. Berexol tb D: 1 B (bit) S: 1x1 dt. Nuri Can AYDIN Berexol B12; 250mg B1, 250mg B6 ve 1mg B12 vitamini içerir. Sinir Zedelenmelerinde iyileşme hızını arttırır.	

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	

İLAÇLAR	TUTARI
Kas spazmı ve eklemlerde ağrısı olan yetişkin hastada <u>Rp</u> I. Buscopan plus 10mg tb D: 1 B (bir) S: 2x1 veya I. Tyloflex 4mg D: 1 B (bir) S: 2x1 II. Melox 7.5mg tb	Dr. Nuri Can AYDIN Spazm giderici ve ağrı kesici alternatif: Muscoflex 4mg kas gevşetici eklem ağrısı için alternatif tilcotil 20mg

Hastanın Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No. :	Tarih :
Hastanın Kurumu :	Dr. Dip. No. Adı, Soyadı (Kaşesi)
Tabibin Kurumu :	
İLAÇLAR	TUTARI
Bebek diş çıkarma ; dt. Nuri Can AYDIN Rp I. Calgel jel D:1B S:5x1 veya I. Dentinox jel D:1B S:5x1 yumuşak dişlik veya tülbert ile kullanılır. Topikal analjezik ve Solüsyonlardır Ateş eşlik ediyorsa ek olarak II. Calpol 120 mg oral süsp. D:1B S:2x1	