
Daten und angepasste Kurven
Sommer
Winter
Frequenz des Resistenz−Allels R
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−5
0
5
Position (km): links Land, rechts Stadt mit Insektizid


Modell (schwarz): s = 0.1, m = 0.1, m/s = 1
Abstand zum Sommer: 0.035 zum Winter: 0.213 (kleiner = passt besser)
Sommer
Winter
Frequenz des Resistenz−Allels R
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−5
0
5
Position (km): links Land, rechts Stadt mit Insektizid


Modell (schwarz): s = 0.1, m = 0.1, m/s = 1
Abstand zum Sommer: 0.035 zum Winter: 0.213 (kleiner = passt besser)
Sommer
Winter
Frequenz des Resistenz−Allels R
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−5
0
5
Position (km): links Land, rechts Stadt mit Insektizid


Modell (schwarz): s = 0.1, m = 0.1, m/s = 1
Abstand zum Sommer: 0.035 zum Winter: 0.213 (kleiner = passt besser)
Sommer
Winter
Frequenz des Resistenz−Allels R
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−5
0
5
Position (km): links Land, rechts Stadt mit Insektizid


Modell (schwarz): s = 0.1, m = 0.1, m/s = 1
Abstand zum Sommer: 0.035 zum Winter: 0.213 (kleiner = passt besser)
Sommer
Winter
Frequenz des Resistenz−Allels R
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−5
0
5
Position (km): links Land, rechts Stadt mit Insektizid


Modell (schwarz): s = 0.1, m = 0.05, m/s = 0.5
Abstand zum Sommer: 0.059 zum Winter: 0.308 (kleiner = passt besser)
Sommer
Winter
Frequenz des Resistenz−Allels R
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−5
0
5
Position (km): links Land, rechts Stadt mit Insektizid