

# 指数对数・数列

2023.05.29

# 指数対数（復習＋）

# 指数関数 $y = a^x$

- $a$  は正の定数
- 任意の実数  $x$  について  $a^x$  が定まる.

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$


- 指数法則

$$(1) \quad a^p a^q = a^{p+q}$$

$$(2) \quad (a^p)^q = a^{pq}$$

$$(3) \quad (ab)^p = a^p b^p$$

- $y = a^x$  のグラフ



# 対数関数

## 対数の定義

- $y = \log_a x$

$a$  を **底**,  $x$  を **真数**

$y$  を  $a$  を底とする  $x$  の **対数** という.

- 対数  $y$  は,  $a$  を何乗したら  $x$  になるかという数

$$a^{\boxed{y}} = x \text{ となる } \boxed{y} \text{ のこと}$$

例)  $y = \log_3 9$

$$3^{\boxed{y}} = 9 \text{ となる } y \text{ のこと}$$

$$3^2 = 9 \text{ だから } y = \log_3 9 = 2$$

## 対数の値と対数法則

- $y = \log_a x \iff a^y = x$

(例)  $y = \log_2 16 \iff 2^y = 16 = 2^4$   
 $y = 4$  となるから  $\log_2 16 = 4$

- 対数法則

(1)  $\log_a b + \log_a c = \log_a (bc)$

(2)  $\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}$

(3)  $\log_a b^p = p \log_a b$

## 対数の計算

(1)  $\log_{10} 5 + \log_{10} 2$

$$\text{与式} = \log_{10}(5 \times 2) = \log_{10} 10 = 1$$

(2)  $\log_2 12 - \log_2 3$

$$\text{与式} = \log_2\left(\frac{12}{3}\right) = \log_2 4 = 2$$

(3)  $2 \log_3 4 + \log_3 4 - \log_3 8$

$$\begin{aligned} \text{与式} &= \log_3 4^2 + \log_3 4 - \log_3 8 \\ &= \log_3 \frac{16 \times 4}{8} = \log_3 8 \end{aligned}$$

## 底・真数・対数の条件

- $y = \log_a x \iff a^y = x$
- $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
- 底  $a$  の条件は  $a > 0, a \neq 1$
- 真数  $x$  の条件は  $x > 0$
- 対数  $y = \log_a x$  の値の範囲は 実数全部



## 対数関数のグラフ

- $y = \log_a x \iff a^y = x \ (x = a^y)$
- $x$  と  $y$  を入れ替えれば  $y = a^x$  のグラフになる.
- これを**逆関数**という.
- アプリ「**指数と対数**」を動かしてみよう

課題 0529-1  $y = \log_a x$  と  $y = a^x$  について ( ) を埋めよ.

[1] グラフは直線  $y = x$  に関して ( )

[2]  $y = \log_a x$  は  $y = a^x$  の ( )

# 底の変換公式

底を  $a$  から別の  $c$  に変える公式

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad \log_2 3 = \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2}$$

例)  $\log_3 8$  を底が 2 の対数に変える

$$\log_3 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 3} = \frac{\log_2 2^3}{\log_2 3} = \frac{3 \log_2 2}{\log_2 3} = \frac{3}{\log_2 3}$$

課題 0529-2 底を変換して計算せよ

Text P193 問 1

[1]  $\log_4 32$

[2]  $\log_9 3$

[3]  $\log_3 2 \log_2 27$

[4]  $\log_a b \times \log_b a$

## 常用対数

- 底が 10 の対数  $\log_{10} x$
- 数値計算ではよく用いられる (対数表, 関数電卓)
- $\log_{10} 2 = 0.3010$ ,  $\log_{10} 3 = 0.4771$  (近似値)

例  $\log_{10} 6 = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 0.3010 + 0.4771$   
 $= 0.7781$

課題 0529-3 次の値を求めよ

[1]  $\log_{10} 4$       [2]  $\log_{10} 8$       [3]  $\log_{10} \frac{1}{2}$       [4]  $\log_{10} 5$

## 常用対数と桁数

- 100000 の桁数は 6 桁
- $100000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5$  より
$$\log_{10} 100000 = \log_{10} 10^5 = 5 \log_{10} 10 = 5$$

- 常用対数と桁数 桁数 = 常用対数の整数部分 + 1

例)  $2^{100}$  の桁数

$$\log_{10} 2^{100} = 100 \log_{10} 2 = 100 \times 0.3010 = 30.10$$

よって 31 桁

課題 0529-4  $3^{30}$  の桁数を求めよ

Text P196 問 2

## 自然対数

- もう1つ、数学では大切な自然対数がある。

- ネイピアの定数  $e$  を底とする対数

$$e = 2.718281828$$

- 自然対数と常用対数の変換

$$\log_e 10 = \frac{\log_{10} 10}{\log_{10} e} = \frac{1}{\log_{10} e}$$

- 詳しくは、微分のときに説明する

# 数列

# 数列とは

- 数の列

$$a_1, a_2, \dots \quad \text{KeTMath} \quad a_n$$

- ここでは規則的に並んだ数列とする

$$1, 3, 5, 7, \boxed{9}, \boxed{11}, \dots$$

- 最初の項を**初項**という

- 最後の項（**末項**）があるとき，項の数を**項数**という

## 数列の一般項

- $n$  を正の整数とするとき、第  $n$  項を表す式を一般項

例 1) 2, 3, 4, ...

一般項 (第  $n$  項) は  $n + 1$

例 2) 2, 4, 8, ...

一般項 (第  $n$  項) は  $2^n$

課題 0529-5 次を求めよ

TextP200 問 1, 問 2

[1] 一般項が  $a_n = 2^n$  のとき,  $a_1$  から  $a_5$  までの値

[2] 数列  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$  の一般項  $a_n$



## 交互に符号が変わる数列の一般項

- $-1, 1, -1, 1, \dots$  の一般項は  $\boxed{(-1)^n}$
- $1, -1, 1, -1, \dots$  の一般項は  $\boxed{(-1)^{n-1}}$
- $1, -2, 3, -4, \dots$  の一般項は  $\boxed{(-1)^{n-1}n}$
- $2, 0, 2, 0, \dots$  の一般項は  $\boxed{(-1)^{n-1} + 1}$

課題 0529-6 次の数列の一般項はどうなるか．

[1]  $1, 0, 1, 0, \dots$     [2]  $0, 1, 0, 1, \dots$

# 等差数列

- 差（公差）が等しい数列

例)  $1, \underbrace{3}_{+2}, \underbrace{5}_{+2}, \underbrace{7}_{+2}, \dots$

- 初項を  $a$ ，公差を  $d$  とおくと

$$a, a + d, a + 2d, \dots, \text{第 } n \text{ 項は?}$$

- 第  $n$  項 (一般項) は  $a_n = a + (n - 1)d$

(例) 等差数列  $1, 3, 5, 7, \dots$  の一般項は

$$a_n = 1 + 2 \boxed{(n - 1)} = 2n - 1$$

# 等比数列

- 比（**公比**）が等しい数列

例)  $2, 6, 18, 54, \dots$

$\underbrace{\quad}_{\times 3} \quad \underbrace{\quad}_{\times 3} \quad \underbrace{\quad}_{\times 3}$

- 初項を  $a$ ，公比を  $r$  とおくと

$$a, ar, ar^2, \dots, \text{第 } n \text{ 項 } a_n = \boxed{a r^{n-1}}$$

例) 等比数列  $2, 6, 18, 54, \dots$  の一般項は

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} = \text{6}^{n-1} \text{ としない}$$

## 課題 (等差数列と等比数列)

課題 0529-7 次を求めよ

Text P201,203

[1] 初項 2, 公差 3 の等差数列  $\{a_n\}$  の一般項  $a_n$

[2]  $a_{10}$

[3] 初項 2, 公比  $-3$  の等比数列  $\{b_n\}$  の一般項  $b_n$

[4]  $b_5$

## 等差数列の和

初項  $a$ ，公差  $d$ ，項数が 4 の場合で説明する

$$S = a + (a + d) + (a + 2d) + (a + 3d)$$

$$S = (a + 3d) + (a + 2d) + (a + d) + a$$

2つの式を加えると

$$2S = (2a + 3d) \times 4$$

したがって 
$$S = \frac{4(2a + 3d)}{2}$$

## 等差数列の和の公式

初項  $a$ ，公差  $d$ ，項数  $n$  の等差数列の和  $S$  は

$$S = \frac{n(2a + (n - 1)d)}{2}$$

$$2a + (n - 1)d = a + (a + (n - 1)d) = \text{初項} + \text{末項}$$

$$S = \frac{\text{項数} \times (\text{初項} + \text{末項})}{2}$$

## 等差数列の和の例題

例題)  $S = 1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + 99$  を求めよ

解) 項数  $n$  を求める.

初項 1, 公差 2 より, 第  $n$  項  $a_n$  は

$$a_n = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$$

$$a_n = 2n - 1 = 99 \text{ より } n = \frac{99 + 1}{2} = 50$$

$$\text{したがって } S = \frac{50(1 + 99)}{2} = 2500$$

課題 0529-8  $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 100$  について

[1] 項数を求めよ      [2] 和  $S$  を求めよ