

CT :

- 4 Décembre 2025
- Master I ISIFAR
- Durée : 1 heure 30
- **Probabilités**

- Aide-mémoire : une feuille A4 recto verso autorisée
- Aucun autre document autorisé
- Aucun moyen de communication électronique autorisé

Exercice 1.

Dans cet exercice, $p \in]0, 1[$, $q \in]0, 1[$.

Dans cet exercice, X suit une loi géométrique de paramètre p ($P\{X > n\} = (1-p)^n$ pour $n \geq 0$), soit $X \sim \text{Geom}(p)$.

- i. Si $Z_1, Z_2, \dots, Z_\ell \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Geom}(q)$ et $S = \sum_{i=1}^{\ell} X_i$, calculer $P\{S = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
- ii. Calculer la fonction génératrice de la loi de S définie à la question précédente.
- iii. Calculer l'espérance et la variance de la loi de S définie à la question précédente.
Maintenant, conditionnellement à $\{X = \ell\}$, $Y \sim \sum_{i=1}^{\ell} Z_i$ avec $Z_1, Z_2, \dots, Z_\ell \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Geom}(q)$
- iv. Calculer la fonction génératrice de la loi de Y .
- v. Calculer l'espérance et la variance de la loi de Y .
- vi. Calculer $P\{X = \ell, Y = k\}$ pour $\ell, k \in \mathbb{N}$
- vii. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 2.

Pour $p, q > 0$, on note $G_{p,q}(s) = \frac{p}{1-qs}$ définie sur $[0, 1/q]$.

- i. Pour quels couples de valeurs de (p, q) , $G_{p,q}$ est-elle la fonction génératrice d'une loi de probabilité P sur $\mathbb{N}$?
Dans la suite, on suppose que (p, q) est choisi de façon à ce que $G_{p,q}$ soit la fonction génératrice d'une loi de probabilité sur $\mathbb{N}$.
- ii. Calculer $P\{k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$ (en fonction de p et q).
- iii. On suppose $X \sim P$, calculer $\mathbb{E}X$ et $\text{Var}(X)$ (en fonction de p et q).
On suppose maintenant que P est la distribution de reproduction d'un processus de branchement (Galton-Watson).
- iv. À quelle condition sur (p, q) , le processus de branchement est-il sous-critique ?
- v. Si le processus de branchement est sur-critique, calculer la probabilité d'extinction.
- vi. Calculer l'espérance de la taille de la génération n .
- vii. Si le processus de branchement est sous-critique, calculer l'espérance de la taille de la descendance totale.

Exercice 3.

Dans cet exercice, $Y_1, \dots, Y_n, \dots$ sont i.i.d. selon $\mathcal{N}(0, 1)$, X_0 est gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$, indépendante de $Y_1, \dots, Y_n, \dots$

On définit $X_1, \dots, X_n, \dots$ par la récurrence aléatoire :

$$X_{i+1} = \theta X_i + \eta Y_{i+1}$$

(avec $\theta \in \mathbb{R}, \eta \in]0, \infty)$)

On note $\mathcal{F}_i = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_i)$ (sous-tribu engendrée par $X_0, X_1, \dots, X_i$).

- i. Exprimer X_n comme une fonction de $(X_0, Y_1, \dots, Y_n)^\top$. Cette fonction est-elle mesurable ? $(X_0, X_1, \dots, X_n)^\top$ est-il un vecteur gaussien ?
- ii. Calculer $\mathbb{E}[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i]$.
- iii. Calculer $\text{Var}[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i]$.
- iv. Calculer $\mathbb{E}X_i, \text{Var}(X_i)$.
- v. Peut-on choisir μ, τ, η, θ , pour que les X_i soient identiquement distribués ?
- vi. À quelle condition sur θ , les X_i convergent-elles en distribution ? Préciser la limite si possible.
- vii. Si la suite $(X_i)_i$ converge en distribution, la suite converge-elle aussi presque sûrement ?
- viii. Si la suite $(X_i)_i$ converge en distribution, la suite converge-elle aussi dans L^2 , dans L^1 , dans L^p ($p \geq 1$) ?
- ix. Si θ satisfait la condition de la question précédente, calculer $\text{cov}(X_i, X_{i+k})$, pour $i, k \in \mathbb{N}$.