

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

Prácticas:

Caos cuántico en el modelo de Bose-Hubbard

Saúl Estuardo Nájera Allara

Carné: 202107506

Septiembre de 2025

Licenciatura en Física Aplicada

Asesorado por: *M.Sc. José Alfredo de León (IF-UNAM),
Ing. Rodolfo Samayoa (ECFM-USAC)*

1 Descripción general de la institución

1.1 Instituto de investigación de Ciencias Físicas y Matemáticas, USAC

El Instituto de investigación de Ciencias Físicas y Matemáticas (ICFM) es la unidad de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas (ECFM) que promueve y realiza estudios avanzados en áreas científicas, fundamentales y aplicadas, de las ciencias físicas y matemáticas. El ICFM se proyecta como una plataforma regional de excelencia dedicada a la investigación y difusión del conocimiento en física y matemática. Las principales líneas de trabajo del ICFM son:

- La investigación académica en ciencia básica y aplicada.
- La promoción de la investigación en ciencia básica y aplicada en el ámbito universitario.
- La difusión y divulgación del conocimiento generado por la investigación en ciencias físicas y matemáticas.
- La actualización continua de programas académicos de ciencias físicas y matemáticas.

2 Descripción general del proyecto

JA: Ahora que las correcciones fueron menores, me sirve más que revisar sobre la versión antigua, porque así como está ahora tengo que estar viendo en la versión antigua para ver cuáles fueron las correcciones

El estudio estadístico del espectro de sistemas cuánticos es una herramienta de valiosa utilidad para el ámbito teórico, experimental y aplicado. Se han distinguido dos tipos de propiedades: globales y locales. Respecto a las propiedades locales, se han estudiado fluctuaciones del espectro de energía, es decir, se han observado desviaciones de las distribuciones de niveles de energía respecto de un comportamiento promedio [1].

En un contexto de física clásica S: Listo. JA: física clásica**, creo que es más preciso, el caos presenta dos características de importancia. La primera es una sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales y la segunda es el "mixing", cualquier distribución inicial de condiciones iniciales se dispersa hasta volverse indistinguible de la distribución de equilibrio. S: Listo. JA: me gusta ya la información. Ahora sólo quiero que corrijas redacción de acuerdo a lo siguiente: el enunciado está largo y es difícil de leer. Partilo, quizás en dos, primero diciendo que el caos clásico requiere de dos cosas, punto, luego hablás de cada condición en enunciados separados, o algo así. El objetivo es que sea más fácil de leer. En un contexto de física cuántica S: Listo. JA: física cuántica**, en vista del principio de incertidumbre, no es posible tener trayectorias definidas en el espacio de fase. Una de las formas para estudiar el caos cuántico es mediante la estadística espectral, es decir, estudiando el espectro de energía del Hamiltoniano asociado al sistema.

JA: parto acá el párrafo en dos, porque me parece muy largo y denso dejar uno sólo y creí que hay más o menos dos ideas que se podían separar fácil aquí Las fluctuaciones espectrales de sistemas cuánticos complejos es analizada mediante el marco teórico de la Teoría de Matrices Aleatorias (RMT) en varias áreas de la física, tales como la física de materia condensada, física nuclear y física atómica. Las fluctuaciones contienen señales distintivas para la identificación de diferentes fases observadas en sistemas físicos, por ejemplo para identificar límites entre integrabilidad o caoticidad en un sistema con análogo clásico, determinación de fases de metalicidad o insulación, fases localizadas o termalizadas de sistemas de muchos cuerpos, estudio de regímenes en espectros nucleares, entre otros [2] El presente consenso es que las fluctuaciones espectrales de sistemas cuánticos complejos presentan una repulsión entre sus niveles de energía que están en concordancia con alguno de los ensambles de matrices aleatorias, en los que se resaltan los ensambles GOE (Gaussian Orthogonal Ensemble), GUE (Gaussian Unitary Ensemble) y GSU (Gaussian Symplectic Ensemble). El primero en usar la idea de RMTs fue Wigner, en los años 50, con el motivo de estudiar el espectro de núcleos atómicos pesados [3]. Una de las observaciones que resaltan de su discusión es la observación de que los niveles de energía presentan una tendencia a repelerse unos a otros, ello motivo en parte a el uso de RMT para la descripción del hamiltoniano de este tipo de sistemas. S: Listo. JA: del Hamiltoniano de este tipo de sistemas.

Para hamiltonianos cuánticos cuya contraparte clásica es integrable, la conjetura Berry-Tabor establece que la

estadística de los niveles de energía sigue una estadística de Poisson [4], mientras que para hamiltonianos cuya contraparte clásica sea caótica, la conjetura BGS (Bogigas, Giamoni, Schmit) establece que la estadística de los niveles de energía es descrita por alguno de los ensambles de RMT [5]. Es de mencionar que la universalidad de RMT para la descripción de los niveles de energía de sistemas físicos es válida cuando la densidad media de los niveles de energía es igual a la unidad [5].

Este trabajo consistirá en hacer un estudio espectral del hamiltoniano del modelo de Bose Hubbard con el objetivo de diagnosticar la región de parámetros en donde el sistema exhibe una estadística espectral que coincide con la propuesta por el ensamble Gaussiano Ortogonal (GOE). El modelo de Bose Hubbard es escogido por ser una buena primera aproximación a distintos sistemas físicos de interés presentes en la física de materia condensada y física atómica, notablemente, se han hecho realizaciones experimentales con átomos ultrafríos sobre un red óptica y se ha podido observar la transición SF-MI (Superfluididad-Aislante de Mott [S: Considero que esa es una buena traducción. JA: mejor en español](#)) [6]. El modelo se puede emplear tanto para fermiones como para bosones. En este trabajo se modelará para bosones, y el hamiltoniano presentado describe dicha situación. El Hamiltoniano de este modelo es:

$$\hat{H} = -\frac{J}{2} \sum_{\langle i,j \rangle} (\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j + \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i) + \frac{U}{2} \sum_i \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \quad (1)$$

[S: Listo. JA: Ojo con que \$J\$ y \$U\$ en el texto deben estar dentro de \\$\\$, revisá y ponelos donde haga falta!](#) Los términos $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j$ son los operadores creación y aniquilación respectivamente y \hat{n}_i es el operador número (cuenta el número de partículas en el sitio). El parámetro J es proporcional a la parte cinética del hamiltoniano y describe físicamente como los bosones "saltan" de un sitio a otro, el segundo parámetro es proporcional a la parte de interacción del hamiltoniano, describe la interacción partícula a partícula y la fuerza de interacción siendo caracterizada por U [6]. En este trabajo, mediante una variación de la cantidad J/U , se buscará determinar las regiones de interés.

Para el diagnostico de las regiones de caos cuántico, se utilizarán las siguientes cantidades:

- Mean level spacing ratio, $\langle r \rangle$:

Denotando por E_n las energía ordenadas del espectro del hamiltoniano, y el espaciamiento consecutivo de niveles de energía como $s_n = E_{n+1} - E_n$, se define la cantidad:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \quad (2)$$

Esta cantidad cumple con la propiedad de que la densidad media de los niveles de energía es igual a la unidad y por tanto es válido asumir la universalidad de RMT para el análisis. Se calculará para cada configuración de J/U todos los r_n , para posteriormente determinar el valor medio $\langle r \rangle$. Se espera que este valor medio sea un indicador de caos, ya que para el ensamble GOE, dicho valor es de $\langle r \rangle_{GOE} = 0.5307$ [5]. Así mismo, si el sistema está en un régimen integrable, se espera un valor medio de $\langle r \rangle_{Poisson} = 0.38629$ [5].

Es importante tener presente la forma analítica de la distribución de los cocientes entre los espaciamientos de niveles del ensamble GOE, el cual es de la forma [5]:

$$P_{GOE}(r) = \frac{27}{8} \frac{r + r^2}{(1 + r + r^2)^{5/2}}. \quad (3)$$

Y para la distribución de espaciamiento de niveles de energía para un espectro integrable (Poisson) es de la forma [2]:

$$P_{Poisson}(r) = \frac{1}{(1 + r)^2} \quad (4)$$

- Divergencia de Kullback-Leibler (KL): Es una medida de diferencia entre dos distribuciones de probabilidad. En este caso, se comparará la distribución de probabilidad de los r_n de la ecuación (2) respecto

a la distribución de probabilidad de la misma cantidad según el ensamble GOE. Viene dada por [7]:

$$KL(P, P_{GOE}) = \int_0^1 P(x) \ln \left(\frac{P(x)}{P_{GOE}(x)} \right) dx. \quad (5)$$

En esencia, es una medida de que tanto se aleja la distribución del sistema respecto a la distribución de GOE.

Tanto $\langle r \rangle$ como la divergencia KL son indicadores que permiten establecer una conexión entre las fluctuaciones espectrales de un sistema físico con la universalidad predicha por RMT, y por tanto permiten establecer una conexión con la definición de caos cuántico adoptada en este trabajo.

S: Sección trasladada a donde está $\langle r \rangle$ JA: Esto integralo en el bullet point de la $\langle r \rangle$

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Estudiar la estadística espectral del Hamiltoniano de Bose-Hubbard para identificar la región de parámetros sobre la cual el sistema exhibe caos cuántico.

3.2 Objetivos específicos

NEW ver.

- Estudiar el modelo de Bose-Hubbard e investigar su importancia en la física contemporánea.
- Programar el hamiltoniano de Bose-Hubbard con condiciones de frontera abiertas, sus sectores de simetría bajo el operador reflexión y las herramientas estadísticas, en particular el mean level spacing ratio $\langle r \rangle$ y la divergencia (KL).
- Estudiar acerca de los indicadores de caos propuestos y acerca de la distribuciones de espaciamientos de valores propios de los ensambles de matrices aleatorias, en particular, el ensamble GOE.
- Analizar distintas configuraciones del sistema variando J/U con los indicadores de caos propuestos y con ello identificar las regiones de integrabilidad y caos del sistema.

OLD ver.

- Estudiar el formalismo para el tratamiento de un Hamiltoniano bajo ciertas simetrías. JA: Yo prefiero que cambiés este objetivo por “Estudiar el modelo de Bose-Hubbard e investigar su importancia en la física contemporánea.”. La razón es que si dejás este objetivo, te estás comprometiendo a poner eso en tu informe final, y qué hueva (creo yo y no es parte fundamental del objetivo general, eso fue más preliminares técnicos que necesitaste para entender las simetrías del Bose-Hubbard)
- Programar el hamiltoniano de Bose-Hubbard con condiciones de frontera abiertas, sus sectores de simetría bajo el operador reflexión y las herramientas estadísticas JA: especificá que la r promedio y la KL divergence necesarias para el estudio.
- Estudiar acerca de los correlacionadores JA: indicadores de caos propuestos y acerca de la distribuciones de espaciamientos de valores propios de los ensambles de matrices aleatorias, en particular, el ensamble GOE.
- Analizar distintas configuraciones del sistema variando J/U JA: \$\$ con las herramientas estadísticas JA: los indicadores de caos propuestos y con ello identificar las regiones de integrabilidad y caos del sistema.

4 Justificación del Proyecto

NEW ver. El estudio de caos cuántico ha sido investigado desde hace ya más de 40 años, sin embargo debido a la innovación tecnológica y el aumento en nuestra capacidad computacional, se ha sido capaz de tener un

estudio más robusto del tema en los últimos años, notablemente ha habido un reavivamiento del estudio del caos cuántico en sistemas de muchos cuerpos que no tienen contraparte clásica. Este trabajo es un ejemplo de ello, ya que se estará trabajando con un sistema que no tiene análogo clásico y es un buen punto de partida para estudiar el caos cuántico desde el punto de vista de RMT. Este trabajo cumple con que esta primera investigación es un primer paso para una investigación más grande, que busca estudiar el caos cuántico y el efecto de mezclar la estadística de distintos sectores de simetría. Esta investigación más grande buscará arrojar más luz acerca de la descripción de sistemas cuánticos y su conexión con la teoría de RMT.

OLD ver. El estudio de caos cuántico ha sido investigado desde hace ya más de 40 años, sin embargo debido a la innovación tecnológica y el aumento en nuestra capacidad computacional, se ha sido capaz de tener un estudio más robusto del tema **JA: en los últimos años y también menciona que ha habido un reavivamiento del caos cuántico en sistemas de muchos cuerpos, sin contraparte clásica.** Este trabajo es un ejemplo de ello, ya que se estará trabajando con matrices cuyas dimensiones son del orden de 10^3 en adelante [6], pudiendo tener la capacidad de diagonalizar dichas matrices y extraer la información relevante del sistema **JA: me parece que este es tu enunciado clave en el que querés decir la relevancia del trabajo. En ese sentido, no está bueno porque la relevancia no es trabajar con HAmiltonianos grandes, sino investigar y entender el caos cuántico, desde el punto de vista de RMT, de un sistema cuántico sin análogo clásico. Cambiá ese enunciado acorde a esto que dije.** Este trabajo cumple con dos objetivos, el primero es verificar que la teoría de RMT satisface en la descripción de la estadística espectral en las regiones de caos cuántico y **JA: todo antes de aquí lo podés quitar (porque ya está en los objetivos) y dedicarte sólo a hablar de que es el principio de otra cosa más grande** el segundo objetivo es que esta primera investigación es un primer paso para una investigación más grande, que busca estudiar el caos cuántico y el efecto de mezclar la estadística de distintos sectores de simetría. Esta investigación más grande buscará arrojar más luz acerca de la descripción de sistemas cuánticos y su conexión con la teoría de RMT.

5 Cronograma

(Pendiente)

Referencias

- [1] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, “Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws,” *Physical Review Letters*, vol. 52, p. 1–4, Jan. 1984.
- [2] S. H. Tekur and M. S. Santhanam, “Symmetry deduction from spectral fluctuations in complex quantum systems,” *Physical Review Research*, vol. 2, Sept. 2020.
- [3] E. P. Wigner, “Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions,” *Annals of Mathematics*, vol. 62, no. 3, pp. 548–564, 1955.
- [4] M. V. Berry and M. Tabor, “Level clustering in the regular spectrum,” *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*, vol. 356, no. 1686, pp. 375–394, 1977.
- [5] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, “Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles,” *Physical Review Letters*, vol. 110, Feb. 2013.
- [6] J. M. Zhang and R. X. Dong, “Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example,” *European Journal of Physics*, vol. 31, pp. 591–602, Apr. 2010.
- [7] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, “Optimal route to quantum chaos in the bose-hubbard model,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 55, p. 324002, July 2022.