Informe de Práctica final:

Caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard.

Saúl Nájera Allara

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
Escuela de ciencias físicas y matemáticas, ECFM

1 Introducción:

El caos cuántico juega un papel central en la investigación de sistemas complejos de muchas partículas, por ejemplo para el estudio de los espaciamiento de niveles energía en los núcleos de átomos pesados [1]. Por un lado el trabajo pionero de Berry y Tarbor establece que para hamiltonianos cuánticos cuya contraparte clásica es integrable, la estadística de los niveles de energía sigue una ley de Poisson [2], por otro lado, el trabajo de Bohigas, Giannoni y Schmit establece que para sistemas cuánticos cuya contraparte clásica es caótica, la estadística de los niveles de energía sigue la estadística de alguno de los ensambles característicos de la teoría de matrices aleatorias [3]. Los tres ensambles clásicos son: Gaussiano ortogonal (GOE), Gaussiano unitario (GUE), Gaussiano simpléctico (GSE), cada uno de ellos satisfacen ciertas simetías particulares [4]. Entonces, en un contexto cuántico, la potencial emergencia de caos para cierta región de parámetros de un hamiltoniano es determinada comparando la estadística de su espectro de valores propios respecto a alguno de los ensambles de RMT, además la existencia de una región caótica es validada con su persistencia a medida que el número de partículas incrementa [5].

Este trabajo investiga un hamiltoniano de un sistema cerrado con la importante simetría ante inversión temporal, se identifica en que regiones existe caos cuántico basándose en dos indicadores estadísticos importantes en la literatura y se analiza como esta región de caos es afectada a medida que la dimensionalidad del espacio de Hilbert del sistema aumenta.

2 Marco Teórico:

2.1 El modelo de Bose Hubbard

Este trabajo considera el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas. Este modelo describe la dinámica de N bosones sin spin en una latice de L sitios dispuestos sobre un arreglo unidimensional. El hamiltoniano del sistema con $\hbar = 1$, viene dado por [6]:

$$\hat{H} = -\frac{J}{2}\sum_{\langle i,j\rangle}\left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j + \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i\right) + \frac{U}{2}\sum_i \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{1}$$

Los términos $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j$ son los operadores creación y aniquilación respectivamente y $\hat{n}_i$ es el operador número (cuenta el número de particulas en el sitio). El primer término proporcional a J es la parte cinética del hamiltoniano y describe el tunelaje de las partículas entre sitios adyacentes [6]. El segundo término proporcional a U describe la interacción entre las partículas en un mismo sitio, la intensidad de la misma viene regulada por U [6]. Este hamiltoniano tiene dos simetrías importantes, la simetría respecto a inversión temporal y la simetría respecto al operador reflexión [6]. El operador reflexión introduce dos sectores de simetría, llamados el sector simétrico (par) y el sector antisimétrico (impar). Dichos subespacios satisfacen que, si H es el espacio de Hilbert generado por la base de eigenestados y H^+, H^- los subespacios simétricos y antisimétricos respectivamente [5], entonces:

$$H = H^+ \oplus H^- \tag{2}$$

2.2 Mean spacing Ratio

Los ensambles de matrices aleatorias poseen signaturas características de corto y largo alcance; mediante indicadores estadísticos es posible examinar estas propiedades espectrales. Una de las formas de caracterizar el caos cuántico es mediantes las signaturas de corto alcance en el espectro de energías del hamiltoniano [5]. Históricamente se ha empleado el indicador estadístico del espaciamiento de niveles a primer vecino [3][2]. Sin embargo en la práctica, la distribución de espaciamientos de niveles debe de ser computada despues de remover las características espectrales que dependen del sistema (un proceso llamado *unfolding*) con el objeto de estudiar únicamente las propiedades estadísticas universales relativas al espectro [7]. Estas dificultades pueden ser eludidas considerando la cantidad propuesta originalmente por Oganesyan y Huse [8], la cual no depende de la densidad local de estados y a consecuencia no requiere unfolding [7].

Denotando por E_n las energía ordenadas del espectro del hamiltoniano y el espaciamiento consecutivo de niveles de energía como $s_n = E_{n+1} - E_n$, se define la cantidad [8]:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \tag{3}$$

Estudiando la distribución de probabilidad asociada a las r's, es posible determinar si la configuración está en una configuración integrable o caótico y es de tener presente la forma análitica de la distribución de probabilidad de r del ensabamble GOE y de Poisson. La distribución asociada a GOE es de la forma [9]:

$$P_{\mathrm{GOE}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{27}{8} \frac{r + r^2}{(1 + r + r^2)^{5/2}} \right), \tag{4}$$

donde $\Theta(r)$ es la función de Heaviside. Y la distribución asociada a Poisson es de la forma [9]:

$$P_{\mathrm{Poisson}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{1}{(1+r)^2} \right) \tag{5}$$

Con estas expresiones es posible extraer un $\langle r \rangle$ característico de cada distribución. En particular, para el ensamble GOE, dicho valor es de $\langle r \rangle_{\mathrm{GOE}} = 0.5307$ [9] y para la distribución de Poisson un valor de $\langle r \rangle_{\mathrm{Poisson}} = 0.38629$ [9].

2.3 Divergencia de Kullback-Leibler

Conocida también como entropía relativa, es una medida que cuantifica cuánto se aleja una distribución de probabilidad P de una distribución de referencia Q [10]. Para este trabajo, la distribución de referencia es la del ensabamble GOE. La expresión viene dada por:

$$KL(P, P_{GOE}) = \int_0^1 P(x) \ln \left(\frac{P(x)}{P_{\mathrm{GOE}}(x)} \right) dx. \tag{6}$$

De esta expresión se ve que si la distribución de el espectro de energías coincide o es cercana a GOE, entonces su KL asociada es aproximadamente 0.

3 Resultados:

Para diferentes valores de J/U, dejando a $U = 1$, se calcularon los respectivos hamiltonianos de Bose Hubbard. Para cada instancia creada se calculó su $\langle r \rangle$ y KL asociados.



Figure 1: Media del cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard. Notar que existe una región de parámetros para la cual la $\langle r \rangle$ del sistema es cercana a la de GOE



Figure 2: Divergencia KL de la distribución cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard. Notar que existe una región de parámetros para la cual KL es cercana a 0

4 Discusión de resultados:

1. Los indicadores estadísticos $\langle r \rangle$ y KL

References

[1] E. P. Wigner, "Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions", Annals of Mathematics **62**, 548–564 (1955).

[2] M. V. Berry and M. Tabor, "Level clustering in the regular spectrum", Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences **356**, 375–394 (1977).

[3] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, "Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws", Physical Review Letters **52**, 1–4 (1984).

[4] M. L. Mehta, *Random matrices*, 3rd, Vol. 142, Pure and Applied Mathematics (Elsevier, Amsterdam, 2004).

[5] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, "Optimal route to quantum chaos in the bose–hubbard model", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **55**, 324002 (2022).

[6] J. M. Zhang and R. X. Dong, "Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example", European Journal of Physics **31**, 591–602 (2010).

[7] S. H. Tekur, U. T. Bhosale, and M. Santhanam, "Higher order spacing ratios in random matrix theory and complex quantum systems", Physical Review E **98**, 062218 (2018).

[8] V. Oganesyan and D. A. Huse, "Localization of interacting fermions at high temperature", Physical Review B **75**, 155111 (2007).

[9] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, "Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles", Physical Review Letters **110**, `10.1103/physrevlett.110.084101` (2013).

[10] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency", The Annals of Mathematical Statistics **22**, 79–86 (1951).