$|R_j|^2$ $|L_j|^2$ — teoría (dos ondas planas / $|z|^{2j}$)

$m = 19,\ \omega = -2.21$ $m = 18,\ \omega = -2.18$ $m = 17,\ \omega = -2.13$ $m = 16,\ \omega = -2.08$ $m = 15,\ \omega = -2.01$

$m = 14,\ \omega = -1.93$ $m = 13,\ \omega = -1.85$ $m = 12,\ \omega = -1.76$ $m = 11,\ \omega = -1.66$ $m = 10,\ \omega = -1.57$

$m = 9,\ \omega = -1.48$ $m = 8,\ \omega = -1.38$ $m = 7,\ \omega = -1.29$ $m = 6,\ \omega = -1.21$ $m = 5,\ \omega = -1.13$

$m = 4,\ \omega = -1.06$ $m = 3,\ \omega = -1.01$ $m = 2,\ \omega = -0.96$ $m = 1,\ \omega = -0.94$ borde, $\omega = 0.77,\ |z| = 1.87$

$m = 1,\ \omega = 0.94$ $m = 2,\ \omega = 0.96$ $m = 3,\ \omega = 1.01$ $m = 4,\ \omega = 1.06$ $m = 5,\ \omega = 1.13$

$m = 6,\ \omega = 1.21$ $m = 7,\ \omega = 1.29$ $m = 8,\ \omega = 1.38$ $m = 9,\ \omega = 1.48$ $m = 10,\ \omega = 1.57$

$m = 11,\ \omega = 1.66$ $m = 12,\ \omega = 1.76$ $m = 13,\ \omega = 1.85$ $m = 14,\ \omega = 1.93$ $m = 15,\ \omega = 2.01$

$m = 16,\ \omega = 2.08$ $m = 17,\ \omega = 2.13$ $m = 18,\ \omega = 2.18$ $m = 19,\ \omega = 2.21$ borde, $\omega = 2.38,\ |z| = 0.54$

0 5 10 15 20 j