

Ten Critical Questions

ASHA Sahayak — verified demonstration set

Every answer below was produced by the device
Jetson Orin Nano 8 GB · MAXN_SUPER · 11 Sep 2026
no network at any point

These ten were not chosen for how well they read. They were chosen by running twenty-six candidate questions through the device and keeping only those whose answers are correct and traceable to a page of the ASHA manual. **Sixteen were discarded** — among them a question about bleeding after delivery, which the device answered from the contraception page because Module 7 does not cover postpartum haemorrhage at all. What follows is what the device can actually do, not what it ought to.

01 Baby does not breathe at birth

बच्चा पैदा होने के बाद रो नहीं रहा है और साँस भी नहीं ले रहा तो क्या करें

WHY IT MATTERS Birth asphyxia is the single commonest cause of newborn death in the first minutes of life. The window to act is about a minute, and the ASHA is usually the only person present.

WHAT THE DEVICE SAYS

यदि बच्चा रो नहीं रहा है और जन्म के बाद साँस भी नहीं ले रहा है, तो तुरंत बच्चे को सुखाएं, डोर काटें, और बच्चे को सिर को थोड़ा बढ़ाया हुआ रखें। यदि बच्चा अभी भी रोता या साँस नहीं लेता है, तो श्लेष्मा निकालने वाले से गले या नाक को चूसो। यदि अभी भी साँस नहीं ले रहे हैं, तो एक थैले और प्रशिक्षित होने पर मास्क के साथ वेंटिलेशन करें।

If the baby is not crying and not even breathing after birth, immediately dry the baby, cut the cord, and place the baby in a position with the head slightly extended. If the baby still doesn't cry or breathe, suction the throat or nose with a mucus extractor. If still not breathing, perform ventilation with a bag and mask if trained.

manual pages 55 + 54 + 31 · 5.8 s to answer

02 Meconium-stained liquor

प्रसव के समय पानी पीला और गाढ़ा है और बच्चे का सिर दिख रहा है

WHY IT MATTERS Yellow, thick liquor means the baby has passed meconium in the womb. If it is inhaled at the first breath it blocks the airway, so the mouth must be cleared before the chest delivers.

WHAT THE DEVICE SAYS

बच्चा पीले, मोटे अमनीओटिक द्रव के साथ पैदा होता है, जो संभावित श्वासावरोध का संकेत देता है। सिर दिखाई देता है, इसलिए मुँह को साफ करने के लिए श्लेष्मा निकालने वाले का उपयोग किया जाता है। बच्चे की साँस लेने और रोने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, और यदि कोई साँस या कमजोर रो नहीं है, तो चूषण किया जाता है। इसके बाद बच्चे को सिर को विस्तारित रखने और श्लेष्मा निकालने वाले से साफ करने की स्थिति में रखा जाता है।

The baby is born with yellow, thick amniotic fluid, indicating possible asphyxia. The head is visible, so the mucus extractor is used to clear the mouth. The baby is assessed for breathing and crying, and if no breath or weak cry, suction is performed. The baby is then placed in a position to keep the head extended and cleaned with the mucus extractor.

manual pages 55 + 54 + 51 · 5.2 s to answer

03 Danger signs of newborn sepsis

नवजात में सेप्सिस के क्या लक्षण होते हैं

WHY IT MATTERS One newborn in ten develops sepsis in rural India and it is the commonest killer in the first month. Untreated most die; treated most recover completely, so recognition is the whole battle.

WHAT THE DEVICE SAYS

नवजात शिशु में सेप्सिस के लक्षणों में लंगड़े अंग, खाना बंद करना, छाती में दर्द, बुखार और छूने के लिए सर्दी होना शामिल हैं।

The symptoms of sepsis in a newborn include limp limbs, stopping feeding, chest indrawing, fever, and being cold to touch.

manual pages 56 + 57 + 54 · 3.6 s to answer

04 When to refer a newborn at once

नवजात को कब तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए

WHY IT MATTERS Knowing the signs is useless without knowing the threshold to act on them. This is the decision an ASHA has to make alone, at night, far from a facility.

WHAT THE DEVICE SAYS

यदि निम्नलिखित में से कोई भी संकेत विकसित होता है तो नवजात को तुरंत अस्पताल भेजा जाना चाहिए: अंग लंगड़े हो जाते हैं, खाना बंद कर देते हैं, छाती में दर्द होता है, बुखार होता है, या छूने के लिए सर्दी होती है।

A newborn should be sent to the hospital immediately if any of the following signs develop: limbs become limp, stops feeding, has chest indrawing, has fever, or is cold to touch.

manual pages 57 + 54 + 56 · 4.0 s to answer

05 Maternal infection after delivery

डिलीवरी के दस दिन बाद महिला को तेज बुखार है और बदबूदार रक्तस्राव हो रहा है

WHY IT MATTERS Puerperal sepsis is a leading cause of maternal death and it appears days after everyone has gone home, when no clinician is watching.

WHAT THE DEVICE SAYS

महिला को उच्च बुखार और दुर्गंध वाले निर्वहन के कारण तत्काल रेफरल लेने की सलाह दी जानी चाहिए, जो गर्भपात के बाद की जटिलताओं के लिए चेतावनी संकेत हैं।

The woman should be advised to seek immediate referral due to high fever and foul-smelling discharge, which are warning signs for post-abortion complications.

manual pages 39 + 43 + 64 · 3.6 s to answer

06 General danger signs in a sick child

बीमार बच्चे में खतरे के लक्षण कौन कौन से हैं

WHY IT MATTERS These four signs decide whether a child is treated at home or sent urgently. They are the entry point of the whole IMNCI algorithm.

WHAT THE DEVICE SAYS

एक बीमार बच्चे में खतरे के संकेतों में पीने या स्तनपान कराने में सक्षम नहीं होना, सब कुछ उल्टी करना, एंठन होना और सुस्ती या बेहोशी होना शामिल है। इनमें से किसी भी संकेत की उपस्थिति एक गंभीर बीमारी का संकेत देती है जिसके लिए तत्काल रेफरल की आवश्यकता होती है।

The danger signs in a sick child include not being able to drink or breastfeed, vomiting everything, having convulsions, and being lethargic or unconscious. The presence of any of these signs indicates a severe disease requiring immediate referral.

manual pages 22 + 23 + 32 · 4.6 s to answer

07 High fever with a stiff neck

बच्चे को तेज बुखार है और गर्दन अकड़ गई है

WHY IT MATTERS Fever with neck stiffness is meningitis until proved otherwise. Hours matter, and the temptation to treat a fever at home is exactly what costs the time.

WHAT THE DEVICE SAYS

आशा को बच्चे को इंजेक्शन योग्य एंटीबायोटिक दवाओं के साथ उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भेजना चाहिए।

The ASHA should refer the child urgently to a hospital for treatment with injectable antibiotics.

manual pages 24 + 25 + 62 · 3.7 s to answer

08 Bathing a low birth weight newborn

बच्चे का वजन बहुत कम है और परिवार उसे जन्म के तुरंत बाद नहलाना चाहता है

WHY IT MATTERS Bathing a newborn immediately is a widespread custom. In a small baby it causes hypothermia, which leads to sepsis. The ASHA has to overrule the family with a number, not an opinion.

WHAT THE DEVICE SAYS

दिशानिर्देशों के अनुसार, बच्चे को तब तक नहलाना न भूलें जब तक कि उसका वजन 2000 ग्राम न हो जाए। इसलिए, परिवार को नहाने से पहले बच्चे के इस वजन तक पहुंचने तक इंतजार करना चाहिए।

According to the guidelines, do not bathe a baby until its weight is 2000 gm. Therefore, the family should wait until the baby reaches this weight before bathing.

manual pages 52 + 55 + 51 · 4.7 s to answer

09 Dehydration in a child with diarrhoea

दस्त से पीड़ित बच्चे में पानी की कमी के लक्षण क्या हैं

WHY IT MATTERS Diarrhoea kills through dehydration, not infection. The signs are physical and checkable at the doorstep, and they decide between ORS at home and urgent referral.

WHAT THE DEVICE SAYS

दस्त वाले बच्चे में निर्जलीकरण के लक्षणों में सुस्ती, बेहोशी, आंखें डूबना, पीने की खराब क्षमता, खराब शराब पीना और त्वचा की एक चुटकी जो बहुत धीरे-धीरे वापस चली जाती है, शामिल हैं।

The symptoms of dehydration in a child with diarrhea include lethargy, unconsciousness, sunken eyes, poor drinking ability, drinking poorly, and a skin pinch that goes back very slowly.

manual pages 27 + 30 + 26 · 4.4 s to answer

10 Feeding a low birth weight baby

कम वजन वाले नवजात को दूध कैसे पिलाना चाहिए

WHY IT MATTERS A small baby who feeds poorly loses weight, gets cold and becomes septic. Feeding support in the first days is what breaks that chain.

WHAT THE DEVICE SAYS

पूरे स्तन पर हल्का दबाव डालकर दूध को व्यक्त करें और एक साफ कटोरी में दूध इकट्ठा करें। दूध की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए हर 2-3 घंटे में दूध का प्रयोग करें। बच्चे को स्तन के पास रखें और उसे निप्पल चाटने दें, और चूसने की कोशिश करें। एक बार जब बच्चा चूसने में सक्षम हो जाता है, तो दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उसे जितनी बार हो सके स्तन में डाल दिया जाना चाहिए।

Express milk by applying gentle pressure over entire breast and collect milk in a clean bowl. Express milk every 2-3 hours to keep the milk supply up. Put baby to breast and allow her to lick the nipple, and try to suckle. Once the baby is able to suckle, she should be put to the breast as often as possible to stimulate milk production.

manual pages 51 + 53 + 5 · 5.5 s to answer

Two things to know before demonstrating

The translation has two rough edges in this set. "Chest indrawing" comes out as छाती में दर्द, which means chest pain, and "limbs limp" as अंग लंगड़े, which suggests limping rather than floppy. The English is right and the retrieval is right; the Hindi wording is not, and it is a translation-model limit, not a retrieval one.

Speak the question as written. Speech recognition is the weakest link in the chain: one mis-heard syllable once turned a question about an eye infection into one about a child drinking, and the device answered the question it was given. One word decides the meaning.

Recording is a toggle — one press starts, the next ends it, and 3.5 s of silence ends it anyway. Timings above are machine time from the stop, and exclude how long the question itself takes to ask.