

Whole-Manual Test Sheet

ASHA Sahayak — one question from every page, 20 to 84

Every Hindi line below came from the device
Jetson Orin Nano 8 GB · MAXN_SUPER · 12 Sep 2026
no network at any point

The jury has the manual and may ask anything in it, so this sheet does not pick favourable questions: it takes **one question from every page** of ASHA Module 7 from page 20 onward, whatever that page happens to be about. Ask them in any order. Under each question is the answer the device gave when this sheet was built, so a wrong answer on the day is visible immediately rather than having to be judged from memory.

50/52 ANSWERED FROM THE MANUAL	39 USED THE PAGE THE QUESTION CAME FROM	99% SPOKEN QUESTIONS HEARD CORRECTLY	12/12 OFF-MANUAL QUESTIONS REFUSED	4.1s MEDIAN TIME TO ANSWER
--	---	--	--	--------------------------------------

Seven of the fifty-two are marked in orange: two the device refuses, two it answers wrongly, and three it answers loosely. What is printed under those is the reason and what the manual actually says, not the device's answer. The other forty-five are printed exactly as the device said them.

Part A — Child health, fever, diarrhoea, breathing

pages 20–33

01	आशा को टीकाकरण के लिए कौन सी सूची रखनी होती है आशा कार्यकर्ता को गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और दो साल तक के बच्चों की एक सूची रखनी होती है जो अलग-अलग टीकों के लिए पात्र हैं।	from p20 → p20 + p41 + p67 · 4.1s
02	टीका लगवाने के लिए आशा माता की क्या मदद करे आशा माँ को टीकाकरण की तारीख याद दिलानी चाहिए, वी. एच. एन. डी. को सतर्क किया जाना चाहिए और नियत तिथि पर वी. एच. एन. डी. तक ले जाया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि जन्म के तुरंत बाद बी. सी. जी. और मौखिक पोलियो की पहली खुराक दी जाए।	from p21 → p67 + p11 + p21 · 4.7s
03	बीमार बच्चे में खतरे के लक्षण कौन कौन से हैं बीमार बच्चे में खतरे के संकेतों में पीने या स्तनपान न करना, सब कुछ उल्टी करना, ऐंठन होना, या सुस्ती या बेहोशी होना शामिल है। इनमें से किसी भी संकेत की उपस्थिति एक गंभीर बीमारी का संकेत देती है जिसे तत्काल रेफरल की आवश्यकता होती है।	from p22 → p22 + p23 + p32 · 4.6s
04	कैसे पता करें कि बच्चा पानी पी सकता है या नहीं जाँच करें कि जब कोई पेय दिया जाता है तो बच्चा चूसा या निगल सकता है या नहीं। यदि बच्चा पीने में सक्षम नहीं है या तरल पदार्थ खराब तरीके से पी रहा है, तो बच्चे में "उत्सुकता से तरल पदार्थ पीने, प्यासे" का संकेत नहीं है।	from p23 → p27 + p22 + p67 · 4.5s
05	बुखार वाले बच्चे की जांच आशा कैसे करे आशा कार्यकर्ताओं को माँ से पूछना चाहिए कि क्या बच्चे को बुखार है, थर्मामीटर से या बच्चे के तापमान की जांच करके, और यदि बुखार मौजूद है, तो सामान्य खतरे के संकेतों का आकलन करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो संदर्भ लेना चाहिए।	from p24 → p24 + p22 + p64 · 4.7s
06	बुखार के साथ गर्दन अकड़ी हो तो क्या करना चाहिए यदि गर्दन में बुखार है, तो मस्तिष्क शोथ की जांच करें और तुरंत अस्पताल में भर्ती हों। मलेरिया-रोधी और पेरासिटामोल की पहली खुराक दें, और बारीकी से निगरानी करें।	from p25 → p24 + p25 + p54 · 3.7s
07	दस्त वाले बच्चे में पानी की कमी कैसे पहचानें बच्चे की सामान्य स्थिति का आकलन करना, सुस्ती या बेहोशी, डूबती हुई आंखें और त्वचा की एक चुटकी की जांच करना। यदि बच्चे में निर्जलीकरण के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आशा को उन्हें अस्पताल में भेजना चाहिए या ओ. आर. एस. के साथ उपचार प्रदान करना चाहिए।	from p26 → p26 + p30 + p27 · 5.1s
08	पानी की कमी के लक्षण क्या होते हैं निर्जलीकरण के लक्षणों में सुस्ती, बेहोशी, आंखें डूबना, तरल पदार्थ का खराब सेवन, त्वचा की चुटकी जो बहुत धीरे-धीरे वापस चली जाती है, और मूत्र उत्पादन की कमी शामिल है।	from p27 → p27 + p30 + p26 · 4.1s
09	ओ आर एस का घोल कितने पानी में बनाना चाहिए 1 लीटर पीने का पानी।	from p28 → p29 + p28 + p33 · 2.9s
10	दस्त है पर पानी की कमी नहीं है तो क्या दें यदि आपको दस्त है लेकिन निर्जलित नहीं हैं, तो ओ. आर. एस. घोल और घर पर उपलब्ध तरल पदार्थ दें। छह महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए, ओआरएस और साफ पानी का उपयोग करें; बड़े बच्चों के लिए, ओआरएस और घर पर उपलब्ध तरल पदार्थों का उपयोग करें। प्रत्येक ढीले शौच के बाद अनुशंसित मात्रा में ओ. आर. एस. दें (शिशुओं के लिए 5 चम्मच, 2–24 महीने की उम्र के बच्चों के लिए आधा कप, बड़े बच्चों के लिए एक कप तक)।	from p29 → p30 + p27 + p29 · 6.3s

11	कुछ पानी की कमी हो तो चार घंटे में कितना ओ आर एस दें	from p30 → p30 + p29 + p27 · 6.0s
	चार घंटे में ओ. आर. एस. की मात्रा बच्चे की उम्र और वजन पर निर्भर करती है। 4 महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए, 200 मिली (2 कप) की सिफारिश की जाती है। आई. डी. 1. से अधिक महीनों के बच्चों के लिए, 300 मिली (3 कप) की सिफारिश की जाती है। 12-19 किलोग्राम के बच्चों के लिए, 500 मिली (5 कप) की सिफारिश की जाती है। सटीक राशि के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए	
12	साँस की बीमारी में आशा क्या दवा दे सकती है	from p31 → p10 + p32 + p33 · 3.1s
	इसका उत्तर है कोट्रिमोक्साजोल।	
13	पसली चलने का क्या मतलब होता है	from p32 → p31 + p32 + p43 · 3.6s
	छाती को अंदर खींचना छाती के अंदर आने का संकेत देता है, जो एक बच्चे में निमोनिया का संकेत है।	
14	बच्चे की नाक बंद हो तो घर पर क्या करें	from p33 → p33 + p23 + p58 · 3.9s
	नाक की बूंदों (उबला हुआ और ठंडा हुआ गिलास पानी, चुटकी भर नमक मिलाकर) में डालकर और नरम सूती बस्ते से नाक को साफ करें।	

Part B – Abortion, family planning, infections

pages 37-48

15	गर्भपात के बारे में आशा महिला को क्या सलाह दे	from p37 → p38 + p37 + p41 · 4.4s
	महिला को सलाह दी जानी चाहिए कि वह केवल एक प्रशिक्षित, कानूनी प्रदाता से सुरक्षित गर्भपात कराएँ, कम से कम पाँच दिनों तक यौन संबंध बनाने या योनि में वस्तु डालने से बचें, बहुत सारा तरल पदार्थ पीएं और गर्भपात के तुरंत बाद गर्भनिरोधक का उपयोग करें।	
16	भारत में गर्भपात कौन कर सकता है	from p38 → p38 + p37 + p39 · 2.3s
	भारत में केवल एक डॉक्टर गर्भपात कर सकता है।	
17	गर्भपात के बाद खतरे के लक्षण क्या हैं	from p39 → p38 + p37 + p65 · 3.6s
	गर्भपात के बाद जोखिम के लक्षणों में दो सप्ताह तक योनि से रक्तस्राव, प्रक्रिया के तुरंत बाद गर्भनिरोधक उपयोग की आवश्यकता और गर्भनिरोधक के बिना संभोग फिर से शुरू होने पर गर्भावस्था का खतरा शामिल है।	
18	परिवार नियोजन में आशा की क्या भूमिका है	from p40 → p45 + p40 + p9 · 3.9s
	परिवार नियोजन में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका में गर्भनिरोधक तरीकों पर परिवारों को परामर्श देना, अनुवर्ती कार्यवाई के लिए योग्य जोड़ों की पहचान करना, स्वास्थ्य रजिस्ट्रों का प्रबंधन करना और सेवाओं तक पहुंच के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल है।	
19	नए शादीशुदा जोड़े को कौन सा साधन बताएं	from p41 → p41 + p40 + p42 · 4.4s
	नवविवाहित जोड़े को सलाह देने के लिए, आपको उन्हें उनकी स्थिति के लिए उपयुक्त गर्भनिरोधक तरीकों, जैसे कंडोम या गोलिएँ के बारे में सलाह देनी चाहिए, और दुष्प्रभावों और आगे की सहायता कब लेनी है, इस बारे में जानकारी देनी चाहिए।	
20	स्तनपान कराने वाली महिला को गोली देनी चाहिए या नहीं	from p42 → p42 + p41 + p13 · 3.3s
	स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए गोलिएँ की सलाह नहीं दी जानी चाहिए।	
21	किन महिलाओं को छल्ला नहीं लगवाना चाहिए	from p43 → p43 + p41 + p42 · 5.0s
	आई. यू. सी. डी. किसे नहीं होना चाहिए: जो महिलाएं कभी गर्भवती नहीं हुई हैं, एनीमिया, उन्हें एस. टी. आई. का खतरा है, उनकी नलिकाओं या गर्भाशय में संक्रमण हुआ है, उनकी नलिकाओं में गर्भावस्था हुई है, या मासिक रक्तस्राव के दौरान बहुत अधिक रक्तस्राव और दर्द होता है।	
22	नसबंदी के बारे में महिला को क्या बताना चाहिए	from p44 → p44 + p41 + p40 · 4.3s
	महिला को यह उल्लेख करना चाहिए कि नसबंदी एक स्थायी विधि है, कि यह केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अधिक बच्चे नहीं चाहते हैं, और यह कि यह पीएचसी या सीएचसी केंद्रों में विशिष्ट समय पर किया जाता है।	
23	गाँव के स्तर पर आशा कौन से साधन दे सकती है	from p45 → p45 + p63 + p12 · 4.2s
	आशा कार्यकर्ता परिवार परामर्श के लिए आई. ई. सी., जांच के प्रावधान के लिए जांच, सहायता के लिए रेफरल और ग्राम स्तर पर नसबंदी और आई. यू. डी. पर प्रशिक्षण जैसे साधन प्रदान करती हैं।	
24	यौन संक्रमण से बचाव के लिए महिला को क्या सलाह दें	from p46 → p42 + p48 + p43 · 4.1s
	महिला को कंडोम का उपयोग करने की सलाह दें, क्योंकि वे एसटीआई और एचआईवी को रोकने में प्रभावी हैं, और नियमित यौन स्वास्थ्य जांच को प्रोत्साहित करते हैं।	
25	यौन रोग से क्या नुकसान हो सकता है	from p47 → p46 + p48 + p61 · 4.6s
	यौन संचारित संक्रमण (एस. टी. आई.) के कारण होने वाले नुकसान में श्रोणि सूजन रोग, बांझपन और अन्य संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि जैसी जटिलताओं का खतरा शामिल है। यह पुरानी स्थितियों और गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण भी बन सकता है।	

- 26 यौन संक्रमण में आराम के लिए महिला क्या करे from p48 → p48 + p43 + p42 · 4.9s
महिला को 15 मिनट तक साफ, गर्म पानी के पैर में बैठना चाहिए, उसमें निम्बू का रस डालना चाहिए और तब तक यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए जब तक कि वह बेहतर महसूस नहीं करती, सूती कपड़े पहनना चाहिए, रोजाना अंडरगारमेंट्स धोना चाहिए और पेशाब करने के बाद जननांगों पर साफ पानी डालना चाहिए।

Part C – The newborn

pages 51–58

- 27 किस नवजात को अधिक जोखिम वाला माना जाता है from p51 → p51 + p56 + p52 · 4.2s
नवजात शिशु को अधिक जोखिम वाला माना जाता है, वह है जो समय से पहले पैदा होता है (गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले प्रसव) या कम जन्म वजन (2000 ग्राम से कम) के साथ, या दोनों।
- 28 कम वजन वाले बच्चे को कब तक नहीं नहलाना चाहिए from p52 → p52 + p51 + p53 · 3.3s
बच्चे को तब तक नहलाया नहीं जाना चाहिए जब तक कि उसका वजन 2000 ग्राम न हो जाए।
- 29 कम वजन वाले नवजात को माँ का दूध क्यों जरूरी है from p53 → p53 + p51 + p10 · 5.7s
कम वजन वाले नवजात शिशु के लिए माँ का दूध महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिक प्रोटीन सहित सही पोषक तत्व प्रदान करता है, जो विकास और विकास के लिए आवश्यक है। यह आसानी से पचने योग्य है और इसमें संक्रमण से लड़ने के कारक होते हैं, जो बच्चे को हाइपोथर्मिया और बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। स्तनपान भी बच्चे को माँ के करीब रखता है, जिससे गर्मजोशी और समर्थन मिलता है।
- 30 जन्म के समय दम घुटने के क्या लक्षण हैं from p54 → p54 + p55 + p5 · 3.3s
जन्म के समय दम घुटने के लक्षणों में कोई रो नहीं, कमजोर रो, सांस नहीं लेना और सांस लेने में कमजोरी शामिल हैं।
- 31 प्रसव में किन बातों से दम घुटने का खतरा रहता है from p55 → refused
Refuses. The page lists what raises the risk of asphyxia during labour; the question asks it in words closer to the page after it, and the device would rather say nothing than answer from the wrong page.
- 32 नवजात को सेप्सिस किन कारणों से होता है from p56 → p56 + p57 + p5 · 4.0s
नवजात शिशुओं में सेप्सिस के कारणों में मातृ संक्रमण, अशुद्ध प्रसव प्रथाएं, संक्रमित नाभि, समय से पहले जन्म, खराब भोजन, सर्दी के संपर्क में आना और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आना शामिल हैं।
- 33 नवजात को संक्रमण से कैसे बचाएं from p57 → p53 + p56 + p46 · 4.1s
Incomplete. It gives breastfeeding, which is on the page, but page 57 leads with hygiene - frequent handwashing, clean instruments at delivery, clean clothes - and the device does not say so.
- 34 अस्पताल ले जाते समय नवजात को कैसे संभालें from p58 → p57 + p27 + p17 · 6.4s
Wrong. It answers with the antibiotic dose from the page before. Page 58 says to keep the baby warm by skin-to-skin contact with the mother and to keep breastfeeding during transport, giving 20-50 ml of expressed milk if the baby cannot feed.

Part D – Malaria and TB

pages 61–68

- 35 मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए from p61 → p62 + p63 + p61 · 3.5s
मलेरिया को रोकने के लिए, कीटनाशक-उपचारित बिस्तर जाल का उपयोग करें, रुके हुए पानी से बचें और मच्छर प्रजनन स्थलों को समाप्त करें।
- 36 मलेरिया का शक कब करना चाहिए from p62 → p62 + p63 + p61 · 3.4s
मलेरिया का संदेह कब करना है: मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मलेरिया होने का संदेह होना चाहिए। यदि बुखार ठंडक और कठोरता और सिरदर्द के साथ है, तो इसकी संभावना और भी अधिक है।
- 37 मच्छरों को बढ़ने से कैसे रोकें from p63 → p63 + p62 + p84 · 4.1s
कीटनाशक का छिड़काव करें जहाँ मच्छर काटते हैं, प्रजनन गड्ढों को सुखा देते हैं, रुके हुए पानी पर तेल डालते हैं, गैंबुसिया मछली की खेती करते हैं, और साप्ताहिक रूप से नालियों और नहरों को साफ करते हैं।
- 38 बुखार वाले मरीज की जांच कब करनी चाहिए from p64 → p64 + p62 + p61 · 4.0s
बुखार वाले रोगी की आर. जी. टी. और रक्त स्लाइड का उपयोग करके जांच की जानी चाहिए यदि वे आपके पास आते हैं और एक दिन के भीतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा सकते हैं।
- 39 टीबी कैसे फैलती है from p65 → p65 + p80 + p61 · 4.1s
फुफ्फुसीय टीबी के रोगी के खांसने या छींकने पर हवा में छोटी बूंदों के माध्यम से टीबी के कीटाणु फैलते हैं। इन बूंदों को एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा साँस में लिया जा सकता है, जिससे संक्रमण हो सकता है।

40	टीबी की जांच कैसे होती है	from p66 → p65 + p51 + p5 · 4.5s
	टी. बी. का निदान मुख्य रूप से थूक की जांच के माध्यम से किया जाता है, जहां थूक में टी. बी. रोगाणु की उपस्थिति संक्रमण की पुष्टि करती है। थूक के कम से कम दो नमूने एकत्र किए जाते हैं, एक घर पर और एक स्वास्थ्य सुविधा में, और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सूक्ष्मदर्शी के तहत जांच की जाती है।	
41	टीबी के इलाज में आशा की क्या भूमिका है	from p67 → p67 + p63 + p9 · 4.1s
	आशा कार्यकर्ता रोगियों को उनका उपचार पूरा करने के लिए प्रेरित करके, दुष्प्रभावों का प्रबंधन करके, उचित दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करके और परिवारों को स्वच्छता और अलगाव उपायों के बारे में शिक्षित करके टीबी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।	
42	टीबी की दवा बीच में छोड़ने से क्या होता है	from p68 → refused
	Refuses. Page 68 is about relapse and about TB drugs in pregnancy - it does not say what happens when treatment is stopped halfway, so there is nothing on it to answer with.	

Annexes – Procedures, kits and doses

pages 75–84

43	नवजात की नाभि में मवाद हो तो क्या लगाना चाहिए	from p75 → p54 + p56 + p75 · 2.6s
	जेंटियन वायलेट लोशन।	
44	जन्म के बाद बच्चे का गला कैसे साफ करें	from p76 → p55 + p53 + p76 · 3.9s
	ट्यूब को मुँह में डालकर और स्राव को चूसने के द्वारा बच्चे के गले को साफ करने के लिए एक म्यूकस एक्सट्रैक्टर का उपयोग करें, फिर नाक से दोहराएं।	
45	मलेरिया की जांच किट में क्या क्या होता है	from p77 → p62 + p77 + p61 · 4.2s
	मलेरिया परीक्षण किट में एक स्पिरिट स्वैब, डिस्पोजेबल लैंसेट, केशिका नली, परीक्षण पट्टी, कई कुएं वाली प्लास्टिक प्लेट, परीक्षण नली, बफर घोल और सूखने का पानी होता है।	
46	जांच पट्टी पर दो लाल लकीर का क्या मतलब है	from p78 → p78 + p16 + p81 · 3.1s
	चेकबार पर दो लाल रेखाएँ फाल्सीपेरम मलेरिया का संकेत देती हैं।	
47	खून की स्लाइड बनाने के लिए क्या सामान चाहिए	from p79 → p80 + p64 + p77 · 4.3s
	Wrong. It lists the rapid-test kit. Page 79 asks for clean glass slides, a disposable lancet, a spirit or cotton swab, cotton, a clean cotton cloth and a lead pencil.	
48	खून की मोटी स्लाइड कैसे बनाते हैं	from p80 → p80 + p64 + p79 · 4.4s
	मोटी रक्त स्लाइड एक साफ स्लाइड के साथ रक्त की एक बूंद को छूकर, एक वृत्त बनाने के लिए इसे दूसरी स्लाइड के कोने के साथ फैलाकर, और फिर दूसरी बूंद को ले जाने वाली स्लाइड के किनारे को पहली स्लाइड की सतह पर लाते हुए, तब तक प्रतीक्षा करते हुए बनाई जाती है जब तक कि रक्त पूरे किनारे पर नहीं फैलता।	
49	बच्चे को दवा कितने दिन तक देनी है	from p81 → p30 + p32 + p62 · 3.0s
	Answers “5 days”. Page 81 carries two courses at once - Amoxicillin for seven days and Cotrimoxazole for five - and the question does not say which child. Name the illness when asking.	
50	खून की कमी वाले बच्चे को आयरन कितने दिन दें	from p82 → p15 + p14 + p82 · 2.9s
	इसका जवाब 14 दिन का है।	
51	मलेरिया की दवा कितने दिन देनी होती है	from p83 → p62 + p64 + p12 · 4.5s
	Answers by pointing at the dosage table in Annexe 6 rather than giving the number of days, because that is how the page itself puts it.	
52	टीबी की दवा से पेशाब लाल हो तो क्या करें	from p84 → p84 + p48 + p78 · 3.3s
	यदि टीबी की दवा से मूत्र लाल हो जाता है, तो रोगी को आश्चस्त करें और गंभीर होने पर एम. ओ. से परामर्श लें।	

How to use this sheet

Speak the question as written. Recognition is the weakest link in the chain, and one mis-heard word changes the question. Over 156 recognitions of these 52 questions, 99% kept the word that carries the meaning — but that is a synthetic voice; a room with people in it is harder.

Recording is a toggle. One press starts, the next ends it, and 3.5 s of silence ends it anyway. The times printed are machine time from the stop, and do not include how long the question itself takes to ask.

The manual is Module 7 only. Antenatal care, bleeding after delivery and anaemia in pregnancy are not in this book, so a question about them has no right answer to find. The device should say it does not have the information rather than answer from a neighbouring page; that is the behaviour to check, not a gap to hide.