

第01讲 行列式的基本概念与计算

行列式的定义

排序与逆序

逆序:

- 即在排列中前面有一个数比自身大的情况

逆序数:

- 一个排列中,逆序的总数,记作 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$,例如: $\tau(231546) = 3, \tau(621534) = 8$

n阶行列式的定义

行列式的性质

1. 行列互换,其值不变,即 $|A| = |A^T|$
2. 行列式某行(列)元素全为零,则行列式为零
3. **倍乘**:行列式中某行(列)元素有公因子 $k(k \neq 0)$,则 k 可以提到行列式外
4. 行列式中某行(列)元素均是两个元素之和,则可拆成两个行列式之和
5. **互换**:行列式中两行(列)互换,行列式的值反号
6. 行列式中的两行(列)相等或对应成比例,则行列式为零
7. **倍加**:行列式中某行(列)的 k 倍加到另一行(列),行列式的值不变
 - $(i) + k(j)$: j 行的 k 倍加到 i 行
 - $[i] + k[j]$: j 列的 k 倍加到 i 列

行列式的展开定理

余子式

余子式

- 在 n 阶行列式中
- 去掉元素 a_{ij} 所在的第 i 行,第 j 列元素
- 由剩下的元素按原来的位置与顺序组成的 $n - 1$ 阶行列式
- 称为 a_{ij} 的余子式
 - 记成 M_{ij}

代数余子式

- 代数余子式:

$$\circ A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$M_{ij} = (-1)^{i+j} A_{ij}$$

行列式按某一行(列)展开的展开公式

行列式按某一行(列)展开的展开公式

- 按*i*行: $|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} (i = 1, 2, \dots, n)$
- 按*j*列: $|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij} (j = 1, 2, \dots, n)$
- 如果行列式的某行(列)元素分别乘另一行(列)元素的代数余子式后再求和, 结果为零
 - 容易忽略

几个重要的行列式

1. 上下三角行列式

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

2. 副对角线行列式

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$$

3. 两个特殊的拉普拉斯展开式

$$\begin{bmatrix} A_{m \times m} & 0 \\ 0 & B_{m \times m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & B \end{bmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{bmatrix} 0 & A_{n \times n} \\ B_{m \times m} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & A \\ B & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & A \\ B & C \end{bmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

4. 范德蒙行列式

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^0 & x_2^0 & \cdots & x_n^0 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

注意: $|A| = |A^T|$

5. 行和或列和相等的行列式

$$\begin{bmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{bmatrix}_{n \times n} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

行列式的计算总结

- 将行或列尽量变为1或0
- 注意按行拆分还是列拆分计算方便
- 抓型行列式化为三角行列式
- 每行的和相等,且各行元素依次循环
 - 将2, 3, ..., n列(行)加到第一列(行),然后提取
- 加边法
 - 由行列式定义可知,若第1列为 $[1, 0, 0, \dots, n]^T$,然后可以在使用定义的求行列式的行处添加任意的值
- 数学归纳法
 - 第一类归纳法
 - 验证 $n = 1$ 时,命题成立
 - 假设 $n = k$ 时,命题成立
 - 证明 $n = k + 1$ 时命题成立
 - 则命题对任意正整数 n 成立
 - 第二类归纳法
 - 验证 $n = 1$ 和 $n = 2$ 时命题成立
 - 假设 $n < k$ 时,命题成立
 - 证明 $n = k$ 时命题成立
 - 则命题对任意正整数 n 成立
 - 区分第一类归纳法和第二类归纳法的使用
 - 第一类归纳法的递推式 $D_k = D_{k-1}$
 - 第二类归纳法的递推式 $D_k = D_{k-1} + D_{k-2}$
- 善用递推关系式