

Perine Anatomisi

Pelvise kısa giriş ve perinenin topografik anatomisi – tıp öğrencileri için

- Latince etiketli atlas çizimleri ve seçilmiş kadavra görüntüleri
- Perine fasyaları, aralıklar, kaslar, damar ve sinirler
- Klinik bağlantılar ve kendini değerlendirme soruları





Türkçe anlatım · Latince terminoloji (Terminologia Anatomica, TA2 2019)

Öğrenim hedefleri


- Pelvisi oluşturan kemikleri ve apertura pelvis superior / inferior sınırlarını sayabilmek
- Diaphragma pelvis'i (m. levator ani, m. coccygeus) tanımlayabilmek
- Perinenin sınırlarını ve regio urogenitalis – regio analis ayrımını açıklayabilmek
- Perine fasyalarını (Colles fasyası, fascia perinei, membrana perinei) ve aralıkları (spatium perinei superficiale / profundum) sıralayabilmek
- Perine kaslarını, corpus perineale'yi ve fossa ischioanalis'i tanımlayabilmek
- N. pudendus ve a. pudenda interna'nın seyrini ve dallarını bilmek; temel klinik bağlantıları kurabilmek

BÖLÜM 1

Pelvis

Kısa giriş – perinenin kemik çerçevesi ve tabanı


- Pelvis kemikleri
- Pelvis major / minor
- Kadın – erkek pelvisi
- Bağlar, diaphragma pelvis



OpenStax A&P, Şekil 8.12 'Pelvis' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

Pelvis: kemikler ve eklemler

Pelvis = iki os coxae + os sacrum + os coccygis



OpenStax A&P, Şekil 8.12 'Pelvis' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

- Os coxae üç kemiğin kaynaşmasıdır: os ilium, os ischii, os pubis (acetabulum'da birleşirler).
- Eklemler: art. sacroiliaca, symphysis pubica, art. sacrococcygea.
- Linea terminalis (promontorium → linea arcuata → pecten ossis pubis → symphysis): pelvis major / minor sınırı.
- Perine açısından önemli noktalar: tuber ischiadicum, ramus ischiopubicus, os coccygis, symphysis pubica.


OpenStax College. Anatomy & Physiology. OpenStax CNX, 2013 (1. baskı), Şekil 8.12 'Pelvis'. Lisans: CC BY (openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology). Uyarlama: İngilizce etiketler Latinceye çevrildi.

Pelvis major – pelvis minor ve pelvis açıklıkları

	Sınırlar	Önemi
Pelvis major	Linea terminalis'in üstü; iki ala ossis ilii arası	Karın boşluğunun alt kısmı (barsaklar)
Pelvis minor	Linea terminalis'in altı	Mesane, rektum, iç genital organlar; doğum kanalı
Apertura pelvis superior	Promontorium – linea arcuata – pecten ossis pubis – symphysis üst kenarı	Pelvis girişi
Apertura pelvis inferior	Symphysis alt kenarı – rami ischiopubici – tubera ischiadica – ligg. sacrotuberalia – os coccygis	Pelvis çıkışı = perinenin sınırları

Kadın ve erkek pelvisi

Kadın pelvisi doğuma uyumludur




OpenStax A&P, Şekil 8.13 'Kadın ve erkek pelvisi' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

- Kadında angulus subpubicus geniş (≈80–90°), erkekte dar (≈50–60°).
- Kadında apertura pelvis superior oval/yuvarlak, erkekte kalp biçimli.
- Kadın pelvisi daha geniş ve sığ; erkek pelvisi dar ve derin.
- Erkek kemikleri daha kalın, kas izleri belirgin.

OpenStax College. Anatomy & Physiology. OpenStax CNX, 2013 (1. baskı), Şekil 8.13 'Kadın ve erkek pelvisi'. Lisans: CC BY (openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology). Uyarlama: İngilizce etiketler Latinceye çevrildi.

Pelvis bağları ve foramina ischiadica

Lig. sacrospinale ve lig. sacrotuberale




OpenStax A&P, Şekil 8.14 'Pelvis bağları' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

- Lig. sacrospinale: os sacrum → spina ischiadica.
- Lig. sacrotuberale: os sacrum → tuber ischiadicum.
- Bu iki bağ incisura ischiadica'ları foramene çevirir: foramen ischiadicum majus ve minus.
- N. pudendus ve a. pudenda interna: majus'tan pelvisi terk eder, spina'nın arkasından dolanıp minus'tan perineye girer.

OpenStax College. Anatomy & Physiology. OpenStax CNX, 2013 (1. baskı), Şekil 8.14 'Pelvis bağları'. Lisans: CC BY (openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology). Uyarlama: İngilizce etiketler Latinceye çevrildi.

Diaphragma pelvis (pelvis tabanı)

Perinenin tavanı



Diaphragma pelvis – üstten bakış

OpenStax A&P, Şekil 11.12 'Pelvis tabanı kasları' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

- M. levator ani: m. pubococcygeus (+ m. puborectalis) ve m. iliococcygeus.
- Arkada m. coccygeus tabanı tamamlar.
- Görevi: pelvis organlarını taşımak, karın içi basınca karşı koymak, kontinansa yardım.
- Ortada açıklık (hiatus urogenitalis): urethra (kadında + vagina) geçer.
- İnnervasyon: S3–S4 dalları (n. levatoris ani) ve n. pudendus.
- Diaphragma pelvis'in altında kalan bölge = perine.


OpenStax College. Anatomy & Physiology. OpenStax CNX, 2013 (1. baskı), Şekil 11.12 'Pelvis tabanı kasları'. Lisans: CC BY (openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology). Uyarlama: İngilizce etiketler Latinceye çevrildi.

BÖLÜM 2

Perine – genel

Tanım, sınırlar, üçgenler

- Sınırlar
- Regio urogenitalis / regio analis
- Corpus perineale



Erkek perinesi – alttan bakış

Kadın perinesi – alttan bakış


OpenStax A&P, Şekil 11.13 'Perine kasları' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

Perine: tanım ve sınırlar

- Perineum: diaphragma pelvis'in altında, uyluklar arasındaki eşkenar dörtgen biçimli bölge.
- Önde: symphysis pubica
- Önde-yanda: rami ischiopubici
- Yanda: tubera ischiadica
- Arkada-yanda: ligg. sacrotuberalia; arkada: os coccygis
- İki tuber ischiadicum'u birleştiren çizgi perineyi ikiye ayırır: önde regio urogenitalis, arkada regio analis.

Perinenin iki üçgeni

Litotomi pozisyonu – aşağıdan bakış



- Regio urogenitalis (ön üçgen): dış genital organlar, urethra (kadında + vagina).
- Regio analis (arka üçgen): canalis analis, m. sphincter ani externus, iki yanda fossa ischioanalis.
- Ortada corpus perineale: perine kaslarının birleştiği fibromusküler merkez.

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir).

Perinenin sınırları – kadavrada

Erkek perinesi, aşağıdan bakış (deri altı yağ kaldırılmış)

KADAVRA

PERİNE – GENEL




FIGURE 1 – Muro S. ve ark., 2020 (PMC7898478, CC BY-NC-ND)

- Tuber ischiadicum, ramus ischiopubicus ve os coccygis perinenin kemik çerçevesini oluşturur.
- Önde ürogenital kaslar (m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus), arkada m. sphincter ani externus ve anüs.

Lisans: CC BY-NC-ND – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı; görsel değiştirilmeden (kırpılmadan) kullanılmıştır.

Muro S., Tsukada Y., Ito M. et al. The series of smooth muscle structures in the pelvic floors of men: Dynamic coordination of smooth and skeletal muscles. Clin Anat. 2020 Dec 30;34(2):272–82. doi: 10.1002/ca.23713 PMCID: PMC7898478. Lisans: CC BY-NC-ND.

Corpus perineale (centrum tendineum perinei)


- Erkekte bulbus penis ile anüs, kadında vagina ile anüs arasında yer alan fibromusküler düğüm.
- Buraya tutunan kaslar: m. bulbospongiosus, m. transversus perinei superficialis ve profundus, m. sphincter ani externus, m. levator ani lifleri.
- Kadında pelvis tabanının önemli destek noktasıdır.
- Klinik: doğumda perine yırtıkları (1.–4. derece) ve epizyotomi. Mediolateral epizyotomi anal sfinkteri korumak için tercih edilir.

BÖLÜM 3

Regio urogenitalis

Fasyalar, aralıklar, kaslar, dış genital organlar

- Perine fasyaları
- Yüzeyel ve derin aralık
- Erkek ve kadın
- Klinik



OpenStax A&P, Şekil 27.11 'Vulva' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

Regio urogenitalis – yüzeyden derine katmanlar

▲ *kraniyal (derin) – cavitas pelvis*

Fascia superior diaphragmatis pelvis

M. levator ani (diaphragma pelvis)

Fascia inferior diaphragmatis pelvis

Recessus anterior fossae ischioanalis (yağ)

SPATIUM PERINEI PROFUNDUM – m. sphincter urethrae externus, m. compressor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis, m. transversus perinei profundus, gl. bulbourethralis

Membrana perinei

SPATIUM PERINEI SUPERFICIALE – crura & bulbus (penis/clitoridis, vestibuli), m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus, m. transversus perinei superficialis, gl. vestibularis major

Fascia perinei (Gallaudet; kasları saran yatırım fasyası)

Stratum membranosum telae subcutaneae perinei (Colles fasyası)

Panniculus adiposus telae subcutaneae perinei

Cutis

▼ *kaudal (yüzeyel) – deri*

- 1. Deri ve panniculus adiposus (yağlı tabaka)
- 2. Colles fasyası (stratum membranosum) – karındaki Scarpa fasyasının devamı
- 3. Spatium perinei superficiale – penis/clitoris kökü, yüzeyel kaslar
- 4. Membrana perinei
- 5. Spatium perinei profundum – m. sphincter urethrae externus
- 6. Diaphragma pelvis (m. levator ani) – perinenin tavanı

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir). Kalınlıklar ölçekli değildir.

Perine fasyaları

Sınavda en çok sorulan yapılar

Fasya	Nerede / neye devam eder?	Önemi
Colles fasyası (fascia perinei superficialis, stratum membranosum)	Karında Scarpa, scrotum'da tunica dartos ile devamlı; yanda rami ischiopubici'ye, arkada membrana perinei'nin arka kenarına yapışır	Spatium perinei superficiale'nin alt sınırı; idrar ekstravazasyon yolu
Fascia perinei (Gallaudet fasyası)	Yüzeyel perine kaslarını (m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus, m. transversus perinei superf.) saran fasya; penisde Buck fasyası ile devam eder	Kasları sarar
Membrana perinei	Arcus pubicus'u kapatan üçgen fibröz levha; urethra (kadında + vagina) deler	Yüzeyel ve derin aralığı ayırır; penis/clitoris kökü buraya oturur

Eski kitaplardaki 'diaphragma urogenitale' terimi artık kullanılmıyor: yerine membrana perinei ve spatium perinei profundum denir.

Colles fasyasının devamlılığı – idrar ekstravazasyonu

ŞEMA

REGIO UROGENITALIS



- Bulbar urethra yırtılırsa idrar Colles fasyası altında yayılır: perine, scrotum, penis ve karın ön duvarı şişer.
- Uyluğa ve anal bölgeye geçmez, çünkü Colles fasyası fascia lata'ya ve membrana perinei'nin arka kenarına yapışıktır.

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir).


Spatium perinei superficiale ve profundum

	Spatium perinei superficiale	Spatium perinei profundum
Sınırlar	Colles fasyası ile membrana perinei arası	Membrana perinei'nin üstü (diaphragma pelvis'e kadar)
Erkek	Crura penis, bulbus penis; m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus, m. transversus perinei superf.	Pars membranacea urethrae; m. sphincter urethrae externus; m. transversus perinei prof.; gl. bulbourethralis (Cowper)
Kadın	Crura clitoridis, bulbi vestibuli, gl. vestibularis major (Bartholin); aynı üç kas	Urethra, vaginanın alt kısmı; m. sphincter urethrae externus, m. compressor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis

Akılda tut: Cowper bezi DERİN aralıkta, Bartholin bezi YÜZEYEL aralıktadır.

Perine kasları – erkek ve kadın

Aşağıdan (litotomi) bakış



OpenStax A&P, Şekil 11.13 'Perine kasları' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)


OpenStax College. Anatomy & Physiology. OpenStax CNX, 2013 (1. baskı), Şekil 11.13 'Perine kasları'. Lisans: CC BY (openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology). Uyarlama: İngilizce etiketler Latinceye çevrildi.

Perine kasları

Hepsini n. pudendus (n. perinealis) innerve eder

Kas	Yeri	Görevi
M. ischiocavernosus	Crus penis / clitoridis üzerinde	Ereksiyonun sürdürülmesi
M. bulbospongiosus	Bulbus penis / bulbus vestibuli üzerinde	Erkekte ejakülasyon ve idrar boşaltma; kadında vestibulumu daraltır
M. transversus perinei superficialis	Tuber ischiadicum → corpus perineale	Corpus perineale'yi sabitler
M. transversus perinei profundus	Derin aralıkta	Corpus perineale'yi sabitler
M. sphincter urethrae externus	Urethra çevresinde (derin aralık)	İstemli idrar tutma
M. sphincter ani externus	Anüs çevresinde (regio analis)	İstemli gaita tutma

Erkek: urethra ve perine ilişkisi




OpenStax A&P, Şekil 27.2c 'Erkek üreme sistemi – lateral görünüm' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

• Urethra: pars prostatica → pars membranacea (derin aralık; m. sphincter urethrae externus; kateterde en dar ve en kolay yaralanan kısım) → pars spongiosa (bulbus ve corpus spongiosum içinde).
• Gl. bulbourethralis (Cowper) derin aralıkta pars membranacea'nın yanında; penis kökü (bulbus ve crura) yüzeyel aralıkta.

OpenStax College. Anatomy & Physiology. OpenStax CNX, 2013 (1. baskı), Şekil 27.2c 'Erkek üreme sistemi – lateral görünüm'. Lisans: CC BY (openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology). Uyarlama: İngilizce etiketler Latinceye çevrildi.

Kadın: pelvis organları ve perine

Sagittal kesit çizimi




OpenStax A&P, Şekil 25.17a 'Kadın üretrası' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

- Önden arkaya: vesica urinaria / urethra → vagina → rectum / canalis analis.
- Kadın urethrası kısadır (≈4 cm) → idrar yolu enfeksiyonu daha sık.
- Vagina ile anüs arasında corpus perineale.

OpenStax College. Anatomy & Physiology. OpenStax CNX, 2013 (1. baskı), Şekil 25.17a 'Kadın üretrası'. Lisans: CC BY (openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology). Uyarlama: İngilizce etiketler Latinceye çevrildi.

Vulva ve yüzeyel aralık



OpenStax A&P, Şekil 27.11 'Vulva' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

- Glans, corpus ve crura clitoridis; crura m. ischiocavernosus ile örtülüdür.
- Bulbus vestibuli ostium vaginae'nin iki yanında, m. bulbospongiosus altında.
- Gl. vestibularis major (Bartholin) bulbusun arka ucunda; kanalı ostium vaginae'nin arka-yanına açılır.

OpenStax College. Anatomy & Physiology. OpenStax CNX, 2013 (1. baskı), Şekil 27.11 'Vulva'. Lisans: CC BY (openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology). Uyarlama: İngilizce etiketler Latinceye çevrildi.

Kadavrada erkek regio urogenitalis

Sol: yüzeyel aralık kasları · Sağ: kaslar kaldırılınca membrana perinei

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS




Fig. 1 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)




Fig. 1 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

- Atlas çiziminde gördüğünüz kaslar kadavrada: m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus, m. transversus perinei superficialis.
- Bu kaslar kaldırılınca membrana perinei görülür; bulbus penis bu levhanın alt yüzüne oturur.

Muro S., Chang L., Tharnmanularp S. et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Sci Rep. 2025 Jul 3;15:23730. doi: 10.1038/s41598-025-09585-9 PMCID: PMC12229694. Lisans: CC BY.

Kadavrada clitoris ve bulbus vestibuli

Kadın perinesi, yüzeyel aralık açılmış

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS




Figure 4 – Garner D. K. ve ark., 2021 (PMC7913006, CC BY)

- Clitoris'in glans, corpus ve crura'sı; bulbus vestibuli m. bulbospongiosus'un altında.
- Arkada m. transversus perinei superficialis.

Garner D. K., Patel A. B., Hung J. et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics (Basel). 2021 Feb 2;11(2):221. doi: 10.3390/diagnostics11020221 PMCID: PMC7913006. Lisans: CC BY.

Klinik bağlantılar – regio urogenitalis


- Urethra rüptürü (bulbar): idrar Colles fasyası altında yayılır → perine, scrotum, penis ve karın ön duvarı şişer; uyluğa geçmez.
- Bartholin kisti / apsesi: gl. vestibularis major kanalının tıkanması; ostium vaginae'nin arka-yanında şişlik.
- Fournier gangreni: perine fasyaları boyunca hızla yayılan nekrotizan enfeksiyon.
- Epizyotomi: doğumda perinenin kontrollü kesisi; mediolateral kesi anal sfinkteri korur.

BÖLÜM 4

Regio analis

Fossa ischioanalis ve anal sfinkterler

- Fossa ischioanalis
- Canalis analis
- M. sphincter ani externus



Baramee P. ve ark., 2019 (PMC6942605, CC BY)

Fossa ischioanalis

Anüsün iki yanında, yağ dolu kama biçimli boşluk

	Yapı
Lateral duvar	M. obturatorius internus ve fasyası (canalis pudendalis burada)
Medial duvar	M. levator ani ve m. sphincter ani externus
Arka	Lig. sacrotuberale ve m. gluteus maximus
Ön	Membrana perinei'nin arka kenarı (üstünden recessus anterior öne uzanır)
İçerik	Yağ dokusu; n. / a. / v. rectalis inferior; canalis pudendalis içinde n. pudendus ve vasa pudenda interna
Klinik	İki taraf anüsün arkasından birbiriyle bağlantılı → at nalı apse; iskioanal apse

Kadavrada fossa ischioanalis

Kadın perinesi, aşağıdan bakış

KADAVRA

REGIO ANALIS




Fig. 2 – Baramee P. ve ark., 2019 (PMC6942605, CC BY)

- Anüsün yanındaki sarı yağ dokusu fossa ischioanalis'i doldurur; önünde ürogenital kaslar görülür.

Baramee P., Muro S., Suriyut J. et al. Three muscle slings of the pelvic floor in women: an anatomic study. Anat Sci Int. 2019 Jun 4;95(1):47–53. doi: 10.1007/s12565-019-00492-4 PMCID: PMC6942605. Lisans: CC BY.

Canalis analis ve m. sphincter ani externus


- M. sphincter ani externus: çizgili kas, istemli; pars subcutanea, superficialis, profunda. İnnervasyon: n. rectalis inferior (n. pudendus).
- M. sphincter ani internus: düz kas, istemsiz (otonom).
- M. puborectalis anorektal bileşkeyi öne çeker → angulus anorectalis (kontinans).
- Lig. anococcygeum: anüs ile os coccygis arasında.
- Linea pectinata: üstü visseral (ağrısız; iç hemoroid), altı somatik (ağrılı; dış hemoroid).

BÖLÜM 5

Damar – sinir

N. pudendus, a. pudenda interna, lenfatik drenaj

- Seyir ve dallar
- Pudendal blok
- Lenfatik drenaj




OpenStax A&P, Şekil 8.14 'Pelvis bağları' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

N. pudendus ve a. pudenda interna

ŞEMA

DAMAR – SİNİR



- Yol: pelvis → foramen ischiadicum majus → spina ischiadica / lig. sacrospinale arkası → foramen ischiadicum minus → canalis pudendalis (Alcock) → perine.
- Venler arterlere eşlik eder; v. dorsalis penis profunda ise pelvis içindeki venöz pleksusa açılır.

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir).

N. pudendus dallarının perinedeki dağılımı

Kadın perinesi, litotomi görünümü (yazar çizimi)

İLLÜSTRASYON

DAMAR – SİNİR




Figure 3 – Garner D. K. ve ark., 2021 (PMC7913006, CC BY)

- N. rectalis inferior → m. sphincter ani externus ve anüs çevresi derisi.
- N. perinealis → perine kasları ve labia/scrotum derisi; n. dorsalis clitoridis/penis → clitoris/penis duyusu.

Garner D. K., Patel A. B., Hung J. et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics (Basel). 2021 Feb 2;11(2):221. doi: 10.3390/diagnostics11020221 PMCID: PMC7913006. Lisans: CC BY.

Kadavrada n. pudendus ve a. pudenda interna

Pelvis içinden medial bakış

KADAVRA

DAMAR – SİNİR




Figure 1 – Goidescu O. C. ve ark., 2021 (PMC8713160, CC BY-NC-ND)

- N. pudendus lig. sacrospinale hizasında a. pudenda interna'nın medialinde seyreder (pudendal blokta bu ilişki kullanılır).

Lisans: CC BY-NC-ND – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı; görsel değiştirilmeden (kırpılmadan) kullanılmıştır.

Goidescu O. C., Enyedi M., Tulin A. D. et al. Overview of the anatomical basis of the piriformis syndrome-dissection with magnetic resonance correlation. Exp Ther Med. 2021 Dec 3;23(2):113. doi: 10.3892/etm.2021.11036 PMCID: PMC8713160. Lisans: CC BY-NC-ND.

Klinik: pudendal blok ve lenfatik drenaj


- Pudendal blok: doğumda perine anestezisi; vajinal yoldan spina ischiadica palpe edilip hemen medial-arkasına enjeksiyon.
- Pudendal nöralji: uzun süre oturma, bisiklet; canalis pudendalis'te sıkışma → oturunca artan perine ağrısı.
- Lenfatik drenaj: perine derisi, scrotum / labia, anüsün alt kısmı → nodi inguinales superficiales.
- Derin yapılar (urethra, prostat, vagina üst kısmı) → nodi iliaci interni; testis → paraaortik (lomber) nodlar.

BÖLÜM 6

Klinik – özet

Varyasyonlar, özet, kendini değerlendir

- Sık varyasyonlar
- Özet
- Sorular



OpenStax A&P, Şekil 25.17a 'Kadın üretrası' (CC BY; etiketler Latinceleştirildi)

Sık görülen varyasyonlar (kısa)

Varyasyon	Sıklık / bulgu	Neden önemli?
N. pudendus'un birden fazla gövdeyle seyretmesi	52 hemipelviste tek gövde %51,9; iki veya üç gövde geri kalanında (Ranjan ve ark. 2022)	Pudendal blok eksik kalabilir
N. rectalis inferior'un doğrudan plexus sacralis'ten çıkması	Olgu sunumları (ör. S3'ten; Dupont ve ark. 2019)	Blokta anal bölge uyuşmayabilir
A. pudenda accessoria (pelvis içinden penise giden arter)	Olgu sunumları (Nayak ve ark. 2014)	Prostat cerrahisinde yaralanırsa erektil disfonksiyon

Kaynaklar kaynakçada (PMC açık erişim).

Özet

- Perine = diaphragma pelvis'in altı; sınırı = apertura pelvis inferior.
- Tuber ischiadicum'lar arası çizgi → regio urogenitalis (önde) + regio analis (arkada).
- Fasyalar: Colles (Scarpa ve dartos ile devamlı) → fascia perinei → membrana perinei.
- Yüzeyel aralık: penis/clitoris kökü, bulbus, Bartholin; derin aralık: m. sphincter urethrae externus, Cowper.
- Bulbar urethra rüptüründe idrar Colles altında karın duvarına yayılır, uyluğa geçmez.
- N. pudendus (S2–S4): foramen ischiadicum majus → minus → Alcock kanalı; dalları: n. rectalis inferior, n. perinealis, n. dorsalis penis/clitoridis.

Kendini değerlendir

SORU

KLİNİK – ÖZET

- 1. Perineyi ön ve arka üçgene ayıran çizgi hangi iki noktayı birleştirir?
- 2. Gl. bulbourethralis ve gl. vestibularis major hangi aralıklarda bulunur?
- 3. Bulbar urethra rüptüründe idrar neden uyluğa yayılmaz?
- 4. N. pudendus perineye hangi açıklıktan girer ve hangi kanalda seyreder?
- 5. Fossa ischioanalis'in medial ve lateral duvarlarını sayınız.
- 6. Corpus perineale'ye tutunan kaslardan üçünü sayınız.

Kaynakça ve görsel lisansları (1)

LİTERATÜR

• OpenStax College. Anatomy & Physiology. OpenStax CNX 2013 (1. baskı), CC BY – atlas çizimleri: Şekil 8.12 'Pelvis'; Şekil 8.13 'Kadın ve erkek pelvisi'; Şekil 8.14 'Pelvis bağları'; Şekil 11.12 'Pelvis tabanı kasları'; Şekil 11.13 'Perine kasları'; Şekil 27.2c 'Erkek üreme sistemi – lateral görünüm'; Şekil 25.17a 'Kadın üretrası'; Şekil 27.11 'Vulva'. İngilizce etiketler bu projede Latince (TA) karşılıklarıyla değiştirildi.

• Muro S., Tsukada Y., Ito M. et al. The series of smooth muscle structures in the pelvic floors of men: Dynamic coordination of smooth and skeletal muscles. Clinical Anatomy (New York, N.y.) 2020. doi:10.1002/ca.23713 – PMC7898478 – CC BY-NC-ND

• Muro S., Chang L., Tharnmanularp S. et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Scientific Reports 2025. doi:10.1038/s41598-025-09585-9 – PMC12229694 – CC BY

• Garner D. K., Patel A. B., Hung J. et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics 2021. doi:10.3390/diagnostics11020221 – PMC7913006 – CC BY

• Baramee P., Muro S., Suriyut J. et al. Three muscle slings of the pelvic floor in women: an anatomic study. Anatomical Science International 2019. doi:10.1007/s12565-019-00492-4 – PMC6942605 – CC BY

• Goidescu O. C., Enyedi M., Tulin A. D. et al. Overview of the anatomical basis of the piriformis syndrome-dissection with magnetic resonance correlation. Experimental and Therapeutic Medicine 2021. doi:10.3892/etm.2021.11036 – PMC8713160 – CC BY-NC-ND

• Ranjan R., Chanda C., Kushwaha R. et al. Anatomical Study of the Variants of the Extrapelvic Part of the Pudendal Nerve. Cureus 2022. doi:10.7759/cureus.28281 – PMC9492552 – CC BY

• Dupont G., Iwanaga J., Oskouian R. J. et al. Report of an inferior rectal nerve variant arising from the S3 ventral ramus. Anatomy & Cell Biology 2019. doi:10.5115/acb.2019.52.1.100 – PMC6449584 – CC BY-NC

• Nayak S. B., Kumar N., Patil J. et al. A Rare Variation in the Origin and Course of the Artery of Penis. Case Reports in Vascular Medicine 2014. doi:10.1155/2014/193194 – PMC3971847 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (2)

LİTERATÜR

- Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy, 9. baskı. Wolters Kluwer 2023 – Pelvis ve Perine.
- Standring S (ed.). Gray's Anatomy, 42. baskı. Elsevier 2021 – Perineum.
- Federative International Programme for Anatomical Terminology (FIPAT). Terminologia Anatomica, 2. baskı, 2019.
- Mirilas P, Skandalakis JE. Urogenital diaphragm: an erroneous concept. J Am Coll Surg 2004;198:279–290.

PMC görselleri AWS PMC Open Access deposundan (pmc-oa-opendata) indirilmiştir; lisans, md5 ve özgün altyazılar sources/perine_*.json içinde.