

Any of the form $a_0 x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n y = F(x)$ is called Cauchy-Euler Equation. put $x = e^t$, $t = \ln x$.

Ex 10.4.

Question ①

$$(x^2 D^2 + 7x D + 5)y = x^5 \quad \text{--- (1)}$$

Sol.

$$\text{Let } x = e^t, \quad t = \ln x.$$

$$xD = \Delta$$

$$x^2 D^2 = \Delta(\Delta - 1)$$

put in eq (1)

$$(\Delta(\Delta - 1) + 7\Delta + 5)y = e^{5t}$$

$$(\Delta^2 - \Delta + 7\Delta + 5)y = e^{5t}$$

$$(\Delta^2 + 6\Delta + 5)y = e^{5t} \quad \text{--- (2)}$$

The C.E is

$$\Delta^2 + 6\Delta + 5 = 0$$

$$\Delta^2 + 5\Delta + \Delta + 5 = 0$$

$$\Delta(\Delta + 5) + 1(\Delta + 5) = 0$$

$$(\Delta + 1)(\Delta + 5) = 0$$

$$\Delta + 1 = 0 \Rightarrow \Delta = -1$$

$$\Delta + 5 = 0 \Rightarrow \Delta = -5$$

$$y_c = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-5t}$$

$$y_p = \frac{1}{\Delta^2 + 6\Delta + 5} e^{5t}$$

$$= \frac{1}{(5)^2 + 6(5) + 5} e^{5t}$$

$$= \frac{1}{60} e^{5t}$$

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-5t} + \frac{5t}{60} \quad \text{--- (3)}$$

Replacing t by $\ln x$

$$y_1 = C_1 e^{-\ln x} + C_2 e^{-5 \ln x} + \frac{5 \ln x}{60}$$

$$= \cancel{C_1} e^{-x} + \cancel{C_2} e^{5x} y \Rightarrow C_1 x^{-1} + C_2 x^{-5} + \frac{5}{60} x$$

Question (2)

$$(x^2 D^2 - 3x D + 5)y = x^2 \sin(\ln x) \quad \text{--- (1)}$$

Sol let $x = e^t$, $t = \ln x$.

$$xD = D$$

$$x^2 D^2 = D(D-1)$$

$$(\Delta(\Delta-1) - 3\Delta + 5)y = e^{2t} \sin t$$

$$(\Delta^2 - 4\Delta + 5)y = e^{2t} \sin t \quad \text{--- (2)}$$

The C.F. is

$$\Delta^2 - 4\Delta + 5 = 0$$

$$\Delta \neq 1 \& \Delta \quad a=1, b=-4, c=5$$

$$\Delta = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2}$$

$$= \frac{4 \pm 2i}{2}$$

$$= 2 \pm i$$

$$y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-5t} + \frac{5t}{60} \quad \text{--- (3)}$$

Replacing t by $\ln x$

$$y_1 = c_1 e^{-\ln x} + c_2 e^{-5 \ln x} + \frac{5 \ln x}{60}$$

$$= c_1 e^{-x} + c_2 e^{-5x} \Rightarrow c_1 x^{-1} + c_2 x^{-5} + \frac{5}{60} \ln x$$

Question (2)

$$(x^2 D^2 - 3x D + 5)y = x^2 \sin(\ln x) \quad \text{--- (1)}$$

Sol let $x = e^t$, $t = \ln x$.

$$x D = D$$

$$x^2 D^2 = D(D-1)$$

$$(\Delta(\Delta-1) - 3\Delta + 5)y = e^{2t} \sin t$$

$$(\Delta^2 - 4\Delta + 5)y = e^{2t} \sin t \quad \text{--- (2)}$$

The C.F. is

$$\Delta^2 - 4\Delta + 5 = 0$$

$$\Delta \neq 1 \text{ \& } \Delta \quad a=1, b=-4, c=5$$

$$\Delta = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2}$$

$$= \frac{4 \pm 2i}{2}$$

$$= 2 \pm i$$

$$y_c = e^{2t} (c_1 \cos t + c_2 \sin t)$$

$$y_p = \frac{e^{2t} \sin t}{\Delta^2 - 4\Delta + 5} \cdot e^{2t} \sin t$$

$$= e^{2t} \frac{\sin t}{(\Delta+2)^2 - 4(\Delta+2) + 5} \quad \text{Lit by exponential shift}$$

$$= e^{2t} \frac{\sin t}{\Delta^2 + 4\Delta + 4 - 4\Delta - 8 + 5}$$

$$= e^{2t} \frac{\sin t}{\Delta^2 + 1}$$

$$= e^{2t} \frac{\operatorname{Im} e^{it}}{(\Delta+i)(\Delta-i)}$$

$$= -\frac{e^{2t}}{2} \operatorname{Im} it (\cos t + i \sin t)$$

$$= -\frac{t}{2} e^{2t} \cos t$$

Gr. S is

$$y = y_c + y_p$$

$$= e^{2t} (c_1 \cos t + c_2 \sin t) - \frac{t}{2} e^{2t} \cos t$$

$$\left[x^2 D^2 - (2m-1)x D + (m^2+n^2) \right] y = n^2 x^m \cdot \ln x. \quad \text{--- (1)}$$

Sol.

$$x = e^t, \quad t = \ln x.$$

$$x D = \Delta$$

$$x^2 D^2 = \Delta(\Delta-1) = \Delta^2 - \Delta.$$

Put in (1)

$$\left[\Delta^2 - \Delta - (2m-1)\Delta + (m^2+n^2) \right] y = n^2 t e^{mt}$$

$$\left[\Delta^2 - 2m\Delta + (m^2+n^2) \right] y = n^2 t e^{mt} \quad \text{--- (2)}$$

The C.E is

$$\Delta^2 - 2m\Delta + (m^2+n^2) = 0$$

$$\Delta = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Delta = \frac{2m \pm \sqrt{4m^2 - 4m^2 - 4n^2}}{2}$$

$$= \frac{2m \pm 2ni}{2}$$

$$= m \pm ni$$

$$y_c = (C_1 \cos nt + C_2 \sin nt) e^{mt}$$

$$y_p = \frac{n^2 t e^{mt}}{\Delta^2 - 2m\Delta + m^2 + n^2}$$

$$y_p = \frac{1}{\Delta^2 - 2m\Delta + m^2 + n^2} n^2 t e^{mt}$$

By Exp shift:

$$y_p = n^2 e^{mt} \frac{1}{(\Delta+m)^2 - 2m(\Delta+m) + m^2 + n^2} t$$

$$= n^2 e^{mt} \frac{1}{\cancel{\Delta^2 + 2\Delta m + m^2} - 2m\Delta - 2m^2 + m^2 + n^2} t$$

$$= n^2 e^{mt} \frac{1}{\Delta^2 + n^2} t$$

$$= \frac{n^2 e^{mt}}{n^2} \left[\frac{1}{\left(1 + \frac{\Delta^2}{n^2}\right)} \right] t$$

$$= e^{mt} \left[1 + \frac{\Delta^2}{n^2} \right]^{-1} t$$

$$= e^{mt} \left[1 - \frac{\Delta^2}{n^2} \right] t$$

$$= e^{mt} [t - 0] = t e^{mt}$$

$$y_p = t e^{mt}$$

$$y = y_c + y_p$$

Question 9) $(4x^2 D^2 - 4xD + 3)y = \sin \ln(-x)$

Sol:

Let $-x = e^t$

$t = \ln(-x)$

$x D = \Delta$

$x^2 D^2 = \Delta(\Delta-1) = \Delta^2 - \Delta$

$(4(\Delta^2 - \Delta) - 4\Delta + 3)y = \sin t$

$(4\Delta^2 - 4\Delta - 4\Delta + 3)y = \sin t$

$(4\Delta^2 - 8\Delta + 3)y = \sin t$

The C. Eq is

$4\Delta^2 - 8\Delta + 3 = 0$

$4\Delta^2 - 6\Delta - 2\Delta + 3 = 0$

$2\Delta(2\Delta - 3) - 1(2\Delta - 3) = 0$

$(2\Delta - 1)(2\Delta - 3) = 0$

$2\Delta - 1 = 0 \quad | \quad 2\Delta - 3 = 0$

$\Delta = \frac{1}{2} \quad | \quad \Delta = \frac{3}{2}$

$y_c = C_1 e^{3t/2} + C_2 e^{t/2}$

$y_p = \frac{\sin t}{4\Delta^2 - 8\Delta + 3}$

$= \frac{\text{Im } e^{it}}{4\Delta^2 - 8\Delta + 3}$

$= \text{Im } \frac{e^{it}}{4(i^2) - 8i + 3}$

$$= \operatorname{Im} \frac{e^{it}}{-4-8i+3}$$

$$= \operatorname{Im} \frac{e^{it}}{-1-8i}$$

$$= \operatorname{Im} \frac{e^{it}}{-(1+8i)}$$

$$= \operatorname{Im} \frac{e^{it} (1-8i)}{-(1+8i)(1-8i)}$$

$$= \operatorname{Im} \frac{e^{it} (1-8i)}{-(1+64)} \Rightarrow -\frac{1}{65} \operatorname{Im} e^{it} (1-8i)$$

$$= -\frac{1}{65} \operatorname{Im} (\cos t + i \sin t) (1-8i)$$

$$= -\frac{1}{65} \operatorname{Im} (\cos t + i \sin t - 8i \cos t + 8 \sin t)$$

$$y_p = -\frac{1}{65} (\sin t - 8 \cos t)$$

The General Sol.

$$y = y_h + y_p$$

$$= c_1 e^{3t/2} + c_2 e^{t/2} - \frac{1}{65} (\sin t - 8 \cos t)$$

Question 5

Sol :-

$$(x^3 D^3 + 2x^2 D^2 + 2) y = 10x + \frac{10}{x}$$

$$\text{Let } x = e^t$$

$$t = \ln x$$

$$x D = \Delta$$

$$x^2 D^2 = \Delta(\Delta-1) = \Delta^2 - \Delta$$

$$x^3 D^3 = \Delta(\Delta-1)(\Delta-2) = \Delta^3 - 3\Delta^2 + 2\Delta$$

$$(\Delta^3 - 3\Delta^2 + 2\Delta + 2\Delta^2 - 2\Delta + 2) y = 10e^t + 10e^{-t}$$

$$(\Delta^3 - \Delta^2 + 2) y = 10e^t + 10e^{-t}$$

The C.E is

$$\Delta^3 - \Delta^2 + 2 = 0$$

$$\Delta^3 - 2\Delta^2 = 0$$

$$\Delta - 1 = 0 \Rightarrow \Delta = 1$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 2 & & \\ & -1 & 2 & -2 & & \\ & 1 & -2 & 2 & 0 & \end{array}$$

$$\Delta^2 - 2\Delta + 2 = 0$$

$$\Delta = 1, b = -2, c = 2$$

$$\Delta = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2}$$

$$= \frac{2 \pm 2i}{2}$$

$$= 1 \pm i$$

$$\Delta = -1, 1 \pm i$$

$$y_c = c_1 e^{-t} + (c_2 \cos t + c_3 \sin t) e^t$$

$$y_p = \frac{1}{(\Delta+1)(\Delta^2-2\Delta+2)} 10e^t + 10e^{-t}$$

$$= \frac{1}{(\Delta+1)(\Delta^2-2\Delta+2)} 10e^t + \frac{1}{(\Delta+1)(\Delta^2-2\Delta+2)} 10e^{-t}$$

$$= \frac{10e^t}{(1+1)(1-2+2)} + \frac{1}{\cancel{(\Delta+1)}(\Delta^2-2\Delta+2)} 10e^{-t}$$

$$= 5e^t + \frac{10te^{-t}}{(-1+2\Delta+2)}$$

$$= 5e^t + \frac{5te^{-t}}{\cancel{(\Delta+1)}}$$

$$y = y_c + y_p$$

$$= c_1 e^{-t} + (c_2 \cos t + c_3 \sin t) e^t + 5e^t + 5te^{-t}$$

Question 6: $(x^4 D^3 + 2x^3 D^2 - x^2 D + 1)y = 1$

Sol:

$$x(x^3 D^3 + 2x^2 D^2 - x D + 1)y = 1$$

$$(x^3 D^3 + 2x^2 D^2 - x D + 1)y = \frac{1}{x}$$

$$x = e^t$$

$$t = \ln x$$

$$xD = \Delta$$

$$x^2 D^2 = \Delta(\Delta - 1) = \Delta^2 - \Delta$$

$$x^3 D^3 = \Delta(\Delta - 1)(\Delta - 2) = \Delta^3 - 3\Delta^2 + 2\Delta$$

$$(\Delta^3 - 3\Delta^2 + 2\Delta + 2\Delta^2 - 2\Delta - \Delta + 1)y = e^{-t}$$

$$(\Delta^3 - \Delta^2 - \Delta + 1)y = e^{-t}$$

The C.F. is

$$\Delta^3 - \Delta^2 - \Delta + 1 = 0$$

$$D+1=0 \Rightarrow D=-1$$

1	-1	-1	1
-1	-1	2	-1
1	-2	1	0

$$\Delta^2 - 2\Delta + 1 = 0$$

$$(\Delta - 1)^2 = 0$$

$$\Delta = 1, 1$$

$$y_c = c_1 e^{-t} + (c_2 + c_3 t) e^t$$

$$\begin{aligned}
 y_p &= \frac{1}{(\Delta+1)(\Delta^2-2\Delta+1)} e^{-t} \\
 &= \frac{1}{(\Delta+1)(\Delta-1)^2} e^{-t} \\
 &= \frac{t e^{-t}}{1+2+1} \\
 &= \frac{t e^{-t}}{4}
 \end{aligned}$$

$$y = y_c + y_p$$

$$y = c_1 e^t + (c_2 + c_3 t) e^t + \frac{t e^{-t}}{4}$$

$$= c_1 x^1 + x (c_2 + c_3 \ln x) + \frac{x^{-1}}{4} \ln x.$$

Question (7)

$$(x^3 D^3 + 2x^2 D^2 - 5x D - 15)y = x^4 \quad \text{--- (1)}$$

Sol:- $x = e^t, \quad t = \ln x.$

$$x D = \Delta$$

$$x^2 D^2 = \Delta(\Delta-1) = \Delta^2 - \Delta$$

$$x^3 D^3 = \Delta^3 - 3\Delta^2 + 2\Delta$$

put in (1)

$$(\Delta^3 - 3\Delta^2 + 2\Delta + 4\Delta^2 - 4\Delta - 5\Delta - 15)y = e^{4t}$$

$$(\Delta^3 + \Delta^2 - 7\Delta - 15)y = e^{4t}$$

The C.F. is

$$\Delta^3 + \Delta^2 - 7\Delta - 15 = 0$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & 1 & -7 & -15 \\ & & 3 & 12 & 15 \\ \hline & 1 & 4 & 5 & 0 \end{array}$$

$$\Delta - 3 = 0 \Rightarrow \Delta = 3$$

$$\Delta^2 + 4\Delta + 5 = 0$$

$$\Delta^2 + 4\Delta + 5 = 0 \quad a = 1, b = 4, c = 5$$

$$\Delta = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2}$$

$$= \frac{-4 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$= \frac{-4 \pm 2i}{2} \Rightarrow -2 \pm i$$

$$y_c = C_1 e^{3t} + e^{-2t} (C_2 \cos t + C_3 \sin t)$$

$$y_p = \frac{1}{\Delta^3 + \Delta^2 - 7\Delta - 15} e^{4t}$$

$$= \frac{1}{64 + 16 - 28 - 15} e^{4t}$$

$$= \frac{1}{27} e^{4t}$$

$$\begin{array}{r} 64 \\ 16 \\ \hline 80 \\ 15 \\ \hline 65 \\ 28 \\ \hline 93 \end{array}$$

$$y_p = \frac{e^{4t}}{37}$$

$$y = y_c + y_p$$

$$y = C_1 e^{3t} + e^{-2t} (C_2 \cos t + C_3 \sin t) + \frac{e^{4t}}{37}$$

Question.

$$(x^2 D^2 + 2xD - 6)y = 10x^2$$

$$y(1) = 1$$

$$y'(1) = 6$$

Sol. $x = e^t$ or $t = \ln x$.

$$xD = \Delta$$

$$x^2 D^2 = \Delta(\Delta - 1) = \Delta^2 - \Delta$$

$$(\Delta^2 - \Delta + 2\Delta - 6)y = 10e^{2t}$$

$$(\Delta^2 + \Delta - 6)y = 10e^{2t}$$

The C.F. is

$$\Delta^2 + \Delta - 6 = 0$$

$$\Delta^2 + 3\Delta - 2\Delta - 6 = 0$$

$$\Delta(\Delta + 3) - 2(\Delta + 3) = 0$$

$$(\Delta - 2)(\Delta + 3) = 0$$

$$\Delta - 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 2$$

$$\Delta + 3 = 0 \Rightarrow \Delta = -3$$

$$y_c = C_1 e^{2t} + C_3 e^{-3t}$$

$$\begin{aligned}
 y_p &= \frac{1}{\Delta^2 + \Delta - 6} 10 e^{2t} \\
 &= \frac{10}{(\Delta+3)(\Delta-2)} e^{2t} \\
 &= \frac{20t}{(8)} e^{2t} \\
 &= 2te^{2t}
 \end{aligned}$$

$$y = y_c + y_p$$

$$y = C_1 e^{2t} + C_3 e^{-3t} + 2te^{2t}$$

$$y = C_1 x^{-3} + C_2 x^2 + 2x^2 \ln x$$

$$y' = -3C_1 x^{-4} + 2C_2 x + 4x \ln x + 2x$$

$$y(1) = 1$$

$$C_1 + C_2 = 1 \quad \text{--- (1)}$$

$$y'(1) = -6$$

$$-3C_1 + 2C_2 + 2 = -6 \quad \text{--- (2)}$$

$$-3C_1 + 2C_2 = -8 \quad \text{--- (2')}$$

sol + get

$$(C_2 = -1) \quad | \quad (C_1 = 2)$$

$$y = 2x^{-3} - x^2 + 2x^2 \ln x$$