수능특강 · 수능완성 약술형 논술 · 학생별 대학 맞춤 5회 과정

김현석 약술 논술 임홍석

제 1 회 | 학생용 문제지

가천대 변형

시험 시간	40분	**문항 수**	2문항
출제 범위	문법 · 독서	**배점**	20점
성명		**학번**	

영역	문항 번호	문항 수	배점
문법	1번	1문항	10점
독서	2번	1문항	10점
합계	**1 ~ 2번**	**2문항**	**20점**

출제 형식	문항 번호	문항 수	배점
가천대 변형	1번, 2번	2문항	20점

답안 작성 시 유의 사항

1. 답안은 검은색 필기구로 작성하며, 연필로 작성한 답안은 채점하지 않습니다.
2. 이 회차는 임홍석 학생의 지원 대학(가천대) 약술형 논술 대비 맞춤 회차입니다. 문항마다 10점이며, 문항 머리의 '○○대 변형' 배지가 채점 방식을 알려 줍니다.
3. 제시문에서 찾아 쓰라는 문항은 제시문의 표현을 그대로 씁니다. 임의로 바꾸어 쓰면 오답 처리됩니다.
4. 가천대 변형: ①·② 각 5점. 제시문의 표현을 그대로 옮겨 씁니다.

문 법 영 역

[1] 가천대 변형 문법 · 문법 · <보기> 빈칸 찾아 쓰기 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 언어와 매체, 60쪽 (형태소의 분류) · 24쪽 (어근과 어간) · 54쪽 (구개음화) | EBS 문항코드: 26004-0033 · 26004-0007 · 26004-0023 · 세 <보기> 지문을 이어 제시문으로 사용

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

형태소는 의미를 가진 말의 최소 단위이다. 형태소는 자립성의 유무에 따라 다른 형태소와 결합 하지 않고 홀로 쓰일 수 있는 자립 형태소, 다른 형태소와 결합해야만 쓰일 수 있는 의존 형태소로 구분할 수 있다. 또 의미의 성격에 따라 실질적 의미를 나타내는 실질 형태소와 문법적 의미를 나타내는 형식 형태소로 구분할 수 있다.

어근은 단어를 형성할 때 실질적인 의미를 나타내는 중심 부분이고, 어간은 용언이 활용을 할 때 형태가 변화하지 않는 부분이다. 예를 들어, '치솟다'의 어근은 '솟ㅡ'이고, 어간은 '치솟ㅡ'이다. '치ㅡ'는 어근 '솟ㅡ'에 결합하는 접사이고, 'ㅡ다'는 어간 '치솟ㅡ'과 결합하는 어미이다.

현대 국어의 구개음화는 'ㄷ, ㅌ'으로 끝나는 형태소가 모음 'ㅣ'나 반모음 'j'로 시작하는 형식 형태소와 결합할 때 'ㄷ, ㅌ'이 각각 'ㅈ, ㅊ'으로 바뀌는 현상을 말한다. 구개음화는 후행하는 말이 조사, 접미사 같은 형식 형태소일 때만 적용된다는 사실에 주의해야 하며, 표기에는 반영하지 않는다.

<보기>는 윗글을 바탕으로 '되돌리다'를 분석한 내용이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

'되돌리다'의 어근은 '돌-'이며, '되-'와 '-리-'는 어근 '돌-'에 결합하는 (①)이다. 한편 '되돌리다'가 '되돌리고, 되돌리니' 등으로 활용할 때 형태가 변화하지 않는 부분인 '되돌리-'는 '되돌리다'의 (②)이고, '-다'는 (②)에 결합하는 어미이다.

1번 답안 작성란	
①	5점
②	5점

독 서 영 역

[2] 가천대 변형 독서 · 과학 · <보기> 빈칸 찾아 쓰기 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 독서, 182쪽 (하디-바인베르크 평형 법칙) | EBS 문항코드: 26002-0172~0176 · <그림>과 수식 문단 생략

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

1908년, 영국의 수학자 조지 하디와 독일의 의사 빌헬름 바인베르크는 각각 독립적으로 멘델의 유전 법칙에 기초한 수학적 모델을 제시했다. 하디는 멘델의 유전 법칙이 실제 인구 집단에서도 성립하는지를 분석하기 위해, 집단 내의 두 대립 유전자 A와 a가 전체 유전자 풀*에서 차지하는 비율, 즉 대립 유전자 빈도를 각각 p와 q로 설정했다. 그 후 무작위 교배 시 다음 세대의 유전자형 빈도가 어떻게 나타나는지를 수학적으로 분석했다. 바인베르크는 인구 집단의 유전 형질 분포를 분석하여, 두 대립 유전자가 무작위로 결합하면 세대를 거쳐도 유전자의 구성 비율인 유전자 빈도가 일정하게 유지된다는 가설을 제시했다. 그는 다양한 자료 분석을 통해 유전 질환 발생 확률의 예측 가능성을 제시하고, 실제 통계와 비교하여 이론의 타당성을 확인했다. 이러한 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이 결합된 결과가 바로 '하디-바인베르크 평형 법칙'이다.

하디-바인베르크 평형은 다음의 조건이 모두 충족될 때 유지된다. 첫째, 집단의 크기가 충분히 커야 한다. 왜냐하면 작은 집단에서는 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성이 커지기 때문이다. 둘째, 교배는 무작위로 이루어져야 한다. 만약 무작위 교배가 아닌, 특정 유전자형끼리 선호하는 교배가 일어난다면 세대를 거치며 유전자형 빈도의 구성이 평형 상태와 달라지기 때문이다. 셋째, 새로운 돌연변이가 발생하지 않아야 한다. 만약 새로운 대립 유전자가 생겨난다면 기존의 유전자 빈도가 바뀔 수 있기 때문이다. 넷째, 외부 개체의 이입이나 기존 개체의 이출과 같은 이주가 없어야 한다. 이입은 외부 집단의 유전자를 도입하고, 이출은 집단 내부의 유전자를 소실시켜 양쪽 모두 집단 내 유전자 빈도에 변화를 초래할 수 있다. 마지막으로, 자연 선택이 작용하지 않아야 한다. 특정 유전자형이 생존이나 번식에서 더 유리하다면, 해당 유전자의 빈도가 세대를 거치며 점차 증가하게 되기 때문이다.

(중략)

하디-바인베르크 평형 법칙은 다양한 분야에서 활용된다. 예를 들어 유전 질환의 경우 특정 유전자가 두 개 모두 있을 때 질병이 나타나는 열성 유전병에 대해, 해당 유전자를 하나만 지닌 보인자*가 인구 중 얼마나 되는지를 추정할 수 있다. 이는 질병의 실제 환자 빈도와 함께 계산되어, 해당 유전자가 집단에 얼마나 퍼져 있는지를 예측하는 데 도움이 된다. 또한 보존 생물학에서는 멸종 위기에 처한 종의 개체군이 가지고 있는 유전자의 다양성을 분석하거나, 유전자의 구성이 변화하고 있는지를 판단하는 데에도 이 법칙이 사용된다. 가족 관계를 판단할 때에도 친자가 공유하는 유전자가 우연히 남에게서 나타날 확률을 하디-바인베르크 평형 법칙을 기반으로 계산하여, 친자 확률의 신뢰도를 높인다. 또 법의학 분야에서는 비록 실제 인구 집단이 하디-바인베르크 평형 조건을 완벽히 충족하지 않는다고 하더라도 대립 유전자의 빈도가 통계적으로 안정적이라면 이를 근거로 활용한다. 범죄 현장에서 수집된 DNA 샘플이 용의자의 DNA와 일치할 때, 이 일치가 우연에 의한 것일 확률을 계산하여 해당 DNA가 용의자의 것이 아닐 확률이 희박함을 입증하는 과학적 증거로 사용한다.

* 유전자 풀: 어떤 생물 집단이 가지고 있는 유전 정보의 총합. 즉 상호 교배가 가능한 집단 내의 모든 개체가 가진 대립 유전자를 통틀어 이르는 말.
* 보인자: 유전병이 겉으로 드러나지 아니하고 있지만 그 인자를 가지고 있는 사람.

<보기>는 윗글에 제시된 법칙의 활용에 대한 설명이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

열성 유전병의 보인자가 인구 중 얼마나 되는지 추정하는 일은 질병의 실제 (①)와/과 함께 계산되어 해당 유전자가 집단에 얼마나 퍼져 있는지를 예측하는 데 도움이 된다. 한편 법의학 분야에서는 실제 인구 집단이 평형 조건을 완벽히 충족하지 않더라도 대립 유전자의 빈도가 (②) 안정적이라면 이를 근거로 활용한다.

2번 답안 작성란

①	5점
②	5점