외부 자문 패킷 P-806-F1e — 토정 작괘: 「30일생 · 보는 해 그 달이 작은달」 처리

2026-10-17 · 라운드 1 / 상한 1 · 첨부 원문 쪽 이미지 2장(첨부 1·2) · 회신은 맨 끝 양식(JSON)으로

1. 배경 (필요한 만큼만)

토정비결 작괘(괘 만드는 법)를 1935년 활자본 원문 규칙대로 계산하는 프로그램을 만들고 있습니다. 현재 확정된 규칙은 다음과 같습니다(모두 **보는 해(當年)** 기준).

괘	계산	나머지 0일 때
상괘	(세는나이 + 보는 해 태세수) ÷ 8 의 나머지	8
중괘	(보는 해 같은 음력 생월이 큰달이면 30 · 작은달이면 29 + 그 달 월건수) ÷ 6 의 나머지	6
하괘	(음력 생일 숫자 + **보는 해 같은 음력 생일**의 일진수) ÷ 3 의 나머지	3

수표(태세수·월건수·일진수)는 60갑자 전부 확정되어 있습니다. 윤달생은 같은 숫자 평달로 봅니다(앱 결정).

> **문제 상황:** 음력 **30일**에 태어난 사람인데, **보는 해**의 같은 음력 달이 **작은달(29일까지)**이면, 하괘 계산에 필요한 「보는 해 같은 음력 생일(30일)」이 그 해에 존재하지 않아 일진을 정할 수 없습니다.
> 예: 음력 ○○○○년 2월 30일생 · 보는 해 2026년 → 2026년 음력 2월은 29일까지.
> 발생 비율: 전체 사용자·연도 조합의 약 0.8~1%. 현재 프로그램은 이 경우 괘를 내지 않고 「보류」로 표시합니다.

2. 첨부 원문에서 이 경우에 대한 기재 여부

첨부 1 = 1935년 活字本 첫 장(작괘법). 첨부 2 = 후대 해설본의 「괘 만드는 법(作卦法)」 쪽. 두 이미지 모두 직접 판독해 이 경우(30일생·작은달)에 대한 별도 규칙이 **있는지 없는지** 확인해 주십시오. 생일수는 「초하루면 1, 이틀이면 2, 나머지도 이와 같다」 정도로만 보입니다.

3. 선택지 (순서는 무작위 · 우열 없음)

기호	처리	하괘에 들어가는 값
A	생일 숫자 30 유지 + 그 달 마지막 날(29일)의 일진	30 + 29일 일진수
B	보류 — 괘를 내지 않고 「원문에 이 경우 규칙이 없어 산출 보류」 표시	—
C	생일을 29일로 간주(숫자도 29) + 29일 일진	29 + 29일 일진수
D	생일 숫자 30 유지 + 다음 달 초하루의 일진(30일이 있었다면 그 다음 날이 되는 날)	30 + 다음 달 1일 일진수
E	그 밖의 방법(구체적으로)	—

참고(계산 사실): A와 C는 하괘가 항상 다릅니다(30과 29는 3으로 나눈 나머지가 1 차이). A와 D는 60갑자 연속 날짜 60쌍 중 15쌍에서만 하괘가 같습니다. 즉 A·C·D 중 무엇을 고르느냐에 따라 대부분 다른 괘가 나옵니다.

4. 질문

Q1. 첨부 1·2에 이 경우(30일생·보는 해 그 달 작은달)에 대한 규칙이 기재되어 있습니까? (있음/없음 · 있으면 그 구절을 원문 그대로 · 위치)

Q2. 첨부 밖에서, **검증 가능한** 문헌 근거(서명·저자·판본/출판사·연도·쪽)가 있는 처리 관행을 알고 계십니까? 서지를 정확히 댈 수 없으면 「모름」으로 답해 주십시오. 기억에 의한 추정, 블로그·앱의 관행은 「출처 미확인 관행」으로 따로 적어 주십시오.

Q3. 프로그램이 따라야 할 처리를 A~E 중 하나 고르고, 근거와 확신도(high / mid / low)를 적어 주십시오. 원문 규칙이 없을 때 규칙을 만들어 넣는 것이 정직성 측면에서 문제인지도 함께 판단해 주십시오.

Q4. (A·C·D·E를 고른 경우) 화면에 사용자에게 어떤 고지를 해야 한다고 보십니까? 한 문장.

5. 사전 고정 판정 기준 (회신 보기 전에 고정)

1. 두 AI가 **같은 선택(A·C·D·E)**을 하고, **둘 다 Q2에 같은 검증 가능 서지**를 대고, 둘 다 확신도 high → 그 규칙을 「채택 후보」로 올리고, 서지를 실제로 확인한 뒤 제이가 최종 결정.
2. Q1에서 한쪽이라도 원문 기재 「있음」을 구절과 함께 답 → 그 구절을 원문 이미지에서 직접 대조(확인되면 그 규칙이 원문 규칙).
3. 그 밖(서지 없음 · 선택 갈림 · 확신도 mid/low · 출처 미확인 관행뿐) → 확정 없음. 라운드 2 없음 → 제이가 직접 결정.

6. 회신 양식

```
{
  "advisor": "Gemini 또는 ChatGPT",
  "Q1": {"stated": "있음|없음", "quote": "원문 구절 또는 null", "where": "첨부 1/2 위치 또는 null"},
  "Q2": {"sources": [{"title":"","author":"","publisher_or_edition":"","year":"","page":"","rule":""}],
         "unverified_practices": ["..."]},
  "Q3": {"choice": "A|B|C|D|E", "detail_if_E": null, "reason": "", "confidence": "high|mid|low",
         "honesty_note": ""},
  "Q4": "한 문장 또는 null"
}
```

十二朔運解釋

十八句土亭秘訣

先置年齒數하고再置當年太歲數하야八八除之後에以餘數로作上卦하고又置當年生月數호되月大則三十이오月小則二十九며再置生月月建數하야六六除之後에以餘數로作中卦하고次置生日數호되若初一日則一介오二日則二介니餘皆倣此며又置生日日辰數하야三三除之後에以餘數로作下卦하야以看品論하라

甲己 年丙寅頭 夜甲子時 갑괴 년병인두 야갑자시 丁壬 年壬寅頭 夜庚子時 정임 년임인두 야경자시

乙庚 年戊寅頭 夜丙子時 을경 년무인두 야병자시 戊癸 年甲寅頭 夜壬子時 무계 년갑인두 야일자시

丙辛 年庚寅頭 夜戊子時 병신 년경인두 야무자시

太歲 月建 日辰數合并 래세수 월건수 일진수합병

보는법 공식

나이수+태세수÷8=답 (남은 수) 상괘
낳은달수+월건수÷6=답 (남은 수) 중괘
그해생일수+일진수÷3=답 (남은 수) 하괘

괘만드는법 (作卦法)

一、먼저 나이수(先置年齡數)놓고 다음에 그해 태세수(再置當年太歲數)를 합하여 여덟로 쪼갠뒤(八八除之後)에 그남은수(以其餘數)로 상괘(上卦)를 만들고

二、다음은 그해 낳은달수(又置當年生月數)를 놓되 달이크면 三十을놓고 달이작으면 二十九를 놓은 다음에 월건수(月建數)를 합하여 여섯으로 쪼갠후(六六除之後)에 그남은수(以其餘數)로 중괘(中卦)를 만들고

三、다음은 생일수(再置生日數)로 놓되 초하루(初一日)면 一을 놓고 보름날(十五日)이면 十五를 놓고 그해 생일일진수(當年生日日辰數)를 합하여 셋으로 쪼갠후(三三除之後)에 그남은수(以其餘數)로 하괘(下卦)를 만든다

◎혹 쪼개고 남지않고 꼭맞을때에는 쪼갠수로 할것。◉앞에 上中下 三卦를 合하여 한卦象을 이루니 百四十四卦가되느니라

태세수(太歲數) 월건수(月建數) 일진수(日辰數)는 다음면에 육갑(六甲)밑에 첫번에 보이는수가 태세수 둘째번이 월건수 세째번이 일진수다

月建法 (遁月法)

甲己之年丙寅頭、乙庚之年戊寅頭、丙辛之年庚寅頭、丁壬之年壬寅頭、戊癸之年甲寅頭、

例를 들면 甲年과 己年의 正月의 月建은 丙寅이 되고 乙年과 庚年의 正月의 月建은 戊寅이 된다

年 \ 月	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
甲己之年(丙寅頭)	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑
乙庚之年(戊寅頭)	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑
丙辛之年(庚寅頭)	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑
丁壬之年(壬寅頭)	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
戊癸之年(甲寅頭)	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑

遁日法 (定時法)

時 \ 日	子時	丑時	寅時	卯時	辰時	巳時	午時	未時	申時	酉時	戌時	亥時
甲己(夜半生甲子)日	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥
乙庚(夜半生丙子)日	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥
丙辛(夜半生戊子)日	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥
丁壬(夜半生庚子)日	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥
戊癸(夜半生壬子)日	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥