

В. Крысиные бега

Однажды британским ученым стало скучно и они решили провести следующий эксперимент. Они сконструировали лабиринт, состоящий из N комнат и M переходов между ними, и запустили в первую комнату сто лабораторных крыс (предварительно пронумеровав их). За один переход в любую соседнюю комнату каждая крыса получала кусочек сыра. Ученые же записывали, какая крыса бежала по какому маршруту.

После того, как каждая крыса пробежала по K переходам, сыр закончился и ученые стали смотреть на результаты. Неожиданно оказалось, что все крысы бежали по разным маршрутам... Ученые очень обрадовались и начали даже писать статью на тему индивидуализма крыс, но тут один из них поинтересовался – а сколько же всего существует различных маршрутов длины K , которые начинаются в первой комнате?..

Ученые начали считать, но сбились уже на 632-м маршруте — они все же психологи, а не математики... Однако им этого хватило, чтобы понять, что маршрутов может быть **ОЧЕНЬ** много — поэтому они хотят получить хотя бы остаток от ответа по модулю 10^9+7 . Помогите им — и они сделают вас соавтором статьи!

Формат ввода

В первой строке входного файла находится три числа — N , M и K ($1 \leq N \leq 50$, $0 \leq M \leq 10^5$, $0 \leq K \leq 10^9$) – количество комнат в лабиринте, количество переходов между ними и длина маршрута каждой из крыс.

В следующих M строках содержится информация о переходах между комнатами: в каждой строке содержатся пары чисел вида $a\ b$ ($1 \leq a, b \leq N$, a может быть равно b), обозначающие наличие перехода, ведущего из комнаты с номером a в комнату с номером b . Во входном файле могут быть одинаковые пары чисел $a\ b$, обозначающие разные переходы, ведущие из комнаты a в комнату b .

Все крысы начинают бежать из комнаты номер 1.

Формат вывода

Выведите в выходной файл единственное число P – количество различных маршрутов, по которым могли пробежать крысы, по модулю 10^9+7 .

Решение (теория):

Начнем с представления лабиринта в виде графа. Каждая комната – вершина, переход – ребро. Задан граф списком ребер (списком смежности), который уже на этапе ввода превратим в матрицу смежности. Нужно найти сумму количества путей от одной вершины до каждой, а мы умеем искать от каждой до каждой в виде матрицы. Цитируя лекцию (в матрице d_i

содержится ответ для пути из i шагов вида “кол-во путей из i ребер из A той вершины в B тую записано в $d_i[A][B]$ ”. Начальная матрица – матрица смежности графа):

Пусть ответ для некоторого k найден, построим ответ для $k+1$

d_k — посчитанная матрица ответов для k

d_{k+1} — искомая матрица ответов для $k+1$

Тогда получим:

$$d_{k+1}[i][j] = \sum_{p=1}^n d_k[i][p] \cdot g[p][j]$$

Получается, очередная матрица получается из известной домножением на матрицу смежности, а значит $d_k = g^k$. Получить ответ из финальной матрицы можно сложив все значения в первой строке (всего путей из первой комнаты = путей из нее в саму себя + во вторую + ... + в N тую). Тут сложность линейная по N – то есть $O(N)$. Осталось посчитать матрицу. Учитывая весьма большие значения K , сделаем это бинарным возведением в степень, займет оно $O(\log K)$ умножений. Константа при этом максимум 2, поскольку хотя бы одна из двух последовательных операций делит степень на два (нечетные степени сначала разбиваем на один и четную, четные сразу пополам). Сами матрицы перемножаются за куб от кол-ва вершин, но для $N \leq 50$ числа приемлемые. Отдельный случай с нулевой длиной пути – можем сразу возвращать один. Хотя если возведем матрицу в нулевую степень, получим единичную и, следовательно, такой же ответ.

В итоге – получаем список смежности, за $O(M)$ превращаем в матрицу, за $O(N^3 \log K)$ возводим в нужную степень, и за $O(N)$ находим ответ. Общая сложность – $O(N^3 \log K + M)$.