

Flora of Western North America

APIACEAE

Cymopterus glaucus NA

44.9501 -113.5578 (NAD83). U.S.A., Idaho, Lemhi Co., BLM Salmon FO 19N 24E 25. 640m at 20° from Sharkey crk.

Interface of snowberry-Juniper communities At 5,310 ft, on a pit, 7° slo. 321° asp.; geology: Igneous, volcanic.

Veg.: *Artemisia tridentata*, *Symphoricarpos* sp., *Juniperus occidentalis*, *Leymus cinereus*, *Purshia tridentata*. Ass.: *Phlox hoodii*, *Allium acuminatum*, *Opuntia polyacantha*, *Balsamorhiza sagittata*, *Astragalus cibarius*, *Crepis acuminata*. 0-25

40mins from Leadore ID via ID-28 N. Con't to follow ID-28 N 25.5 mi. Turn R on Tenday Ln 0.2 mi. Turn R on Lemhi Rd 0.2 mi. Turn L on Agency Creek Rd 1.3 mi. Con't on Chief Tendoy Rd 2.4 mi. Con't on Agency Creek Rd 0.6 mi.

2007, Meghan Heneghan, Charles Herrick; 3 May, 2019. Fide: * open gravelly ridgeline*, det.: , .

Collected under the auspices of the Bureau of Land Management