

1~3 题共用选项

- A 金黄色葡萄球菌
- B 表皮葡萄球菌
- C 溶血性链球菌
- D 流感嗜血杆菌
- E 淋病奈瑟菌

- 1 睑腺炎最常见的病原体是 【金黄色葡萄球菌】
- 2 某类型结膜炎常通过生殖器-眼接触传播，其病原体是 【淋病奈瑟菌】
- 3 儿童细菌性结膜炎最常见的病原体是 【流感嗜血杆菌】
- 4 女，32 岁，因“左眼睑局限性红肿 3 天”就诊，局部剧烈压痛，可见睑缘处黄白色脓点，无波动感，首选治疗是
A 左氧氟沙星滴眼液
B 热敷
C 垂直睑缘切开脓肿排脓
D 平行睑缘切开脓肿排脓
E 妥布霉素地塞米松眼膏
- 5 某患者欲行 ICL 晶体植入术，术前泪道冲洗发现冲洗液自泪小点返流，伴有少量脓性分泌物，下一步应采取的措施是
A 行泪囊鼻腔吻合术后择期进行 ICL 晶体植入
B 泪道探通后择期进行 ICL 晶体植入
C 使用抗生素滴眼液 3~5 天后进行 ICL 晶体植入
D 按原计划进行 ICL 晶体植入
E 口服抗生素 1 周后进行 ICL 晶体植入
- 6 下列体征中属于流行性角膜结膜炎与其他类型结膜炎鉴别点的是
A 耳前淋巴结压痛于眼开始受累侧较为明显
B 耳前淋巴结肿大
C 结膜滤泡形成、乳头增生、结膜下出血
D 弥漫性垂帘状角膜血管翳
E 结膜充血、水肿伴黏液性分泌物

7 下列病变中于迟发型超敏反应无关的是

A 季节性过敏性结膜炎

B 春季过敏性结膜炎

C 特应性角膜结膜炎

D 流行性角膜结膜炎

E 单纯疱疹病毒性角膜炎内皮型

8 有关单纯疱疹病毒性角膜炎，下列说法正确的是

A 坏死性基质性角膜炎可有多条新生血管从周边角膜伸入中央基质浸润区

B 神经营养性角膜炎多发生于单纯疱疹病毒感染的活动期，抗病毒药物治疗有效

C 上皮型角膜炎的特征包括角膜知觉减退，因此该型患者少有显著疼痛、摩擦感或流泪等临床表现

D 治疗内皮型角膜炎的首选药物是阿昔洛韦滴眼液

E 原发 HSK 常见于幼儿，多数患儿有畏光、疼痛、眼睑痉挛等眼部症状

9、10 两题共用题干

9 男，58 岁，农民，两周前于田间收割玉米时右眼不慎被玉米叶划伤，当时仅感到轻微刺痛，用手揉搓后继续劳作，后续几日逐渐出现右眼异物感、畏光、流泪等症状，自行购买“左氧氟沙星滴眼液”滴眼未缓解。近 1 周以来，患者眼部疼痛加剧，视力进行性下降，出现头痛，现于我院就诊。

若对患者进行眼科检查，最有可能观察到以下哪种表现

A 角膜中央部可见乳白色牙膏样浸润灶，周围可见伪足，前房积脓呈糊状

B 角膜表面可见溃疡，其上大量黄绿色黏液脓性分泌物，周围可见黄白色浸润环

C 角膜中央部溃疡呈树枝状，树枝末端可见分叉和结节性膨大

D 角膜基质水肿、混浊，边缘有新生血管长入

E 角膜呈毛玻璃样，裂隙灯下可见内皮面沉积物

10 关于上述病情的治疗，说法正确的是

A 那他霉素治疗反应好，为一线用药

B 若并发虹膜睫状体炎，可使用糖皮质激素

C 若发生角膜穿孔，应行穿透性角膜移植术，不使用药物治疗

D 评估药物治疗有效后，继续用药 2 周后可停药

E 所有该疾病患者均需全身用药

11 女，45 岁，因“双眼干涩，视物疲劳 1 年”就诊，该患者 5 年前曾检查发现抗 SSA (Ro) 抗体阳性。关于该患者的诊疗，下列说法错误的是

A 该患者干眼的分型为蒸发过强型

- B 在未进行局部麻醉的情况下，将 Schirmer 试纸头端 5mm 置于患者下睑中外 1/3 交界处的结膜囊，5min 内试纸浸湿长度 3mm，可确诊为干眼
- C 若患者 BUT 结果为 8 秒，还需进行角膜荧光素染色才可明确诊断
- D 针对该患者的病因治疗可用免疫抑制剂
- E 评估临床症状时应按从非接触到接触的顺序进行检查

12、13 两题共用题干

- 12 男，27 岁，因“右眼痛、畏光、流泪 3 天伴轻度视力下降”就诊，查体可见角膜缘周围巩膜充血，裂隙灯下见前房尘状 KP 在角膜下方呈三角形分布，前房闪辉（+），大量前房细胞，瞳孔缩小
- 有关该患者的查体结果，下列说法正确的是

A 所见巩膜充血的血供来自睫状前动脉

- B 尘状 KP 的主要成分为单核巨噬细胞
- C 病情缓解后前房闪辉现象会迅速转阴
- D 前房细胞大小一致，近角膜面的向上运动，近虹膜面的向下运动
- E 瞳孔缩小的原因为睫状肌痉挛，与瞳孔括约肌的收缩无关
- 13 补充问病史得知，患者近 2 年数次晨起腰背部僵硬，活动后缓解。
- 关于该患者的诊疗，下列说法错误的是

A 抗生素治疗重要

- B 应完善血沉、HLA-B27 抗原分型等检查
- C 使用睫状肌麻痹剂对于预防虹膜后粘连有重要作用
- D 可考虑糖皮质激素联合其他免疫抑制剂进行治疗
- E 需密切关注患者的眼压情况
- 14 关于葡萄膜炎，下列说法错误的是

A Vogt-小柳原田病常单眼受累

- B Busacca 结节常见于肉芽肿性前葡萄膜炎
- C 眼球穿通伤对诊断交感性眼炎有重要意义
- D 睫状体扁平部雪堤状改变是中间葡萄膜炎的特征性改变
- E 色素性 KP 常见于陈旧性前葡萄膜炎
- 15 从以下哪一角度最难鉴别急性前葡萄膜炎与急性闭角型青光眼

A 前房闪辉

- B 瞳孔大小
- C 眼压
- D 前房深度
- E 以上均可有效鉴别

16 关于青光眼，下列说法正确的是

- A 高眼压并非都是青光眼，正常眼压也不能排除青光眼
- B 房水循环仅有睫状突-后房-瞳孔-前房-小梁网-Schlemm 管-集合管-睫状前静脉-血循环这一条途径
- C 统计学上眼压的正常值是 10~21 mmHg，因此当一患者左、右眼眼压分别是 12 mmHg、19 mmHg 时，可判断其眼压一定正常
- D 大多数青光眼眼压升高的原因是睫状突生成房水速率过快
- E 以上均错误

17 关于急性闭角型青光眼急性发作期的临床表现，下列说法错误的是

- A 患者患侧瞳孔对光反射存在
- B 角膜上皮呈小水珠状
- C 角膜后有色素性 KP
- D 晶状体前囊下可有青光眼斑
- E 患者剧烈头痛、眼痛、视力减退

18~21 题共用题干

- A 毛果芸香碱
- B 甘露醇
- C α_1 受体激动剂
- D 碳酸酐酶抑制剂
- E 前列腺素衍生物

18 原发性开角型青光眼的一线用药是 【前列腺素衍生物】

19 主要通过减小玻璃体体积从而减少眼内容物量的是 【甘露醇】

20 通过抑制房水生成降低眼内压的是 【碳酸酐酶抑制剂】

21 可以解除周边虹膜对小梁网堵塞的是 【毛果芸香碱】

22、23 题共用题干

22 女，68 岁，因“右眼渐进性视力下降 5 个月，加重伴右眼胀痛、头痛 1 天”前来就诊，检查如下：

矫正视力：左眼 0.8，右眼 0.2；眼压：左眼 16 mmHg，右眼 25 mmHg；裂隙灯下见右眼前房变浅，晶状体呈灰白色混浊。

患者右眼眼压升高的主要原因是

- A 晶状体皮质吸水肿胀，体积增大，使虹膜前移、房角关闭
- B 炎症、纤维素性渗出物及组织阻塞小梁网
- C 大分子晶状体蛋白阻塞小梁网
- D 小梁网胶原纤维和弹性纤维变性，小梁网增厚，网眼变窄或闭塞
- E 虹膜上新生血管的纤维微血管膜牵拉使房角关闭

23 若此时以斜照法检查，可见到什么特征性表现

- A 虹膜投影
- B Morgagnian 白内障
- C 轮辐状混浊
- D Elschmig 珠样小体
- E 晶状体堵塞于瞳孔区

24 下列不属于视网膜中央动脉阻塞的临床表现是

- A 无光感
- B 患侧眼直接对光反射消失，间接对光反射存在
- C 视网膜苍白水肿
- D 黄斑区樱桃红斑
- E 瞳孔散大

25、26 题共用题干

25 男，68 岁，高血压病史 13 年，因“右眼突发视力下降 2h”前来就诊。查体视力：左眼 0.8，右眼手动；瞳孔直径左眼 3.0 mm，右眼 5.0 mm；右眼瞳孔直接对光反射消失，眼底情况如图
若为患者进行荧光素眼底血管造影，最有可能发生的情况是

- A 视网膜动脉后充盈时间约 45 秒
- B 视网膜微血管异常扩张，末端瘤样膨大
- C 大片边界清晰的无灌注区，面积约 10 个视盘大小
- D 黄斑区结节状强荧光，其周围荧光素渗漏
- E 一荧光素渗漏点呈墨渍样扩大

26 以下哪种治疗措施对该患者的病情而言不合适

- A 介入取栓

- B 降眼压
- C 高压氧治疗
- D 全身应用血管扩张剂
- E 全身应用抗凝剂

27 关于年龄相关性黄斑变性，下列说法正确的是

- A 可表现为视力进行性损害、视物变形
- B 多单眼发病
- C 干性 AMD 的首选治疗是玻璃体腔注射抗 VEGF 药物
- D 玻璃体疣不可见于湿性 AMD
- E 隐匿型湿性 AMD 早期可见高荧光新生血管形态

28 以下哪种视网膜变性最易发生裂孔

- A 格子样变性
- B 蜗牛迹样变性
- C 铺路石样变性
- D 霜样变性
- E 非压迫白

29 关于孔源性视网膜脱离，下列说法错误的是

- A 黄斑脱离 2 周后行手术者视力预后较好
- B 脱离发生于视网膜神经上皮与色素上皮之间
- C 高度近视是常见危险因素
- D 眼部 B 超可能见到 V 形高回声条带
- E 治疗原则是封闭裂孔，复位视网膜

30、31 题共用题干

30 女，62 岁，11 年糖尿病病史，因“双眼视力逐渐减退 3 月”前来就诊。眼底像可见大量点状出血及微动脉瘤、散在黄白色边界清楚的蜡样斑点，颞上、颞下象限可见静脉呈串珠样改变，未见新生血管，未见黄斑明显水肿。该患者糖尿病视网膜病变的分期是

- A I 期
- B II 期
- C III 期

D IV 期

E V 期

31 关于该患者的治疗，说法正确的是

①应注意控制血糖 ②应行激光治疗 ③应行玻璃体切割术 ④治疗后每 1 年复查一次

A ① ②

B ① ③

C ① ④

D ② ④

E ③ ④

32 女，37 岁，因“右眼视力下降 1 天”就诊。患者自述右眼眶后方胀痛，眼球转动时加重。查体视力左眼：0.9，右眼：指数；RAPD (+)。该患者最可能的诊断是

A 视神经炎

B 视网膜中央动脉阻塞

C 视网膜中央静脉阻塞

D 视网膜静脉周围炎

E 孔源性视网膜脱离

33 不属于眼球屈光介质的是

A 视网膜

B 角膜

C 房水

D 晶状体

E 玻璃体

34 关于双眼的调节，下列说法正确的是

A 视远物时，睫状肌松弛，悬韧带拉紧，晶状体变扁

B 视远物时，睫状肌松弛，悬韧带松弛，晶状体变扁

C 视远物时，睫状肌松弛，悬韧带松弛，晶状体变凸

D 视近物时，睫状肌松弛，悬韧带松弛，晶状体变扁

E 视近物时，睫状肌收缩，悬韧带拉紧，晶状体变凸

35 近反射所涉及的眼肌包括

①睫状肌 ②内直肌 ③外直肌 ④瞳孔开大肌 ⑤瞳孔括约肌

A ① ② ⑤

B ① ② ④

C ① ③ ⑤

D ① ③ ④

E ② ③ ④

36 关于双眼单视，下列描述正确的是

A 双眼见到的物像大小、形态、色彩可有细微差异，但大脑可将其融合成具有立体感的单一图像

B 需两眼的视野完全相同

C 功能分级由低到高为同时视→立体视→融合

D 隐性斜视的患者两眼单视功能与正位眼者无明显差异

E 使用同视机检查时，向患者右眼呈现“熊猫”，左眼呈现“笼子”，若患者汇报“熊猫关进笼子里”，可说明其融合功能正常

37 下列说法错误的是

A 麻痹性斜视第一斜视角 > 第二斜视角

B 共同性斜视常无复视或代偿头位

C 眼球运动是否受限是共同性斜视与麻痹性斜视的重要鉴别点

D 对斜视患者使用角膜映光法进行检查，若发现当光点位于一眼瞳孔中央时，另一眼光点位于瞳孔的颞侧，可说明患者为内斜视

E 共同性斜视有可能通过戴镜矫正

38 关于弱视，下列说法错误的是

A 屈光不正性弱视多单眼发病

B 斜视性弱视发病与黄斑功能抑制有关

C 双眼屈光参差时，屈光度较大的一眼易发生弱视

D 先天性白内障的儿童易发生形觉剥夺性弱视

E 弱视发病越早，治疗越晚，疗效越差

39 下列属于开放性眼外伤的是

①眼球破裂伤 ②眼球贯通伤 ③眼内异物 ④钝挫伤 ⑤板层裂伤

A ① ② ③

B ① ② ④

C ② ③ ④

D ② ③ ⑤

E ① ② ⑤

40 女，16 岁，因“踢球时被足球砸中右眼后视力下降 1 小时”前来就诊，可见右眼前房 1/2 高度处有一液平面，液体呈血性。下列说法错误的是

A 为防止血液长期接触角膜导致角膜血染，该患者宜仰卧位静养

B 该患者前房积血分级为 II 级

C 积血及小梁网的直接损伤易致外伤性青光眼，因此需密切关注眼压

D 用纱布遮盖双眼是为了避免光线刺激引起瞳孔变化

E 还需评估该患者有无玻璃体积血、晶状体脱位等情况

41 关于交感性眼炎，下列说法正确的是

A 交感眼可表现为肉芽肿性全葡萄膜炎

B 诱发眼的症状主要由外伤后的细菌感染引起

C 交感眼发病最危险的时间为外伤或手术后 1 周内

D 双眼症状相同，多同时出现

E 摘除诱发眼是治疗的关键

42 下列说法正确的是

A 酸烧伤比碱烧伤后果更严重

B 冲洗眼部时不应转动眼球，以免化学物质可接触的眼球范围扩大

C 冲洗满 10 分钟即可

D 眼化学烧伤多不影响视力

E 以上均错误

43 可再生的角膜层次有

①上皮细胞层 ②前弹力层 ③基质层 ④后弹力层 ⑤内皮细胞层

A ① ④

B ① ②

C ① ③

D ④ ⑤

E ② ⑤

44 巩膜最厚处位于

A 视神经周围

B 与角膜交界处

C 内直肌附着处

D 外直肌附着处

E 上直肌附着处

45 符合由内到外顺序出现的视网膜组织学层次是（不一定相邻）

A 神经纤维层 神经节细胞层 外丛状层 外核层 视杆与视锥细胞层

B 内丛状层 内核层 神经纤维层 外丛状层 外核层

C 内界膜 内核层 内丛状层 外丛状层 外核层 色素上皮层

D 内界膜 外界膜 神经纤维层 神经节细胞层 视杆与视锥细胞层

E 外界膜 视杆与视锥细胞层 色素上皮层 脉络膜毛细血管层 脉络膜